

Prevegest 5mg



ANTICONCEPCIONAL PARA GATAS E CADELAS DE PEQUENO PORTE

Uso Veterinário

FÓRMULA

Cada comprimido de 200 mg contém:

Prevegest 5 mg	
Acetato de Megestrol	5 mg
Excipientes q.s.p.	200 mg

DESCRIÇÃO

Produto de formulação terapêutica à base de Acetato de Megestrol, segunda geração, aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration). Molécula antiestrogênica, antiovlutatória, rapidamente eliminada, sem acúmulo no organismo.

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

Prevegest 5 mg permite retardar ou bloquear o cio de cadelas e gatas; diminuir ou suprimir a hemorragia vulvar, diminuir ou suprimir a atração dos machos, evitando a concepção.

Auxiliar no tratamento de granuloma eosinofílico em felinos; 0,5 mg/kg uma vez ao dia, durante 2 semanas e depois 2 vezes por semana enquanto o problema persistir.

Após o fim do tratamento, o retorno ao cio não é preciso (média de 2 a 3 meses, muito raramente 6 meses em cadelas).

Bloqueio do cio: o cio seguinte retorna (4 a 5 meses em média). Recomenda-se a cada 2 bloqueios consecutivos, permitir um cio.

INDICAÇÕES COMPLEMENTARES

Pseudociose: 0,5 mg/kg uma vez ao dia durante 8 dias seguidos (1 comp./10 kg).

Auxiliar no tratamento de granuloma eosinofílico em felinos: 0,5 mg/kg uma vez ao dia, durante 2 semanas e depois 2 vezes por semana enquanto o problema persistir.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR

Administrar o comprimido por via oral.

POSOLOGIA

GATAS

Bloqueio do cio:

Iniciar o tratamento com o **Prevegest 5 mg** no primeiro dia de cio (assim que os primeiros sinais de cio apareçam).



Administrar 1 comprimido de **Prevegest 5 mg** ao dia, durante 8 dias.

Retardo do cio:

Começar a administração em período de repouso sexual.

Administrar 1/2 comprimido de 5 mg a cada 2 dias, durante no máximo 10 semanas.

TABELA DE DOSAGEM PARA GATAS

Tamanho	Dose Diária	
	Bloquear o cio - 8 dias (iniciar no primeiro dia do cio)	Retardar o cio (máximo 10 semanas)
Gatas	1 cp./dia 	1/2 cp. a cada 2 dias 

CADELAS














Bloqueio do cio:

Iniciar o tratamento com o **Prevegest 5 mg** no primeiro dia de cio (assim que observado corrimento vaginal sanguinolento). Administrar a dose de 1,5 mg/kg de peso durante os 3 primeiros dias de cio e em seguida metade da dose nos próximos 6 dias, totalizando um tratamento de 9 dias consecutivos.

Retardo do cio:

Iniciar o tratamento a partir de 4 meses após o último cio do animal. Administrar 0,5 mg/kg de peso ao dia, durante 30 dias. A administração pode ser prolongada por um período máximo de 60 dias.

TABELA DE DOSAGEM PARA CADELAS

Peso	Dose Diária		
	Bloquear o cio		Retardar o cio
	Durante os 3 primeiros dias	6 dias seguintes de cio	Durante 30 dias (Máximo 60 dias)
até 3 kg	1 cp./dia 	1/2 cp./dia 	1/4 cp./dia 
acima de 3 kg até 6 kg	2 cp./dia  	1 cp./dia 	1/2 cp./dia 
acima de 6 kg até 10 kg	3 cp./dia   	1 e 1/2 cp./dia  	1 cp./dia 

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

Não administrar em caso de doença dos órgãos genitais como infecções uterinas e tumores mamários, diabetes, insuficiência hepática ou quaisquer outras condições debilitantes.

A administração durante a gestação deve ser realizada apenas sob a supervisão de um médico veterinário. O produto pode ocasionar má formação quando administrado no início da gestação; e problemas no parto, quando administrado na segunda metade da gestação.

Evitar o uso em animais idosos.

Evitar a administração por períodos prolongados, recomenda-se não utilizar por mais de dois ciclos consecutivos.

Prevegest 5 mg é desaconselhado, como todos os progestágenos, para as fêmeas antes da puberdade. Recomenda-se administrar o produto a partir do 2º cio.

REAÇÕES ADVERSAS

Pode ocorrer um pequeno aumento de volume (hiperplasia) das mamas, mudança de comportamento e torpor.

Estes sinais desaparecem rapidamente com a suspensão do tratamento.

Eventualmente pode ocorrer produção de leite após o término do tratamento.

A utilização do produto pode predispor à infecção uterina.

Em gatas, pode ocorrer aumento de peso.

IMPORTANTE

Este medicamento, como qualquer outro progestágeno, não confere 100% de eficácia, pois, alguns animais podem não responder satisfatoriamente ao tratamento.

Este medicamento, quando administrado corretamente, diminui significativamente a possibilidade de gestação.

No tratamento para bloqueio de cio, se a administração for tardia, a gestação poderá ocorrer.

Nas cadelas, caso o bloqueio do cio não ocorra após os três primeiros dias de administração, prolongar o tratamento inicial (dos primeiros 3 dias) por mais 5 dias. Se ao fim de 8 dias não houver progresso, consultar o médico veterinário.

APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 strip com 12 comprimidos.

PRAZO DE VALIDADE

O produto tem prazo de validade de 2 (dois) anos, após a data de fabricação.

CONSERVAÇÃO

Conservar o produto em local seco, fresco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 2508/86 em 14/05/1986.

RESPONSÁVEL TÉCNICO MÉDICO VETERINÁRIO

Dr. Danillo Silva Marcon

CRMV - SP 36.982

PROPRIETÁRIO

Laboratório Bio-Vet Ltda.

R. Cel. José Nunes dos Santos, 639

06730-000 - Vargem Grande Paulista - SP

CNPJ 60.411.527/0001-30

INDÚSTRIA BRASILEIRA

FABRICANTE

Uzinas Químicas Brasileiras S/A.

Praça Dr. Joaquim Batista, 150

14870-090 - Jaboticabal - SP

CNPJ 50.380.674/0001-37

INDÚSTRIA BRASILEIRA



Acesse a bula e outras informações sobre este medicamento usando o código ao lado.

Obrigado por nos deixar cuidar da saúde do seu pet!



faleconosco@biovet.com.br



WhatSac:

(11) 9 9545-5595

biovet
vet para todos

Prevegest 20mg



ANTICONCEPCIONAL PARA CADELAS DE GRANDE PORTE

Uso Veterinário

FÓRMULA

Cada comprimido de 200 mg contém:

Prevegest 20 mg	
Acetato de Megestrol	20 mg
Excipiente q.s.p.	200 mg

DESCRIÇÃO

Produto de formulação terapêutica à base de Acetato de Megestrol, segunda geração, aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration). Molécula antiestrogênica, antiovolatória, rapidamente eliminada, sem acúmulo no organismo.

INDICAÇÕES

Prevegest 20 mg permite retardar ou bloquear o cio de cadelas; diminuir ou suprimir a hemorragia vulvar, diminuir ou suprimir a atração dos machos, evitando a concepção.

Retardo do cio por um tempo limitado como em: férias, viagens tranquilas e exposições.

Após o fim do tratamento, o retorno ao cio não é preciso (média de 2 a 3 meses, muito raramente 6 meses em cadelas). Bloqueio do cio: o cio seguinte retorna (4 a 5 meses em média). Recomenda-se a cada 2 bloqueios consecutivos, permitir um cio.

INDICAÇÕES COMPLEMENTARES

Pseudociese: 0,5 mg/kg uma vez ao dia durante 8 dias seguidos (1 comprimido/10 kg).

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR

Administrar o comprimido por via oral.

POSOLOGIA

CADELAS

Bloqueio do cio:

Iniciar o tratamento com o **Prevegest 20 mg** no primeiro dia de cio (assim que observado corrimento vaginal sanguinolento). Administrar a dose de 1,5 mg/kg de peso durante os 3 primeiros dias de cio e em seguida metade da dose nos próximos 6 dias, totalizando um tratamento de 9 dias consecutivos.

Retardo do cio:

Iniciar o tratamento a partir de 04 meses após o último cio do animal. Administrar 0,5 mg/kg de peso ao dia, durante 30 dias. A administração pode ser prolongada por um período máximo de 60 dias.

TABELA DE DOSAGEM PARA CADELAS

Peso	Dose Diária		
	Bloquear o Cio		Retardar o Cio
	Durante os 3 primeiros dias	6 dias seguintes de cio	Durante 30 dias (Máximo 60 dias)
acima de 10 kg até 19 kg	2 cp./dia	1 cp./dia	1/2 cp./dia
acima de 19 kg até 29 kg	2 e 1/2 cp./dia	1 e 1/4 cp./dia	3/4 cp./dia
acima de 29 kg até 39 kg	3 cp./dia	1 e 1/2 cp./dia	1 cp./dia
acima de 39 kg	4 cp./dia	2 cp./dia	1 cp./dia

IMPORTANTE

Este medicamento, como qualquer outro progestágeno, não confere 100% de eficácia, pois, alguns animais podem não responder satisfatoriamente ao tratamento.

Este medicamento, quando administrado corretamente, diminui significativamente a possibilidade de gestação.

No tratamento para bloqueio de cio, se a administração for tardia, a gestação poderá ocorrer.

Nas cadelas, caso o bloqueio do cio não ocorra após os três primeiros dias de administração, prolongar o tratamento inicial (dos primeiros 3 dias) por mais 5 dias. Se ao fim de 8 dias não houver progresso, consultar o médico veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

Não administrar em caso de doença dos órgãos genitais como infecções uterinas e tumores mamários, diabetes, insuficiência hepática ou quaisquer outras condições debilitantes.

A administração durante a gestação deve ser realizada apenas sob a supervisão de um médico veterinário. O produto pode ocasionar má formação quando administrado no início da gestação; e problemas no parto, quando administrado na segunda metade da gestação.

Evitar o uso em animais idosos.

Evitar a administração por períodos prolongados, recomenda-se não utilizar por mais de dois ciclos consecutivos.

Prevegest 20 mg é desaconselhado, como todos os progestágenos, para as fêmeas antes da puberdade. Recomenda-se administrar o produto a partir do 2º cio.

REAÇÕES ADVERSAS

Pode ocorrer um pequeno aumento de volume (hiperplasia) das mamas, mudança de comportamento e torpor.

Estes sinais desaparecem rapidamente com a suspensão do tratamento.

Eventualmente pode ocorrer produção de leite após o término do tratamento.

A utilização do produto pode predispor à infecção uterina.

APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 strip com 12 comprimidos.

PRAZO DE VALIDADE

O produto tem prazo de validade de 2 (dois) anos, após a data de fabricação.

CONSERVAÇÃO

Conservar o produto em local seco, fresco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 3906/92 em 05/02/1992.

RESPONSÁVEL TÉCNICO MÉDICO VETERINÁRIO

Dr. Danillo Silva Marcon

CRMV - SP 36.982

PROPRIETÁRIO

Laboratório Bio-Vet Ltda.

R. Cel. José Nunes dos Santos, 639

06730-000 - Vargem Grande Paulista - SP

CNPJ 60.411.527/0001-30

INDÚSTRIA BRASILEIRA

FABRICANTE

Uzinas Químicas Brasileiras S/A.

Praça Dr. Joaquim Batista, 150

14870-090 - Jaboticabal - SP

CNPJ 50.380.674/0001-37

INDÚSTRIA BRASILEIRA



Acesse a bula e outras informações sobre este medicamento usando o código ao lado.

Obrigado por nos deixar cuidar da saúde do seu pet!



faleconosco@biovet.com.br



WhatSac:

(11) 9 9545-5595

bioVet
vet para todos