



Baytril®

flavour

15 mg
Antimicrobiano



Baytril® Flavour 15 mg é um potente agente quimioterápico de ação bactericida pertencente ao grupo das quinolonas. Possui um largo espectro de ação antimicrobiana e distingue-se por sua rápida absorção, metabolização e distribuição no organismo.

É um produto à base de enrofloxacin, com a vantagem especial de possuir uma elevada eficácia contra bactérias e micoplasmas resistentes a outras substâncias antimicrobianas.

Baytril® Flavour 15 mg possui moderno componente palatilizante que facilita a aceitação do comprimido pelos animais.

Modo de ação:

Devido ao seu especial mecanismo de ação, as quinolonas recebem o nome de “Inibidores da Girase” bacteriana.

Os “Inibidores da Girase” são substâncias que atuam diretamente sobre a enzima DNA-GIRASE, intervindo assim, ativamente no ponto central do metabolismo bacteriano. Isto provoca uma incapacidade de multiplicação das bactérias.

Composição:

Cada comprimido de 60 mg contém:
Enrofloxacin 15 mg
Excipiente q.s.p. 60 mg

Indicações:

Baytril® Flavour 15 mg atua contra as seguintes infecções dos cães e gatos causadas por bactérias gram-negativas e gram-positivas, e micoplasmas sensíveis ao enrofloxacin:

- Infecções dérmicas (piodermites) causadas por *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas* spp. e *Proteus mirabilis*.
- Infecções respiratórias (pneumonias) causadas por *Pasteurella* spp., *Escherichia coli*, *Streptococcus* spp., *Klebsiella* spp. *Bordetella bronchiseptica*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas* spp. e *Mycoplasma* spp.
- Infecções entéricas (diarreias) primárias ou secundárias causadas por *Escherichia coli* e *Salmonella* spp.
- Infecções do ouvido (otites) causadas por *Pseudomonas* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. e *Proteus* spp.
- Infecções geniturinárias causadas por *Escherichia coli*, *Staphylococcus* spp., *Proteus* spp., *Streptococcus* spp., *Pseudomonas* spp., *Enterobacter* spp., *Mycoplasma* spp. e *Klebsiella* spp.

– É também indicado no tratamento de infecções pós-operatórias decorrentes de castrações, laparotomias e lesões acidentais.

Modo de usar e via de administração:

Baytril® Flavour 15 mg deve ser administrado por via oral em cães e gatos, acompanhado ou não de alimentos.

Dosagens:

A dosagem terapêutica é de 5,0 mg do princípio ativo por kg de peso corporal, ou seja, 1 comprimido de **Baytril® Flavour 15 mg** para cada 3 kg de peso corporal, uma vez por dia, durante 5 dias.

Interações medicamentosas:

Evitar o uso associado de quinolonas com complexos vitamínicos ou soluções que contenham ferro, zinco, manganês e cálcio pois eles reduzem a absorção de enrofloxacino.

Observações:

Em testes clínicos de campo não foram relatados casos de claudicação ou problemas nas juntas de quaisquer raças. Entretanto, de acordo com estudos toxicológicos, o enrofloxacino é contraindicado em cães de raças pequenas e médias durante a fase de crescimento rápido (entre 2 e 8 meses de idade). Nas raças grandes este período poderá chegar a até 18 meses.

Na dose terapêutica indicada de 5 mg/kg de peso corporal 1 vez por dia, durante 5 dias, não foram encontradas reações adversas em gatos. Entretanto, estudos toxicológicos mostraram que alguns animais podem apresentar anormalidades visuais ao receberem doses acima de 20 mg/kg de peso corporal por mais de 4 semanas. Recomenda-se não exceder a dose terapêutica indicada para esta espécie.

Não é recomendado o uso em gatos com menos de 8 semanas de idade.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

LEVE SEU CÃO E SEU GATO REGULARMENTE AO VETERINÁRIO.

Cuidados e instruções:

Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Não guarde ou aplique junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.

Apresentação:

Blister com 10 comprimidos de 60 mg cada, acondicionado em cartucho.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 8985, em 22/10/04.

Reponsável técnica:

Léa B. H. Lucas CRMV-SP nº8290

Proprietário da fórmula:

Bayer Animal Health GmbH -
Leverkusen - Alemanha

Fabricante:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Kiel – Alemanha

Representante exclusivo no Brasil,
importador e distribuidor:

Bayer S.A., Rua Domingos Jorge, 1100
São Paulo – SP
CNPJ 18.459.628/0001-15

Produto Importado



Bayer




Baytril®

flavour

50 mg

Antimicrobiano



Baytril® Flavour 50 mg é um potente agente quimioterápico de ação bactericida pertencente ao grupo das quinolonas. Possui um largo espectro de ação antimicrobiana e distingue-se por sua rápida absorção, metabolização e distribuição no organismo.

É um produto à base de enrofloxacin, com a vantagem especial de possuir uma elevada eficácia contra bactérias e micoplasmas resistentes a outras substâncias antimicrobianas.

Baytril® Flavour 50 mg possui moderno componente palatilizante que facilita a aceitação do comprimido pelos animais.

Modo de ação:

Devido ao seu especial mecanismo de ação, as quinolonas recebem o nome de "Inibidores da Girase" bacteriana.

Os "Inibidores da Girase" são substâncias que atuam diretamente sobre a enzima DNA-GIRASE, intervindo assim, ativamente no ponto central do metabolismo bacteriano. Isto provoca uma incapacidade de multiplicação das bactérias.

Composição:

Cada comprimido de 120 mg contém:
Enrofloxacin 50 mg
Excipiente q.s.p. 120 mg

Indicações:

Baytril® Flavour 50 mg atua contra as seguintes infecções dos cães e gatos causadas por bactérias gram-negativas e gram-positivas, e micoplasmas sensíveis ao enrofloxacin:

- Infecções dérmicas (piodermites) causadas por *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas* spp. e *Proteus mirabilis*.
- Infecções respiratórias (pneumonias) causadas por *Pasteurella* spp., *Escherichia coli*, *Streptococcus* spp., *Klebsiella* spp. *Bordetella bronchiseptica*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas* spp. e *Mycoplasma* spp.
- Infecções entéricas (diarreias) primárias ou secundárias causadas por *Escherichia coli* e *Salmonella* spp.
- Infecções do ouvido (otites) causadas por *Pseudomonas* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. e *Proteus* spp.
- Infecções geniturinárias causadas por *Escherichia coli*, *Staphylococcus* spp., *Proteus* spp., *Streptococcus* spp., *Pseudomonas* spp., *Enterobacter* spp., *Mycoplasma* spp. e *Klebsiella* spp.

– É também indicado no tratamento de infecções pós-operatórias decorrentes de castrações, laparotomias e lesões acidentais.

Modo de usar e via de administração:

Baytril® Flavour 50 mg deve ser administrado por via oral em cães e gatos, acompanhado ou não de alimentos.

Dosagens:

A dosagem terapêutica é de 5,0 mg do princípio ativo por kg de peso corporal, ou seja, 1 comprimido de **Baytril® Flavour 50 mg** para cada 10 kg de peso corporal, uma vez por dia, durante 5 dias.

Interações medicamentosas:

Evitar o uso associado de quinolonas com complexos vitamínicos ou soluções que contenham ferro, zinco, manganês e cálcio pois eles reduzem a absorção de enrofloxacin.

Observações:

Em testes clínicos de campo não foram relatados casos de claudicação ou problemas nas juntas de quaisquer raças. Entretanto, de acordo com estudos toxicológicos, o enrofloxacin é contraindicado em cães de raças pequenas e médias durante a fase de crescimento rápido (entre 2 e 8 meses de idade). Nas raças grandes este período poderá chegar a até 18 meses.

Na dose terapêutica indicada de 5 mg/kg de peso corporal, 1 vez por dia, durante 5 dias, não foram encontradas reações adversas em gatos. Entretanto, estudos toxicológicos mostraram que alguns animais podem apresentar anormalidades visuais ao receberem doses acima de 20 mg/kg de peso corporal por mais de 4 semanas em gatos. Recomenda-se não exceder a dose terapêutica indicada para esta espécie.

Não é recomendado o uso em gatos com menos de 8 semanas de idade.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

LEVE SEU CÃO E SEU GATO REGULARMENTE AO VETERINÁRIO.

Cuidados e instruções:

Conservar em local seco e fresco ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não guarde ou aplique junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.

Apresentação:

Blister com 10 comprimidos de 120 mg cada, acondicionado em cartucho.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 8984, em 22/10/2004.

Reponsável técnica:

Léa B. H. Lucas CRMV-SP nº8290

Proprietário da fórmula:

Bayer Animal Health GmbH -
Leverkusen - Alemanha

Fabricante:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Kiel - Alemanha

Representante exclusivo no Brasil,
importador e distribuidor:

Bayer S.A., Rua Domingos Jorge, 1100
São Paulo - SP
CNPJ 18.459.628/0001-15

Produto Importado



Bayer