

**BOLDO  
KLEIN****vidora****IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:****Boldo Klein****MEDICAMENTO FITOTERÁPICO****Nomenclatura botânica oficial:** *Peumus boldus* Molina**Nomenclatura popular:** Boldo, Boldo do Chile**Família:** Monimiaceae**Parte da planta utilizada:** Folhas**APRESENTAÇÕES**

Forma farmacêutica: Tintura (1,0 mL/mL)

Frasco plástico âmbar de 120 mL com copo dosador

**USO ORAL****USO ADULTO****COMPOSIÇÃO**

Cada 1 ml contém:

Tintura de *Peumus boldus* ..... 1,0 mL\*

\*padronizado em 0,20 mg (0,02%) de alcalóides totais calculados em boldina.

Veículo (álcool etílico e água purificada)

Gradação alcoólica final: 50%

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE:****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é indicado para o tratamento de distúrbios digestivos leves, atuando na redução de espasmos intestinais e tratamento de distúrbios hepatobiliares, com ação colagoga e colerética.

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Atua como estimulante digestivo. Apresenta efeito colagogo, no estímulo à secreção da bile pela vesícula biliar para o duodeno, e colerético, no estímulo à produção de bile pelo fígado, auxiliando a digerir os alimentos gordurosos. Promove diminuição das contrações leves da musculatura

intestinal, apresentando atividade antiespasmódica.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**Pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes da fórmula não devem fazer uso do produto. **Mulheres grávidas não devem usar este medicamento, visto que este poderá provocar contrações uterinas e acelerar o parto. Mulheres em amamentação também não devem fazer uso deste medicamento.****Pacientes com obstrução das vias biliares, cálculos biliares, quadros de inflamação ou câncer no ducto biliar e com câncer no pâncreas não deverão fazer uso deste medicamento.** Este medicamento não deverá ser usado por pacientes com doenças severas no fígado como hepatite viral, cirrose ou hepatite tóxica.**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Em casos de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. Não ingerir doses maiores do que as recomendadas.

Não se recomenda o uso contínuo deste medicamento. O uso de *P. boldus* não deve ultrapassar quatro semanas consecutivas. De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este medicamento apresenta categoria de risco C. **Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**Não foram encontradas na literatura referências a interações medicamentosas com medicamentos a base de *P. boldus*.**Este medicamento contém ÁLCOOL.****Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se** **você está fazendo uso de algum outro medicamento.****5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e da umidade. Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.****Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

O medicamento é apresentado na forma líquida de cor castanho-avermelhada, aspecto límpido, odor característico e sabor picante levemente amargo.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.****Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.****6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Ingerir 10 mL da tintura, 2 vezes ao dia. (Corresponde à dose diária de 4 mg de boldina).

Utilizar o copo dosador e colocar 10 ml da tintura em até meio copo d'água. Usar por no máximo 4 semanas. **Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.****7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso você esqueça de tomar a dose no horário estabelecido, tome-a assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima dose, continuando normalmente o

esquema de doses recomendado pelo seu médico.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.****8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Nas doses recomendadas não são conhecidos efeitos adversos ao medicamento.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.****9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?**

Doses superiores às recomendadas poderão provocar transtornos renais, vômitos e diarreia. Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.****DIZERES LEGAIS**

VIDORA FARMACÊUTICA LTDA.

Rua Alberto Rangel, 823 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 92.762.277/0001-70

Nº de lote, data de fabricação e validade: vide cartucho

M.S. nº 1.0473.0036.001-2

Farm. Resp.: Daniel P. Lewgoy - CRF-RS nº 6583

INDÚSTRIA BRASILEIRA

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 02/02/2016.

