



## USO VETERINÁRIO

VERMÍFUGO ORAL PARA CÃES COM PALATABILIZANTE

## DOSE ÚNICA

COMPRIMIDOS À BASE DE PIRANTEL, PRAZIQUANTEL E FEBANTEL DE USO ORAL

## FÓRMULA - cada comprimido contém:

Pamoato de Pirantel  
(equivalente a 50 mg de Pirantel base).....14,0 mg  
Praziquantel.....50,0 mg  
Febantel.....150,0 mg  
Excipiente q.s.p. ....900,0 mg

## INTRODUÇÃO:

**CANEX PLUS 3** é um vermífugo oral com palatibilizante para uso em cães, utilizando uma associação composta de pamoato de pirantel, febantel e praziquantel, princípios ativos estes com diferentes modos de ação, muito eficaz na prevenção e controle de formas adultas e larvais de nematóides e cestóides que acometem os cães. Nas infestações por *Ancylostoma caninum*, suas larvas passam da glândula mamária para o leite, penetram ativamente pela pele ou são ingeridas a partir do meio ambiente; vermes adultos sugam por volta de 0,1ml de sangue do animal por dia e infestações severas podem chegar a ser fatais em filhotes. Larvas de *Ancylostoma caninum* ou *Toxocara canis* permanecem inativas em tecidos da cadela, podendo promover infestações por várias crias consecutivas. O pamoato de pirantel é uma tetraidropirimidina que atua inibindo o sistema colinérgico dos nematóides em nível ganglionar, utilizada no controle de estágios adultos e imaturos de nematóides gastrointestinais. Sua ação ocorre de forma bastante

branda, não provocando excitação dos vermes afetados bem como não alterando os movimentos peristálticos normais do intestino, realizando-se o tratamento sem que ocorra o surgimento de diarreias, cólicas ou qualquer sensação dolorosa, evitando assim, complicações decorrentes, comuns no tratamento de animais altamente infestados. O praziquantel é uma pirazinoisoquinolona com atuação através da alteração do fluxo de íons cálcio das membranas celulares, provocando a vacuolização e desintegração do tegumento do helminto e inibindo a captação de glicose de trematódeos interferindo no seu metabolismo energético, matando-o por inanição. São medicamentos de eleição no tratamento de infestações por cestódeos e quando administrados em altas doses, são eficazes sobre os estágios imaturos no hospedeiro intermediário. Sua ação também ocorre de forma bastante branda, não provocando excitação dos vermes afetados bem como não alterando os movimentos peristálticos normais do intestino. O febantel é um pró-benzimidazol, um medicamento que após absorvido é metabolizado em benzimidazol e atua interferindo no metabolismo energético do parasita, por inibir a absorção e o metabolismo da glicose, resultando no esgotamento das energéticas e morte dos nematódeos gastrointestinais e pulmonares por inanição. É importante associar o tratamento do animal com a limpeza do ambiente em que o mesmo vive, com produtos à base de cloro ativo (eficaz contra larvas e ovos dos vermes).

## INDICAÇÕES:

**CANEX PLUS 3** é um vermífugo de amplo espectro composto pela associação de pirantel, febantel e praziquantel indicado no combate dos principais nematódeos (inclusive *Trichuris vulpis*) e cestódeos que acometem os cães, a saber:

**Nematódeos:** *Ancylostoma braziliense*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Capillaria sp.*, *Dipetalomema reconditum*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Oncicola canis*, *Pneumocystis caninum*, *Spirocerca lupi*, *Strongyloides stercoralis*, *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Uncinaria stenocephala*.  
**Cestódeos:** *Diphyllobothrium sp.*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus vogalis*, *Mesocostoides spp.*, *Spirometra erinacei*, *Taenia hydatigena*, *Taenia multiceps*, *Taenia ovis*, *Taenia pisiformis*, *Taenia Taeniformis*.

Observação: Para evitar constantes reinfestações

por *Dipylidium caninum*, aconselha-se que, concomitantemente ao uso de **CANEX PLUS 3**, o proprietário combata as pulgas do ambiente, eliminando assim a ação do hospedeiro intermediário desta teníase.

## VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USO:

**CANEX PLUS 3** comprimido deve ser administrado diretamente por via oral, misturado à ração, carne ou qualquer outro alimento que agrade ao animal. **CANEX PLUS 3** possui em sua formulação um palatibilizante com intuito de tornar o tratamento mais prático, ocorrendo da maneira mais natural possível, sem comprometer a rotina do animal, não havendo necessidade de jejum prévio e/ou qualquer alteração na dieta.

## POSOLOGIA:

**CANEX PLUS 3** foi desenvolvido para uso em dose única, seguindo a posologia de 14,4mg de Pamoato de Pirantel, 15mg de Febantel e 5mg de Praziquantel por kg de peso corporal.

Peso do animal	Dosagem
Até 5 kg	½ comprimido
Acima de 5,1 até 10kg	1 comprimido
Acima de 10,1 até 15 kg	1 e ½ comprimido
Acima de 15,1 até 20 kg	2 comprimidos

\* A posologia preconizada para animais com menos de 2,5 kg é de 43,2mg/kg de pamoato de pirantel, 45mg de febantel e de 15mg de praziquantel para cada kg de peso corporal, devendo-se administrar ½ de um comprimido de **CANEX PLUS 3** para os animais que estiverem neste intervalo de peso. \*\* Para cães com peso superior a 10kg, administrar 1 comprimido de **CANEX PLUS 3** para cada 10kg peso corporal. Qualquer alteração de posologia e modo de usar, bem como a frequência de tratamentos, fica a critério e sob responsabilidade do Médico Veterinário.

## INTERVALO ENTRE AS APLICAÇÕES:

**FILHOTES:** realizar três vermifugações, na 3ª, 6ª e 9ª semanas de vida.

**CADELAS:** vermifugar na cobertura, uma semana antes do parto e 3 semanas após o parto, juntamente com a 1ª vermifugação dos filhotes.

**CÃES ADULTOS:** vermifugar a cada 3 (três) ou 6 (seis) meses, conforme orientação do Médico Veterinário. Repetir após 15 dias.

## CONTRA INDICAÇÕES:

Não administrar em fêmeas nas primeiras três semanas de gestação, nas duas semanas após o parto e em filhotes com menos de duas semanas de vida.

## EFEITOS COLATERAIS OU SECUNDÁRIOS:

Normalmente **CANEX PLUS 3** não apresenta efeitos colaterais ou secundários nas dosagens e fases de vida recomendadas, não afeta a fertilidade dos machos, podendo ser usado em criações, em qualquer época.

## ANTAGONISMOS FARMACOLÓGICOS:

Devido às propriedades colinérgicas do pirantel, provocando a contração dos músculos dos parasitas, substâncias com propriedades anticolinérgicas (organofosforados, por exemplo) ou relaxantes musculares, agem como antagonistas do pirantel.

## APRESENTAÇÕES:

Cartucho contendo a bula e 1 blister plástico com 4 comprimidos de **CANEX PLUS 3**.

**MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONSERVAR O PRODUTO EM LOCAL FRESCO E SECO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR.**

## VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Prazo de validade: 03 (três) anos após a data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 6.717 em 09/02/1999.

Responsável Técnico:

Dr. Cassio R. Murin – CRMV n° 6473

Proprietário e Fabricante:  
-Sespo Indústria e Comércio Ltda.  
Uma empresa do Grupo Ceva Santé Animale  
Rua Manoel Joaquim Filho, 303  
CEP: 13148-115 - Paulínia - SP  
CNPJ: 50.646.692/0001-05  
E-mail: cevabrazil@ceva.com  
Indústria Brasileira



**CEVA SAC:**  
0800-770-0355  
sac@ceva.com