

Cipro-otic®

Ciprofloxacina 0,5%
Pomada Otológica - Uso Tópico
Uso Veterinário

Pomada Otológica a base de Ciprofloxacina indicado para o tratamento de otite externa aguda e otite crônica em cães.

Composição:

Cada 100g contém:

Ciprofloxacina (base) 0,5 g
Clotrimazol 1,0 g
Betametasona (Valerato) 0,172 g
Veículo q. s. p. 100 g

Indicação de uso:

Cipro-otic® é indicado para o tratamento de otite externa aguda e otite crônica em cães. Possui como agentes etiológicos susceptíveis, as bactérias *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Streptococcus pyogenes*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Proteus spp*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Corynebacterium spp*, e os fungos *Malassezia pachydermatis*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum canis*, *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes* e *Candida spp*.

Aplicação e Posologia:

Produto de uso tópico, aplicação direta no conduto auditivo de cães. A frequência de uso depende da severidade do quadro clínico. Para otites agudas **Cipro-otic®** deve ser aplicado 2 vezes ao dia por 7 a 10 dias, ou até completa remissão dos sintomas. Nos casos crônicos aplicar o produto 2 vezes ao dia por 21 dias ou a critério do Médico Veterinário. Nunca interromper o tratamento antes de 48 horas após a remissão dos sintomas clínicos. Após a aplicação, massagear o ouvido para garantir a perfeita distribuição de medicamento por todo o conduto auditivo.

Efeitos Colaterais:

Embora o produto seja tolerado por via tópica, podem ocorrer reações individuais de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Os principais sintomas das reações alérgicas são: coceira, inchaço na região e vermelhidão. No caso de reações colaterais, suspender o uso e consultar um Médico Veterinário.

Contraindicações:

É contra indicado para os quadros de otite causados por bactérias ou fungos sabidamente resistentes aos princípios ativos presentes no produto, ou na ocorrência de reações alérgicas e sensibilidade comprovada aos componentes da fórmula. Descontinuar o tratamento em caso de intolerância ou aparecimento de reações colaterais e consultar um Médico Veterinário.

Precauções:

Evitar o contato com os olhos e mucosas. Em caso de contato acidental, lavar a região afetada com água corrente. Não reutilizar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Conservação:

Deve-se conservar o produto em lugar fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta.

Cipro-otic® possui prazo de validade de 24 meses após a data de fabricação.

Apresentação:

Bisnaga de alumínio com verniz interno contendo 15g e 30g do produto.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº: 10.087 em 03/06/2015

Responsável Técnico:

Dra. Vera de Fátima de Costa Calixto - CRF/SP nº 11.427

Fabricante e Proprietário:

Syntec do Brasil Ltda.
Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim - Santana de Parnaíba/SP
CEP: 06513-010
CNPJ: 02.177.011/0001-77
Indústria Brasileira

Cães com até 15 kg de peso corpóreo	5 gotas em cada ouvido
Cães acima de 15 kg de peso corpóreo	10 gotas em cada ouvido