



INDICAÇÕES

Codergine é indicado para o tratamento dos sinais e sintomas de declínio das funções mentais, principalmente aqueles relacionados ao envelhecimento: tontura, cefaléia, pouca concentração, desorientação, comprometimento da memória, falta de iniciativa, depressão do humor, insociabilidade, dificuldades com as atividades diárias e cuidados pessoais. Doença vascular cerebral aguda. Distúrbios vasculares periféricos. Sintomas subjetivos associados à hipertensão arterial.

CONTRA-INDICAÇÕES

CODERGINE É CONTRA-INDICADO PARA PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER COMPONENTE DA FÓRMULA.

PRECAUÇÕES

É necessário cautela quando se deseja utilizar Codergine na presença de bradicardia grave.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Codergine pode potencializar os efeitos dos anti-hipertensivos e compostos nitrogenados. A concentração plasmática da codergocrina é aumentada com o uso concomitante a inibidores do citocromo P 450 como: antibióticos macrolídeos (por exemplo: eritromicina, claritromicina, troleandomicina, espiramicina, josamicina), antimicóticos azólicos (por exemplo: cetoconazol), inibidores de proteases (por exemplo: ritonavir, indinavir) e cimetidina.

REAÇÕES ADVERSAS

Podem ocorrer obstrução nasal e cefaléia. Distúrbios gástricos podem ocasionalmente ocorrer, mas podem ser evitados pela administração de Codergine com alimentos.

Na maioria dos casos, os efeitos colaterais desaparecem sem que se tomem medidas específicas.

POSOLOGIA

Para administração diária única a dose recomendada é de 1 cápsula à noite, antes do jantar. Nos pacientes com declínio da função mental e cognitiva, o alívio dos sintomas é normalmente gradual, manifestando-se após 3 a 4 semanas. Recomenda-se uma terapia prolongada de 3 meses ou mais e o tratamento pode ser repetido conforme o necessário. As cápsulas devem ser ingeridas inteiras com um pouco de líquido.

SUPERDOSE

Não foram observados casos com sinais graves ou sintomas de dosagem excessiva.

PACIENTES IDOSOS

Não há relatos de restrição de uso em pacientes idosos (acima de 60 anos).

Registro M.S. nº 1.0465.0272

Farm. Responsável: Dr. Marco Aurélio Limírio G. Filho - CRF-GO nº 3.524
Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: **VIDE CARTUCHO.**

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Prezado Cliente:

Você acaba de receber um produto **Neo Química**.

Em caso de alguma dúvida quanto ao produto, lote, data de fabricação, ligue para nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor.



Laboratório Neo Química Com. e Ind. Ltda.

VPR 1 - Quadra 2-A - Módulo 4 - DAIA - Anápolis - GO - CEP 75132-020

www.neoquimica.com.br

C.N.P.J.: 29.785.870/0001-03 - Indústria Brasileira



Codergine

mesilato de codergocrina



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Cápsulas 6 mg; Embalagem contendo 14 cápsulas.

USO ADULTO

USO ORAL

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula contém:

mesilato de codergocrina..... 6mg
excipientes q.s.p..... 1 cápsula
(palmitato de cetila, hipromelose, lactose e estearato de magnésio).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- Codergine melhora a captação e utilização de glicose e do oxigênio pelo cérebro, sendo eficaz na melhora de muitos dos sintomas de declínio das funções mentais.
- Conservar em temperatura ambiente (15° a 30° C). Proteger da luz e umidade.
- Prazo de Validade: **VIDE CARTUCHO**. Não use medicamento com prazo de validade vencido, poderá ocorrer diminuição significativa do seu efeito terapêutico.
- "Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término".
- "Informe seu médico se está amamentando".
- "Siga a orientação do seu médico respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento".
- "Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico".
- "Informe seu médico a ocorrência de reações desagradáveis, tais como: cefaléia, obstrução nasal e distúrbios gástricos".
- **"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS"**.
- Codergine é contra-indicado para pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula.
- É necessário cautela quando há bradicardia grave.
- "Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando antes do início ou durante o tratamento".
- **"NÃO TOME MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE"**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Codergine é eficaz na melhora de muitos dos sintomas de deterioração mental, especialmente sintomas relacionados à idade nas áreas de cuidado pessoal, comportamento social, estado emocional e desempenho mental.

Codergine modifica a neurotransmissão cerebral, havendo evidência de um efeito estimulante sobre os receptores de dopamina e serotonina e de um efeito bloqueador ao nível dos alfa-receptores. Melhora a função metabólica cerebral comprometida, um efeito que se reflete em alterações na atividade elétrica do cérebro, especialmente no padrão de potenciais ao eletroencefalograma. Foi observado que Codergine encurta o tempo de circulação cerebral.

Considera-se que seu efeito benéfico em distúrbios vasculares periféricos e em sintomas subjetivos associados à hipertensão arterial, seja devido a seu efeito dilatador sobre os esfíncteres pré-capilares e sua atividade alfa-bloqueadora.

A absorção de Codergine após administração oral é de 25%. Concentrações plasmáticas máximas são obtidas após 3,5 a 4,5 horas. A eliminação é bifásica, com meia-vida curta de 1,5 a 2,5 horas e outra mais longa, de 13 a 15 horas. É excretado principalmente com a bile nas fezes.

A eliminação com a urina chega a 2%, considerando-se o fármaco inalterado e seus metabólitos e a menos de 1%, considerando-se somente a substância inalterada.

