



# Colutóide® camomila

Extrato seco de *Matricária chamomilla L.*



## MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

### APRESENTAÇÕES:

Bisnaga com 10 g e 15 g.

### FORMA FARMACÊUTICA: GEL

### USO TÓPICO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 3 ANOS

#### Composição:

Cada grama de Colutóide® camomila contém:

Extrato seco de *Matricária chamomilla L.*

(0,03% de apigenina 7-glicosídeo).....25 mg

Excipientes\* q.s.p.....1 mg

\*Excipientes: hipromelose, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, dimeticona, propilenoglicol, aroma e água deionizada.

**Nomenclatura botânica oficial:** *Matricária chamomilla L., M. chamomilla L. pro parte, Chamomilla recutita L. Rauschert*

**Nomenclatura popular:** camomila

**Família:** Asteraceae

**Parte da planta utilizada:** flores

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Colutóide® camomila auxilia no processo de cicatrização de feridas na mucosa bucal e possui ação anti-inflamatória e antibacteriana.

#### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A *Matricária chamomilla L.* possui diversas substâncias anti-inflamatórias, tais como: o camazuleno, o alfa-bisabolol e a matricina, que auxiliam no processo de cicatrização de pequenas feridas na mucosa bucal.

#### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não usar este medicamento em caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula, aos parabenos (conservantes) e às plantas da família Compositae.

Evitar o uso excessivo durante o período de gestação.

**Não deve ser usado durante a amamentação, exceto sob orientação médica.** Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Se ocorrerem sintomas como sensação de intranquilidade, agitação, vermelhidão na face, palpitações, coceira, pulsação no ouvido, tosse, espirro, dificuldade de respirar, entre 1 e 15 minutos da administração do medicamento, é necessário procurar auxílio médico com urgência.

**De acordo com a categoria de risco destinado a mulheres grávidas, este medicamento apresenta risco C: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Este medicamento é contraindicado por lactantes e crianças menores de 3 anos de idade.**

#### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Seguir as recomendações nos seguintes casos:

**GRAVIDEZ** - Até o momento, não foram relatados efeitos adversos com o uso de Colutóide® camomila em mulheres grávidas. Entretanto, recomenda-se evitar o uso excessivo durante o período de gestação.

**LACTAÇÃO** - Colutóide® camomila não deve ser utilizado por mulheres que estejam amamentando.

**PEDIATRIA** - Colutóide® camomila não deve ser usado por crianças menores de 3 anos de idade.

**GERIATRIA (IDOSOS)** - Não há restrições específicas para o uso de Colutóide® camomila em pacientes idosos.

**Interações medicamentosas:** Não são conhecidas interações medicamentosas com o uso de Colutóide® camomila.

**Interferência em exames laboratoriais:** Não são conhecidas interferências em exames laboratoriais com o uso de Colutóide® camomila.

**Reações adversas:** Foram relatados raros casos de reações de hipersensibilidade.

Siga a orientação, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento com Colutóide® camomila. Lave e seque as mãos antes de aplicar o produto.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**





De acordo com a categoria de risco destinado a mulheres grávidas, este medicamento apresenta risco C: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou cirurgião-dentista.

#### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantenha o produto em temperatura ambiente (15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Prazo de validade:** 24 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

**“Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original”.** O Colutóide® camomila é um gel marrom homogêneo com odor característico e presença de pequenos pontos escuros. **Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

#### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Posologia:** Lavar e secar as mão antes do manuseio do produto. Aplicar uma pequena quantidade (cerca de 6 mm) de Colutóide® camomila na gengiva com a ponta do dedo seco (utilizar o dedo indicador para as regiões externas da gengiva e o dedo polegar para as regiões internas) e massagear com a mesma as mucosas. A gengiva deve ser massageada em movimentos circulares, dirigidos para a coroa do dente. Em caso de salivagem aumentada, deve-se secar a gengiva antes da massagem.

Aplicar Colutóide® camomila duas vezes ao dia, por exemplo, pela manhã e à noite, após escovar os dentes ou após as refeições.

**Via de administração:** O produto é de uso tópico (indicado para a mucosa bucal), não deve ser ingerido.

**Duração do tratamento:** Depois do desaparecimento dos sintomas, recomenda-se continuar com a aplicação de Colutóide® camomila uma vez ao dia, por algum tempo.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

#### 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso esqueça de uma dose deste medicamento, retorne a posologia sem a necessidade de suplementação.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

#### 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Foram relatados raros casos de reações de hipersensibilidade.

As informações farmacológicas existentes sobre o extrato de camomila, somadas à história de seu uso tradicional, indicam que Colutóide® camomila pode ser utilizado com segurança e de maneira eficaz nas aplicações indicadas.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.**

#### 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não são conhecidos casos de superdosagem com o uso de Colutóide® camomila.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

Reg. MS: 1.4381.0156

Farm. Resp.: Charles Ricardo Mafra - CRF-MG n° 10.883

Fabricado por:

**CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

Av. Cel. Armando Rubens Storino, 2750 - Pouso Alegre - MG

CEP: 37550-000 - CNPJ: 02.814.497/0002-98

Registrado por:

**CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

Rua Engenheiro Prudente, 121 - CEP: 01550-000 - São Paulo - SP

CNPJ: 02.814.497/0001-07 - Indústria Brasileira - ® Marca Registrada



2301662BU0212 - 90 x 185 - PH 511

