

**COMPLEXO HOMEOPÁTICO LOBELIA**  
**ALMEIDA PRADO**  
**MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO**

**49**

**FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:**

**COMPRIMIDOS** - Frasco com 60 comprimidos de 0,150 g

**VIA DE ADMINISTRAÇÃO: VIA ORAL**

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS**

**COMPOSIÇÃO** - Cada comprimido contém: *Lobelia inflata* 2CH 0,003 ml, *Grindelia robusta* 2CH 0,003 ml, *Arsenicum iodatum* 5CH 0,003 ml, *Blatta orientalis* 5CH 0,003 ml, *Natrum sulphuricum* 3CH 0,003 ml. Lactose qsp 0,150 g.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

**PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é utilizado como auxiliar no tratamento da bronquite asmática.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

**COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Todo medicamento homeopático pode ser indicado de acordo com as Escolas Médicas Homeopáticas existentes: Unicista ou Complexista. Na Unicista, “o medicamento homeopático é indicado segundo a individualidade de cada paciente e não para doenças específicas.” Na Complexista, o medicamento homeopático é indicado para o tratamento de enfermidades específicas, com comprovada ação terapêutica descrita nas Matérias Médicas Homeopáticas e com a similitude (semelhança) dos sintomas dessa doença.

Este medicamento homeopático é preparado segundo os fundamentos da homeopatia e de acordo com as técnicas descritas na Farmacopéia Homeopática Brasileira. Age através do princípio da Lei dos Semelhantes. Os componentes da fórmula deste medicamento foram devidamente experimentados em humanos.

**QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Quando o paciente for hipersensível aos componentes da fórmula.

**O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Informe ao seu prescritor sobre a gravidez durante o tratamento ou após o seu término. Informe ao seu prescritor se estiver amamentando. **Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou do cirurgião-dentista. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Este medicamento contém LACTOSE.**

**ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

O prazo de validade deste medicamento é de 24 meses a partir da data de fabricação (vide embalagem), desde que o medicamento seja conservado em local fresco, seco e ao abrigo da luz. Manter o medicamento em temperatura ambiente (15° à 30°C). Fechar a embalagem adequadamente logo após o uso.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Os comprimidos são brancos e com um símbolo AP gravado em um dos lados.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto do medicamento, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.**

**COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Uso adulto: é de 2 comprimidos a cada 2 horas por via oral. As crianças acima de 2 anos devem tomar 1 comprimido a cada 2 horas por via oral.

Os comprimidos poderão ser dissolvidos na boca ou com água.

Se você esquecer de tomar uma dose, você não deve duplicar a dose na próxima.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento. Não é necessário acordar à noite para tomar o medicamento homeopático. Mantenha sempre a dose ou o modo de tomar sugerido nesta bula. As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada.

O uso por outras vias pode envolver risco e devem estar sob a responsabilidade do prescritor.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure a orientação do seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos. O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas. Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

**O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista. Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.**

**QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Não são relatados e conhecidos males e limitações de uso dos medicamentos homeopáticos. **Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou do cirurgião dentista. Não foram realizados estudos em animais e nem em mulheres grávidas.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do Serviço de Atendimento. Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.**

**O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO ?**

A melhor conduta numa destas situações é a de espera e observação. Aumente a ingestão de líquidos. Caso ocorram vômitos ou enjôos, procure ajuda emergencial médica.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

Registro MS 1.0266.0069.001-5

Farmacêutica Responsável: Dra. Zuleika Carvalho - CRF/SP 4.142

Nº do lote, data da fabricação e data da validade: vide embalagem.

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em ( / / )



Farmácia e Laboratório Homeopático

**ALMEIDA PRADO** Ltda.

Praça Benedito Calixto 129/133 - São Paulo-SP

CNPJ 60.862.208/0001-41 - Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-116311