

COMPLEXO HOMEOPÁTICO IRIS

ALMEIDA PRADO

Iris versicolor 1CH + Chionanthus virginica 1CH + Sanguinaria canadensis 2CH

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

1

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

COMPRIMIDOS - Frasco com 60 comprimidos de 0,150 g

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: VIA ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

COMPOSIÇÃO - Cada comprimido contém: *Iris versicolor 1CH 0,005 ml*, *Chionanthus virginica 1CH 0,005 ml*, *Sanguinaria canadensis 2CH 0,005 ml*.

Excipiente: Lactose qsp 0,150 g.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é utilizado como auxiliar no tratamento das enxaquecas e cefaléias.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Todo medicamento homeopático pode ser indicado de acordo com as Escolas Médicas Homeopáticas existentes: Unicista ou Complexista.

Na Complexista, o clínico prescreve dois ou mais insumos ativos homeopáticos num único frasco, que é chamado de Complexo Homeopático. São indicados para o tratamento de enfermidades específicas, com comprovada ação terapêutica descrita nas Matérias Médicas Homeopáticas e com a similitude (semelhança) dos sintomas dessas doenças.

Este medicamento homeopático é preparado segundo os fundamentos da homeopatia e de acordo com as técnicas descritas na Farmacopéia Homeopática Brasileira. Age através do princípio da Lei dos Semelhantes. Os componentes da fórmula deste medicamento foram devidamente experimentados em humanos. Essas pessoas relataram os sinais e sintomas descritos abaixo, que apresentaram durante a experimentação. Pacientes que venham relatar ao clínico, sintomas semelhantes aos experimentados podem usar este medicamento:

IRIS VERSICOLOR: Cefaléia unilateral que tem início de manhã depois de ter andado ao ar livre ou depois de um movimento rápido. Aparece geralmente em indivíduos sobrecarregados de trabalho, ou em indivíduos hepáticos ou com dispepsia ácida e principalmente, no tempo quente. É precedida por distúrbios oculares e vem acompanhada de ardência estomacal ou vômitos ácidos viscosos, com suores e sensação de calor no corpo. A cefaléia é geralmente unilateral, periódica, frontal ou supra-orbitária direita, pulsátil e acompanhada de salivação abundante e viscosa.

CHIONANTHUS VIRGINICA: Congestão do fígado com enxaqueca biliosa ou icterícia. Cefaléia violenta, como se a cabeça fosse partir em pedaços. Piora pelo movimento, tosse, riso e sono e, melhora pelo repouso, deitando-se, pela pressão.

SANGUINARIA CANADENSIS: Enxaqueca periódica muito intensa, começando de manhã, aumentando em torno do meio dia e atenuando-se a noite. A dor começa na região occipital e se propaga para frente para o resto da cabeça, fixando-se no olho direito ou região temporal direita. Batimentos violentos na cabeça acompanhados de vômitos biliosos, piorando com movimentos, luz, odores e ruídos, e melhorando num quarto quente, deitando-se no escuro, pelo sono e depois dos vômitos, micção ou emissão de gases.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Quando o paciente for hipersensível aos componentes da fórmula.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Informe ao seu prescritor sobre a gravidez durante o tratamento ou após o seu término. Informe ao seu prescritor se estiver amamentando. **Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Este medicamento contém LACTOSE.**

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O prazo de validade deste medicamento é de 24 meses a partir da data de fabricação (vide embalagem), desde que o medicamento seja conservado em local fresco, seco e ao abrigo da luz. Manter o medicamento em temperatura ambiente (15° à 30°C). Fechar a embalagem adequadamente logo após o uso.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Guarde-o em sua embalagem original.

Os comprimidos são brancos e com um símbolo AP gravado em um dos lados.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto do medicamento, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Uso adulto: é de 2 comprimidos a cada 2 horas por via oral.

As crianças acima de 2 anos devem tomar 1 comprimido a cada 2 horas por via oral.

Os comprimidos poderão ser dissolvidos na boca ou com água.

Se você esquecer de tomar uma dose, você não deve duplicar a dose na próxima.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Não é necessário acordar à noite para tomar o medicamento homeopático.

Mantenha sempre a dose ou o modo de tomar sugerido nesta bula.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e devem estar sob a responsabilidade do prescritor.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure a orientação do seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista. Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não são relatados e conhecidos males e limitações de uso dos medicamentos homeopáticos.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do Serviço de Atendimento. Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

A melhor conduta numa destas situações é a de espera e observação. Aumente a ingestão de líquidos. Caso ocorram vômitos ou enjôos, procure ajuda emergencial médica.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou a bula do medicamento, se possível.

Ligue para 0800 722 6001, se precisar de mais orientações.

Registro MS 1.0266.0031.001-2

Farmacêutica Responsável: Dra. Zuleika Carvalho - CRF/SP 4.142

Nº do lote, data da fabricação e data da validade: vide embalagem.

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em (/ /)



Farmácia e Laboratório Homeopático

ALMEIDA PRADO Ltda.

Praça Benedito Calixto 129/133 - São Paulo-SP

CNPJ 60.862.208/0001-41 - Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-116311