



DERMATOLÓGICOS

# CORTAVANCE®

Aceponato de hidrocortisona a 0,584 mg/mL

SOLUÇÃO TÓPICA PARA CÃES

## USO VETERINÁRIO

### ■ PROPRIEDADES

O aceponato de hidrocortisona (HCA) pertence a uma nova classe de ésteres duplos de corticosteróides não halogenados.

A ligação do HCA a receptores de glicocorticóides induz a translocação destes para o núcleo celular, onde regularão a atividade de genes pró-inflamatórios como o II-1-alfa e a síntese de enzimas como a fosfolipase A2, substâncias diretamente envolvidas no processo inflamatório.

Após aplicação tópica, o CORTAVANCE® apresenta um efeito reservatório: devido às suas propriedades lipofílicas, o HCA penetra na epiderme, mas fica retido entre esta e a derme, onde exerce sua ação. Apenas pequeníssimas quantidades alcançam a circulação sistêmica.

### ■ FÓRMULA

Cada 100 mL contêm:

Aceponato de hidrocortisona ..... 0,05842 g  
Veículo.....q.s.p ..... 100 mL

### ■ INDICAÇÕES

Tratamento sintomático do prurido e inflamação em cães, decorrentes de dermatoses tais como: dermatite alérgica a picada de pulgas (DAPP), dermatite úmida aguda (DUA), dermatite alérgica de contato e dermatite atópica.

### ■ POSOLOGIA E MODO DE USAR

Remover a tampa do frasco e rosquear, em seu lugar, o bico aplicador mecânico.

Aplicar duas borrifadas do spray para cada 100 cm<sup>2</sup> de área afetada, o que corresponde à dose de 1,52 µg de aceponato de hidrocortisona/cm<sup>2</sup>, 1 vez ao dia, durante 7 dias.


Para alguns animais que não responderem ao tratamento nos primeiros 7 dias, continuar a terapia por mais 7 dias.

### ■ CONTRAINDICAÇÕES

Não administrar o produto sobre úlceras cutâneas.

### ■ ADVERTÊNCIAS

- Somente utilizar o produto por via tópica.
- Instituir tratamento adequado, de acordo com prescrição do Médico Veterinário, caso a dermatose seja decorrente de infecções bacterianas, fúngicas ou parasitárias.
- O Médico Veterinário deve realizar avaliações clínicas regulares em animais com Síndrome de Cushing ou com menos de 7 meses de idade, durante o tratamento com o produto.
- A segurança do CORTAVANCE® não foi estabelecida em fêmeas gestantes e lactantes. O uso do produto nestes casos deve ficar a critério do Médico Veterinário.
- CORTAVANCE® é irritante para os olhos; evitar o contato do produto com os olhos do paciente e do aplicador.
- Sinais como andar cambaleante, piloereção, ptose, diminuição da atividade motora e problemas respiratórios foram observados quando o produto foi utilizado pelas vias inalatória ou oral.



- Não molhar o animal até 4 horas após a aplicação do produto. Caso isto ocorra, reaplicá-lo.
- Lavar as mãos após a aplicação do produto.
- Em caso de contato acidental com pele ou olhos, lavar abundantemente com água.
- Este produto pode manchar tecidos em geral, superfícies de madeira, couro e pintadas. Por isso, recomenda-se aguardar a completa secagem do produto, antes de colocar o animal em contato com essas superfícies.

#### ■ INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas até o presente momento.

**Conservar em local seco e fresco, entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz. Nestas condições, o produto é válido por 2 (dois) anos após a data da fabricação.**

**Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

#### ■ APRESENTAÇÃO

Frasco com 76 ml, acompanhado por bico aplicador mecânico.

**Ligue para C. A.S. A.: 0800 13 65 33**

**Marca Registrada® PRODUTO IMPORTADO**