



quando houver necessidade evidente. Devido às suas características físico-químicas, é improvável que o cromoglicato seja excretado no leite materno.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não foi observada nenhuma interação com outros fármacos.

REAÇÕES ADVERSAS

As reações graves são raras. Quando aplicado por instilação nasal, pode sobrevir leve irritação transitória da mucosa nasal.

POSOLOGIA

Adultos e Crianças :

- * Solução a 4% : Uma aplicação em cada narina, 2 a 4 vezes ao dia.
- * Recomenda-se o tratamento contínuo durante o período de exposição ao alérgeno, mesmo na ausência de sintomas.

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1 - Remova a tampa do frasco, puxando-a para cima. Retire o lacre azul.
- 2 - Preparar o frasco de Cromocato® antes do uso, da seguinte maneira:
 - Mantenha o frasco na posição vertical (sobre o dedo polegar) e o atuador entre os dedos indicador e médio, apoiados sobre as abas laterais do frasco.
 - Empurre o fundo do frasco (com o dedo polegar) para cima, de modo que as abas laterais desçam de maneira firme e rápida.
- 3 - Repita esta operação por no mínimo 3 vezes (obtendo, assim, um fino spray).
 - Mantenha o frasco na posição vertical (sobre o dedo polegar) e o atuador entre os dedos indicador e médio, apoiados sobre as abas laterais do frasco. Introduza a ponta do mesmo em uma das narinas, tampe a outra narina com o outro dedo e mantenha a boca fechada. Empurre o fundo do frasco (com o dedo polegar) para cima, de modo que as abas laterais desçam de maneira firme e rápida, apenas 1 vez, administrando assim, uma dose de Cromocato®.
- 4 - Expire através da boca e repita o procedimento descrito no item 3 para administrar Cromocato® na outra narina.
- 5 - Limpe a ponta do frasco com um lenço (após o uso) e recolóque a tampa, pressionando-a firmemente sobre o frasco.



SUPERDOSE

O cromoglicato dissódico apresenta um nível excepcionalmente baixo de toxicidade local ou sistêmica, e estudos extensos com o produto não revelaram qualquer perigo para os pacientes. É improvável que a superdose cause algum problema, porém, caso haja suspeita, o tratamento deve ser de suporte e direcionado ao controle dos sintomas.

PACIENTES IDOSOS

Não há recomendações ou advertências especiais para pacientes acima de 60 anos de idade.

Registro M.S. nº 1.0465.0259
Farm. Resp: Dr. Marco Aurélio Limirio G. Filho - CRF-GO nº 3.524
Número do Lote, Data de Fabricação e Prazo de Validade: **VIDE CARTUCHO**

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Prezado Cliente:

Você acaba de receber um produto Neo Química.

Em caso de alguma dúvida quanto ao produto, lote, data de fabricação, ligue para nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor.



Laboratório Neo Química Com. e Ind. Ltda.

VP R 1 - Quadra 2-A - Módulo 4 - DAIA - Anápolis - GO - CEP 75132-020

www.neoquimica.com.br

C.N.P.J.: 29.785.870/0001-03 - Indústria Brasileira



Cromocato®

cromoglicato dissódico



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Solução Nasal a 4% : Embalagem com frasco contendo 13mL.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO NASAL

COMPOSIÇÃO

Cada mL da solução nasal a 4% contém:

cromoglicato dissódico.....40mg
veículo q.s.p.....1mL
(cloreto de benzalcônio, EDTA dissódico, água purificada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- Cromocato® tem ação na prevenção da rinite alérgica.
- Conservar em temperatura ambiente (15° a 30° C). Proteger da luz e umidade.
- Prazo de validade: **VIDE CARTUCHO**. Não use medicamento com o prazo de validade vencido; poderá ocorrer diminuição significativa do seu efeito terapêutico.
- "Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término". "Informe seu médico se está amamentando".
- "Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento".
- "Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico".
- "Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: irritação da garganta, tosse ou broncoespasmo transitório".
- **"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS"**.
- Até o momento, não foi observada nenhuma evidência de interação medicamentosa com o cromoglicato.
- Por se tratar de medicação profilática, é importante que o paciente mantenha uma dosagem constante (mesmo na ausência de sintomas).
- Contra-indicado para pacientes com hipersensibilidade conhecida ao cromoglicato dissódico ou aos demais componentes da fórmula.
- "Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando antes do início ou durante o tratamento".
- **"NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE"**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O cromoglicato dissódico corresponde ao sal dissódico derivado da bicroma. Seu mecanismo de ação consiste na inibição da liberação de histamina, leucotrienos e outras substâncias dos mastócitos, que causam reação de hipersensibilidade (provavelmente interferindo com o transporte de cálcio através da membrana dos mastócitos). Ele inibe a desgranulação dos mastócitos sensibilizados por alérgenos específicos.

INDICAÇÕES

Cromocato® solução nasal a 4% é indicado para a profilaxia da rinite alérgica (sazonal e perene).

CONTRA-INDICAÇÕES

O PRODUTO É CONTRA-INDICADO PARA PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA AO CROMOGLICATO DISSÓDICO OU AOS DEMAIS COMPONENTES DA FÓRMULA.

PRECAUÇÕES

O cromoglicato dissódico atua de maneira profilática; é importante o tratamento contínuo dos pacientes que dele se beneficiam.

Se for necessário interromper o tratamento, isto deve ser feito de maneira gradual (durante uma semana).

Consequindo-se a redução da dosagem de corticóides durante o tratamento com Cromocato®, o corticóide não deve ser retirado até que a cobertura adequada tenha sido obtida.

Gravidez e lactação: A experiência acumulada com o cromoglicato dissódico sugere que ele não apresenta qualquer efeito sobre o desenvolvimento fetal. Contudo, seu uso durante a gravidez somente deve ser feito

