AGENER UNIÃO
SAÚDE ANIMAL

# Flamavet®
## Meloxicam

**ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL DE USO ORAL PARA CÃES**

**Fórmula:**
Cada comprimido de **Flamavet 0,5 mg** contém:
Meloxicam ..... 0,5 mg
Excipientes (*) .....q.s.p..... 60 mg
***contém palatabilizante**

Cada comprimido de **Flamavet 2 mg** contém:
Meloxicam ..... 2 mg
Excipientes (*) .....q.s.p..... 240 mg
***contém palatabilizante**

**Informações técnicas:**
**Meloxicam** é classificado como um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), que possui atividade analgésica e antipirética. Pertence à classe do ácido enólico, um dos derivados de Oxicam. Esta classe de fármacos inibe a atividade da enzima ciclo-oxigenase (COX), da fosfolipase A2 e da síntese de prostaglandinas. Os AINEs podem ter sua maior ou menor segurança, de acordo com o grau de seletividade perante as ciclo-oxigenase (COX), enzimas que participam da síntese de prostaglandinas. As COX podem ser classificadas de maneira simplificada como COX-1, que é expressa constitutivamente na maioria dos tecidos e está associada a eventos fisiológicos como a integridade da mucosa gástrica, fluxo sanguíneo renal e na coagulação sanguínea, e COX-2, que é uma enzima de ação induzida relacionada aos eventos da resposta inflamatória. Como o meloxicam apresenta atividade seletiva para COX-2, isto confere uma segurança maior em relação aos efeitos adversos.

**Indicações:**
**Flamavet** é indicado como anti-inflamatório e analgésico para cães.

**Posologia e modo de usar:**
O produto deve ser administrado exclusivamente pela via oral.

Administrar o comprimido uma vez ao dia, em dosagem de acordo com a tabela abaixo:

| Dosagem | Primeiro dia de tratamento | 2º dia e tratamentos subsequentes |
|---|---|---|
| **Flamavet 0,5 mg** | 2 comprimidos para cada 5 kg de peso corporal (0,2mg de meloxicam / kg de peso corporal) | 1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal (0,1mg de meloxicam / kg de peso corporal) |
| **Flamavet 2 mg** | 1 comprimido para cada 10 kg de peso corporal (0,2mg de meloxicam / kg de peso corporal) | ½ comprimido para cada 10 kg de peso corporal (0,1mg de meloxicam / kg de peso corporal |

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro. De acordo com os estudos de segurança realizados, para tratamento em cães adultos pode ser indicada terapia prolongada por até 35 dias consecutivos e em cães filhotes (a partir de 4 meses) pode ser indicada terapia por até 7 dias consecutivos, ou a critério do Médico Veterinário.

**Contraindicações:**
O produto não deve ser administrado em animais com antecedentes de hipersensibilidade ao meloxicam ou qualquer um dos componentes da fórmula.
Não administrar o produto aos animais com histórico de ulceração gastrointestinal ativa.
Deve ser utilizado com cautela em pacientes hepatopatas, cardiopatas, doentes renais e com distúrbios hematológicos.

**Interações medicamentosas:**
Não administrar o **Flamavet** junto com outros anti-inflamatórios esteroidais ou não esteroidais e anticoagulantes devido ao maior risco de toxicidade gastrointestinal e sangramentos. Não utilizar com as medicações: digoxina,

fluconazol, metotrexato e drogas nefrotóxicas como furosemida, antibióticos aminoglicosídeos, entre outros. Alguns AINES podem reduzir o efeito dos inibidores da ECA sobre a pressão arterial e aumentar o risco de nefrotoxicidade.

**Efeitos adversos:**
Os efeitos adversos mais comumente relatados são náuseas, perda de apetite, apatia, diarreia, melena e ulceração gástrica. Elevação de enzimas hepáticas, prurido, azotemia, aumento da creatinina e falência renal também já foram descritos.

**Intoxicação e Superdosagem:**
No caso de intoxicação e superdosagem, realizar o tratamento suporte e sintomático, a critério do médico veterinário.

**Precauções:**
Produtos de uso veterinário devem ser mantidos fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas ou produtos de higiene pessoal.
Até o momento, não foram realizados estudos em animais abaixo de 4 meses, fêmeas prenhes ou lactantes.

*A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porém foram conduzidos estudos pela empresa fabricante que demonstraram que o produto apresenta as características desejadas e necessárias de eficácia e segurança para a indicação a que se destina obtendo, dessa forma, emissão de Licença Provisória.*

**Apresentação:**

Blister com 10 comprimidos, nas apresentações de 0,5 mg e 2,0 mg.

Display contendo 5 blísteres com 10 comprimidos de 0,5 mg e 2,0 mg.

Conservar em local seco, a temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO**
**SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, sob o número 18/2017,
em 12/06/2017.

Responsável Técnico:
Vânia N. A. de Carvalho
CRF-SP nº 32.871

AGENER UNIÃO
SAÚDE ANIMAL

Proprietário e Fabricante:
**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90
Embu-Guaçu – São Paulo – CEP: 06900-000
DDG: 0800 701 1799 – CNPJ: 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira

4014973 - 150 x 250 mm - Laetus 248

AGENER UNIÃO
SAÚDE ANIMAL

# Flamavet
## Meloxicam 0,2 %

**USO VETERINÁRIO**

**ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL PARA CÃES E GATOS**

**Fórmula:**
Cada 1,0 mL contém:
Meloxicam ..... 2,0 mg
Veículo q.s.p ..... 1,0 mL

**Informações técnicas:**
**Meloxicam** é classificado como um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), que possui atividade analgésica e antipirética. Pertence à classe do ácido enólico, um dos derivados de Oxicam. Esta classe de fármacos inibe a atividade da enzima ciclo-oxigenase (COX), da fosfolipase A2 e da síntese de prostaglandinas. Os AINEs podem ter sua maior ou menor segurança, de acordo com o grau de seletividade perante as ciclo-oxigenase (COX), enzimas que participam da síntese de prostaglandinas. As COX podem ser classificadas de maneira simplificada como COX-1, que é expressa constitutivamente na maioria dos tecidos e está associada a eventos fisiológicos como a integridade da mucosa gástrica, fluxo sanguíneo renal e na coagulação sanguínea, e COX-2, que é uma enzima de ação induzida relacionada aos eventos da resposta inflamatória. Como o meloxicam apresenta atividade seletiva para COX-2, isto confere uma segurança maior em relação aos efeitos adversos.

**Indicações:**
**Flamavet 0,2%** é indicado como anti-inflamatório e analgésico para cães e gatos.

**Posologia e modo de usar:**
Administrar **Flamavet 0,2%** uma vez ao dia, de acordo com a tabela abaixo:

| Espécie | 1º dia de tratamento | 2º dia e tratamentos subsequentes | Via de Administração |
|---|---|---|---|
| Cães | 0,2 mg/kg | 0,1 mg/kg | IV ou SC |
| Gatos | 0,1 mg/kg | 0,05 mg/kg | SC |

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro. De acordo com os estudos de segurança realizados, a duração do tratamento poderá ser extrapolada por até 7 dias em cães adultos e até 4 dias em gatos adultos, ou a critério do Médico Veterinário.

**Contraindicações:**
Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido.
Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.
Não administrar o produto em animais com histórico de ulceração gastrointestinal ativa.
Deve ser utilizado com cautela em pacientes hepatopatas, cardiopatas, doentes renais e com distúrbios hematológicos.
Não utilizar em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos, já que nesses quadros haverá um risco maior de toxidade renal.

**Interações medicamentosas:**
Não administrar o **Flamavet 0,2%** junto com outros anti-inflamatórios esteroidais ou não esteroidais e anticoagulantes devido ao maior risco de toxicidade gastrointestinal e sangramentos. Não utilizar com

as medicações: digoxina, fluconazol, metotrexato e drogas nefrotóxicas como furosemida, antibióticos aminoglicosídeos, entre outros. Alguns AINES podem reduzir o efeito dos inibidores da ECA sobre a pressão arterial e aumentar o risco de nefrotoxicidade.

**Efeitos adversos:**
Os efeitos adversos mais comumente relatados são náuseas, vômitos, perda de apetite, apatia, diarreia, melena e ulceração gástrica. Elevação de enzimas hepáticas, prurido, azotemia, aumento da creatinina e falência renal também já foram descritos.
Como outros anti-inflamatórios não esteroidais inibidores de COX-2, meloxicam pode apresentar efeitos na função plaquetária.
Em casos de anafilaxia, interromper o uso do medicamento imediatamente.

**Precauções:**
- Uso exclusivo em cães e gatos, na posologia indicada em bula.
- Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo.
- Ler a bula atentamente antes de administrar o produto.
- Manter o produto em sua embalagem original.
- Manter o produto livre de contaminações externas.
- Até o momento, não foram realizados estudos em animais jovens, fêmeas prenhes ou lactantes.

*A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porém foram conduzidos estudos pela empresa fabricante que demonstraram que o produto apresenta as características desejadas e necessárias de eficácia e segurança para a indicação a que se destina obtendo, dessa forma, emissão de Licença Provisória.*

**Superdosagem:**
No caso de superdosagem, realizar o tratamento suporte e sintomático, a critério do médico veterinário.

**Apresentação:**
Frasco de vidro incolor de 20 mL

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15ºC a 30ºC), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Após abertura do frasco, o conteúdo deve ser utilizado em até 30 dias.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**
**SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob o nº 30/2018 em 05/02/2018.

Responsável Técnico:
Vânia N. A. de Carvalho
CRF-SP nº 32.871

AGENER UNIÃO
SAÚDE ANIMAL

Proprietário e Fabricante:
**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90
Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000
DDG 0800 701 1799
CNPJ 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira

4020574 - 100X150 mm - Laetus 251