DADOS DO ANIMAL

Nome:

Endereço:

Tel:

e-mail:

CPF:

Nome:

Idade:

Raça:

Peso:

FRONTLINE® TOPSPOT

Cães

Boehringer Ingelheim

FRONTLINE® TOPSPOT

Boehringer Ingelheim

USO VETERINÁRIO
Cães

1 pipeta de 0,67 mL

Solução tópica para tratamento à base de Fipronil

Mata Pulgas, Carrapatos e Piolhos em Cães.
Aplicação Tópica

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA

Cada 100 mL contêm:
Fipronil.....10 g
Veículo q.s.p. .....100 mL

INDICAÇÕES

Cães (*adultos e filhotes*): tratamento e controle de infestações por pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores. Auxilia no controle da sarna sarcóptica em cães (tratamentos mensais consecutivos são recomendados para o controle dos ácaros).

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla novas infestações por pulgas por até 3 meses após a aplicação.

Para tratamento e controle da Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas (DAPP), recomendamos fazer aplicações mensais para animais alérgicos (DAPP) e em outros cães e gatos que com eles convivem, usando o produto específico de cada espécie.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla as reinfestações provocadas por todas as fases de desenvolvimento dos carrapatos dos gêneros *Rhipicephalus, Dermacentor, Amblyomma* (vetor da Febre Maculosa), *Haemaphysalis* e *Ixodes* (principal vetor da Doença de Lyme humana e canina); protegendo os animais por até cinco semanas.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla as infestações provocadas por piolhos mastigadores do gênero *Trichodectes* em cães adultos e filhotes.



FASES DO DESENVOLVIMENTO DAS PULGAS

MECANISMO DE AÇÃO

Fipronil é um inseticida e acaricida altamente efetivo pertencente à família dos fenilpirazóis. Seu mecanismo de ação baseia-se no bloqueio pré e pós-sináptico da passagem dos íons cloro pelos neurotransmissores GABA, matando os parasitas por hiper-excitação. Fipronil apresenta afinidade pela gordura presente na superfície da pele e nos folículos pilosos, sendo constantemente re-excretado junto à secreção sebácea sobre a pele e pêlo dos animais, o que resulta em seu longo período de efeito residual.

DOSES E MODO DE USAR

Dose: ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** apresenta-se em pipetas de dose única conforme descritas abaixo, que contêm a dose mínima recomendada de 6,7 mg/kg de Fipronil para cães.

Cães: uma pipeta de 0,67 mL/cão com 1 a 10 Kg de peso;
uma pipeta de 1,34 mL/cão com 10 a 20 Kg de peso;
uma pipeta de 2,68 mL/cão com 20 a 40 Kg de peso;
uma pipeta de 4,02 mL/cão com mais de 40 Kg de peso.

Para cães com mais de 60 Kg de peso, usar 1 pipeta de 4,02 mL + 1 pipeta menor para obter a dose certa, de acordo com o peso do animal.

Recomendamos uma aplicação mensal onde haja um alto risco de reinfestação, caso o cão seja alérgico à picada de pulgas (DAPP) ou em situações onde seja necessário o controle de carrapatos. Em áreas com infestações menos graves ou onde os carrapatos não sejam uma ameaça, ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** pode ser aplicado contra pulgas com intervalos de um até três meses de acordo com o desafio.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES pode ser aplicado em filhotes a partir da 8ª semana de idade e em cadelas prenhes e em lactação.

Modo de usar: Produto somente de aplicação tópica (uso externo).

Quebrar a ponta da pipeta na altura da linha tracejada. Afastar o pêlo do animal na região entre a nuca e a base do pescoço à frente das escápulas até aparecer a pele. Colocar a ponta da pipeta sobre a pele e apertar várias vezes até esvaziar todo seu conteúdo diretamente em vários pontos, para evitar que o produto escorra.

Evitar esfregar a pele após a aplicação do produto e evitar colocar coleiras de couro ou de tecido no animal tratado até que o pêlo esteja bem seco.

Dose única. Não se recomenda o fracionamento do produto

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES não é repelente, matando pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores que entrarem em contato com o animal. Os carrapatos estarão mortos nas primeiras 48 horas após o contato com o produto, por esta razão, a possibilidade de transmissão de doenças infecciosas não pode ser completamente excluída. A maioria dos carrapatos mortos cairá do corpo do animal, enquanto que os que permanecerem poderão ser retirados facilmente.

As formas imaturas das pulgas já presentes no meio ambiente no momento da aplicação (ovos, larvas e pupas) podem continuar seus ciclos, havendo reinfestação dos animais após o tratamento. Deste modo, para diminuir a infestação ambiental, uma completa limpeza e aspiração do ambiente em que o animal se encontra, incluindo cobertores e mantas, deve ser realizada pelo uso de produtos adequados para este fim. Consulte seu veterinário para maiores informações.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES é um tratamento prático, seguro e eficaz contra pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores dos cães.

- Ação rápida;
- Pode ser utilizado em cadelas gestantes e em lactação;
- No caso de DAPP, recomenda-se aplicação mensal do produto;
- Proteção prolongada;
- Protege cães contra pulgas por até 3 meses e contra carrapatos por até 1 mês;
- Elimina rapidamente a causa da Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas;
- Fácil aplicação;
- Mesmo aplicado logo após o banho, ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** garante proteção contra pulgas por pelo menos 45 dias.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES possui modo de ação único, eliminando as pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores com total segurança para os cães e para as pessoas que com eles convivem.

PRECAUÇÕES

Produto para uso externo somente em cães. **Este produto foi especialmente desenvolvido para cães. Para gatos utilize *FRONTLINE® TOPSPOT GATOS*.**

CONTRA-INDICAÇÕES

Em virtude da ausência de dados específicos, o produto não deve ser utilizado em filhotes de cães com menos de 8 semanas de vida. Não utilize em coelhos, pois reações adversas, incluindo a morte, podem ocorrer.

SEGURANÇA

A segurança do ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** foi demonstrada em filhotes de cães a partir de oito semanas de idade mesmo quando administrado em intervalos de 28 dias durante 6 aplicações consecutivas em doses até 5 vezes mais altas que a dose máxima recomendada. A segurança de ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** foi demonstrada em cadelas nas fases de reprodução, gestação e lactação tratadas com doses até 3 vezes a dose máxima recomendada, em aplicações múltiplas sucessivas a cada 28 dias.

EFEITOS ADVERSOS

Embora ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** apresente um elevado nível de segurança, caso o animal lamba o produto, pode-se observar um curto período de hipersalivação em decorrência da natureza do veículo utilizado no mesmo.

Dentre as raras suspeitas de reação adversa ao produto, foram reportados casos de reação cutânea transitória no local de aplicação (discromia da pele, alopecia local, prurido e eritema) e prurido sistêmico ou alopecia após seu uso.

Evite o contato do produto com os olhos dos animais.

Não utilize o produto em sobredosagem, pois o risco de reações adversas pode aumentar. Em caso de suspeita de reações adversas procure imediatamente o Médico Veterinário.

Caso necessário entre em contato com nosso serviço gratuito de atendimento ao consumidor.

EFEITOS SECUNDÁRIOS EVENTUAIS

A aplicação do produto pode causar uma aparência pegajosa dos pêlos no ponto de aplicação. Entretanto, caso isso ocorra, esta alteração deve se resolver dentro de 24 horas após a aplicação do produto.

INTERAÇÃO COM OUTROS MEDICAMENTOS

Não são conhecidas.

SEGURANÇA AMBIENTAL

Frascos e restos do produto devem ser descartados em local apropriado.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS A SEREM TOMADAS PELAS PESSOAS QUE ESTEJAM APLICANDO O PRODUTO AOS ANIMAIS

Este produto pode causar irritação das mucosas e dos olhos. Desta forma, deve-se evitar o contato do produto com a boca e os olhos. Caso ocorra contato acidental do produto com os olhos, lave-os cuidadosamente com água pura.

Como todo tratamento tópico com inseticidas lavar as mãos com água e sabão após o uso do produto; não fumar, beber ou comer durante a aplicação; manter fora do alcance das crianças; evitar contato do produto com as mãos.

APRESENTAÇÃO

Pipetas plásticas contendo 0,67, 1,34, 2,68 e 4,02mL (cães), acondicionadas em cartela com 1 pipeta.

CONSERVAÇÃO

Manter em local seco e fresco e sob temperatura de até 30°C.

FRONTLINE® TOPSPOT

Boehringer Ingelheim

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

1



Quebre a ponta da pipeta na linha demarcada, abrindo-a.

2



Afaste o pêlo e aplique o produto diretamente na pele.

3

Aplique todo o conteúdo entre a região da nuca e as escápulas, em vários pontos, para que não escorra no pêlo do animal.

Para obter o máximo efeito residual, evite banhar o animal 48 horas antes e após a aplicação.

Embalado por Mappel Indústria de Embalagens Ltda. CNPJ 01.233.103/0001-64
147L02-003

FRONTLINE® Boehringer Ingelheim
(Fipronil)
USO VETERINÁRIO TOPSPOT

Cães

Entre 1 e 10 kg de peso

Contém 1 pipeta de 0,67 mL

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:
Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda
Fazenda São Francisco - Paulínia - SP
CNPJ 57.600.249/0001-55
Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 5.765 em 11/12/1996

Produto importado

SAC 0800-8887387
Resp. Técn.: Simone B. Zampieri - CRMV-SP 19.996
Proprietário e fabricante: ***Merial - França***
7 898053 772554

DADOS DO ANIMAL

Nome:

Endereço:

Tel:

CPF:

e-mail:

Nome:

Idade:

Raça:

Peso:

FRONTLINE® TOPSPOT

Cães

Boehringer Ingelheim

FRONTLINE® TOPSPOT

Boehringer Ingelheim

USO VETERINÁRIO
Cães

1 pipeta de 1,34 mL

Solução tópica para tratamento à base de Fipronil

Mata Pulgas, Carrapatos e Piolhos em Cães.
Aplicação Tópica

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA

Cada 100 mL contêm:
Fipronil.....10 g
Veículo q.s.p. .....100 mL

INDICAÇÕES

Cães (*adultos e filhotes*): tratamento e controle de infestações por pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores. Auxilia no controle da sarna sarcóptica em cães (tratamentos mensais consecutivos são recomendados para o controle dos ácaros).

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla novas infestações por pulgas por até 3 meses após a aplicação.

Para tratamento e controle da Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas (DAPP), recomendamos fazer aplicações mensais para animais alérgicos (DAPP) e em outros cães e gatos que com eles convivem, usando o produto específico de cada espécie.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla as reinfestações provocadas por todas as fases de desenvolvimento dos carrapatos dos gêneros *Rhipicephalus, Dermacentor, Amblyomma* (vetor da Febre Maculosa), *Haemaphysalis* e *Ixodes* (principal vetor da Doença de Lyme humana e canina); protegendo os animais por até cinco semanas.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla as infestações provocadas por piolhos mastigadores do gênero *Trichodectes* em cães adultos e filhotes.



FASES DO DESENVOLVIMENTO DAS PULGAS

MECANISMO DE AÇÃO

Fipronil é um inseticida e acaricida altamente efetivo pertencente à família dos fenilpirazóis. Seu mecanismo de ação baseia-se no bloqueio pré e pós-sináptico da passagem dos íons cloro pelos neurotransmissores GABA, matando os parasitas por hiper-excitação. Fipronil apresenta afinidade pela gordura presente na superfície da pele e nos folículos pilosos, sendo constantemente re-excretado junto à secreção sebácea sobre a pele e pêlo dos animais, o que resulta em seu longo período de efeito residual.

DOSES E MODO DE USAR

Dose: ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** apresenta-se em pipetas de dose única conforme descritas abaixo, que contêm a dose mínima recomendada de 6,7 mg/kg de Fipronil para cães.

Cães: uma pipeta de 0,67 mL/cão com 1 a 10 Kg de peso;
uma pipeta de 1,34 mL/cão com 10 a 20 Kg de peso;
uma pipeta de 2,68 mL/cão com 20 a 40 Kg de peso;
uma pipeta de 4,02 mL/cão com mais de 40 Kg de peso.

Para cães com mais de 60 Kg de peso, usar 1 pipeta de 4,02 mL + 1 pipeta menor para obter a dose certa, de acordo com o peso do animal.

Recomendamos uma aplicação mensal onde haja um alto risco de reinfestação, caso o cão seja alérgico à picada de pulgas (DAPP) ou em situações onde seja necessário o controle de carrapatos. Em áreas com infestações menos graves ou onde os carrapatos não sejam uma ameaça, ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** pode ser aplicado contra pulgas com intervalos de um até três meses de acordo com o desafio.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES pode ser aplicado em filhotes a partir da 8ª semana de idade e em cadelas prenhes e em lactação.

Modo de usar: Produto somente de aplicação tópica (uso externo).

Quebrar a ponta da pipeta na altura da linha tracejada. Afastar o pêlo do animal na região entre a nuca e a base do pescoço à frente das escápulas até aparecer a pele. Colocar a ponta da pipeta sobre a pele e apertar várias vezes até esvaziar todo seu conteúdo diretamente em vários pontos, para evitar que o produto escorra.

Evitar esfregar a pele após a aplicação do produto e evitar colocar coleiras de couro ou de tecido no animal tratado até que o pêlo esteja bem seco.

Dose única. Não se recomenda o fracionamento do produto

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES não é repelente, matando pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores que entrarem em contato com o animal. Os carrapatos estarão mortos nas primeiras 48 horas após o contato com o produto, por esta razão, a possibilidade de transmissão de doenças infecciosas não pode ser completamente excluída. A maioria dos carrapatos mortos cairá do corpo do animal, enquanto que os que permanecerem poderão ser retirados facilmente.

As formas imaturas das pulgas já presentes no meio ambiente no momento da aplicação (ovos, larvas e pupas) podem continuar seus ciclos, havendo reinfestação dos animais após o tratamento. Deste modo, para diminuir a infestação ambiental, uma completa limpeza e aspiração do ambiente em que o animal se encontra, incluindo cobertores e mantas, deve ser realizada pelo uso de produtos adequados para este fim. Consulte seu veterinário para maiores informações.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES é um tratamento prático, seguro e eficaz contra pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores dos cães.

- Ação rápida;
- Pode ser utilizado em cadelas gestantes e em lactação;
- No caso de DAPP, recomenda-se aplicação mensal do produto;
- Proteção prolongada;
- Protege cães contra pulgas por até 3 meses e contra carrapatos por até 1 mês;
- Elimina rapidamente a causa da Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas;
- Fácil aplicação;
- Mesmo aplicado logo após o banho, ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** garante proteção contra pulgas por pelo menos 45 dias.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES possui modo de ação único, eliminando as pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores com total segurança para os cães e para as pessoas que com eles convivem.

PRECAUÇÕES

Produto para uso externo somente em cães. **Este produto foi especialmente desenvolvido para cães. Para gatos utilize *FRONTLINE® TOPSPOT GATOS*.**

CONTRA-INDICAÇÕES

Em virtude da ausência de dados específicos, o produto não deve ser utilizado em filhotes de cães com menos de 8 semanas de vida. Não utilize em coelhos, pois reações adversas, incluindo a morte, podem ocorrer.

SEGURANÇA

A segurança do ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** foi demonstrada em filhotes de cães a partir de oito semanas de idade mesmo quando administrado em intervalos de 28 dias durante 6 aplicações consecutivas em doses até 5 vezes mais altas que a dose máxima recomendada. A segurança de ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** foi demonstrada em cadelas nas fases de reprodução, gestação e lactação tratadas com doses até 3 vezes a dose máxima recomendada, em aplicações múltiplas sucessivas a cada 28 dias.

EFEITOS ADVERSOS

Embora ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** apresente um elevado nível de segurança, caso o animal lamba o produto, pode-se observar um curto período de hipersalivação em decorrência da natureza do veículo utilizado no mesmo.

Dentre as raras suspeitas de reação adversa ao produto, foram reportados casos de reação cutânea transitória no local de aplicação (discromia da pele, alopecia local, prurido e eritema) e prurido sistêmico ou alopecia após seu uso.

Evite o contato do produto com os olhos dos animais.

Não utilize o produto em sobredosagem, pois o risco de reações adversas pode aumentar. Em caso de suspeita de reações adversas procure imediatamente o Médico Veterinário.

Caso necessário entre em contato com nosso serviço gratuito de atendimento ao consumidor.

EFEITOS SECUNDÁRIOS EVENTUAIS

A aplicação do produto pode causar uma aparência pegajosa dos pêlos no ponto de aplicação. Entretanto, caso isso ocorra, esta alteração deve se resolver dentro de 24 horas após a aplicação do produto.

INTERAÇÃO COM OUTROS MEDICAMENTOS

Não são conhecidas.

SEGURANÇA AMBIENTAL

Frascos e restos do produto devem ser descartados em local apropriado.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS A SEREM TOMADAS PELAS PESSOAS QUE ESTEJAM APLICANDO O PRODUTO AOS ANIMAIS

Este produto pode causar irritação das mucosas e dos olhos. Desta forma, deve-se evitar o contato do produto com a boca e os olhos. Caso ocorra contato acidental do produto com os olhos, lave-os cuidadosamente com água pura.

Como todo tratamento tópico com inseticidas lavar as mãos com água e sabão após o uso do produto; não fumar, beber ou comer durante a aplicação; manter fora do alcance das crianças; evitar contato do produto com as mãos.

APRESENTAÇÃO

Pipetas plásticas contendo 0,67, 1,34, 2,68 e 4,02mL (cães), acondicionadas em cartela com 1 pipeta.

CONSERVAÇÃO

Manter em local seco e fresco e sob temperatura de até 30ºC.

FRONTLINE® TOPSPOT

Boehringer Ingelheim

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

1



Quebre a ponta da pipeta na linha demarcada, abrindo-a.

2



Afaste o pêlo e aplique o produto diretamente na pele.

3

Aplique todo o conteúdo entre a região da nuca e as escápulas, em vários pontos, para que não escorra no pêlo do animal.

Para obter o máximo efeito residual, evite banhar o animal 48 horas antes e após a aplicação.

147507-002

Embalado por Mappel Indústria de Embalagens Ltda. CNPJ 01.233.103/0001-64

FRONTLINE® Boehringer Ingelheim

(Fipronil) TOPSPOT

USO VETERINÁRIO

Cães

Entre 10 e 20 kg de peso

Contém 1 pipeta de 1,34 mL

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:
Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda
Fazenda São Francisco - Paulínia - SP
CNPJ 57.600.249/0001-55
Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 5.765 em 11/12/1996

Produto importado

SAC 0800-8887387
Resp.Técn.: Simone B. Zampieri - CRMV-SP 19.996
Proprietário e fabricante: **Merial - França**

7 898053 772547

DADOS DO ANIMAL

Nome:

Endereço:

Tel:

CPF:

e-mail:

Idade:

Nome:

Raça:

Peso:

FRONTLINE® TOPSPOT

Cães

Boehringer Ingelheim

FRONTLINE® TOPSPOT

Boehringer Ingelheim

USO VETERINÁRIO
Cães

1 pipeta de 2,68 mL

Solução tópica para tratamento à base de Fipronil

Mata Pulgas, Carrapatos e Piolhos em Cães.
Aplicação Tópica

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA

Cada 100 mL contêm:
Fipronil.....10 g
Veículo q.s.p. .....100 mL

INDICAÇÕES

Cães (*adultos e filhotes*): tratamento e controle de infestações por pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores. Auxilia no controle da sarna sarcóptica em cães (tratamentos mensais consecutivos são recomendados para o controle dos ácaros).

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla novas infestações por pulgas por até 3 meses após a aplicação.

Para tratamento e controle da Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas (DAPP), recomendamos fazer aplicações mensais para animais alérgicos (DAPP) e em outros cães e gatos que com eles convivem, usando o produto específico de cada espécie.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla as reinfestações provocadas por todas as fases de desenvolvimento dos carrapatos dos gêneros *Rhipicephalus, Dermacentor, Amblyomma* (vetor da Febre Maculosa), *Haemaphysalis* e *Ixodes* (principal vetor da Doença de Lyme humana e canina); protegendo os animais por até cinco semanas.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla as infestações provocadas por piolhos mastigadores do gênero *Trichodectes* em cães adultos e filhotes.



FASES DO DESENVOLVIMENTO DAS PULGAS

MECANISMO DE AÇÃO

Fipronil é um inseticida e acaricida altamente efetivo pertencente à família dos fenilpirazóis. Seu mecanismo de ação baseia-se no bloqueio pré e pós-sináptico da passagem dos íons cloro pelos neurotransmissores GABA, matando os parasitas por hiper-excitação. Fipronil apresenta afinidade pela gordura presente na superfície da pele e nos folículos pilosos, sendo constantemente re-excretado junto à secreção sebácea sobre a pele e pêlo dos animais, o que resulta em seu longo período de efeito residual.

DOSES E MODO DE USAR

Dose: ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** apresenta-se em pipetas de dose única conforme descritas abaixo, que contêm a dose mínima recomendada de 6,7 mg/kg de Fipronil para cães.

Cães: uma pipeta de 0,67 mL/cão com 1 a 10 Kg de peso;
uma pipeta de 1,34 mL/cão com 10 a 20 Kg de peso;
uma pipeta de 2,68 mL/cão com 20 a 40 Kg de peso;
uma pipeta de 4,02 mL/cão com mais de 40 Kg de peso.

Para cães com mais de 60 Kg de peso, usar 1 pipeta de 4,02 mL + 1 pipeta menor para obter a dose certa, de acordo com o peso do animal.

Recomendamos uma aplicação mensal onde haja um alto risco de reinfestação, caso o cão seja alérgico à picada de pulgas (DAPP) ou em situações onde seja necessário o controle de carrapatos. Em áreas com infestações menos graves ou onde os carrapatos não sejam uma ameaça, ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** pode ser aplicado contra pulgas com intervalos de um até três meses de acordo com o desafio.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES pode ser aplicado em filhotes a partir da 8ª semana de idade e em cadelas prenhes e em lactação.

Modo de usar: Produto somente de aplicação tópica (uso externo).

Quebrar a ponta da pipeta na altura da linha tracejada. Afastar o pêlo do animal na região entre a nuca e a base do pescoço à frente das escápulas até aparecer a pele. Colocar a ponta da pipeta sobre a pele e apertar várias vezes até esvaziar todo seu conteúdo diretamente em vários pontos, para evitar que o produto escorra.

Evitar esfregar a pele após a aplicação do produto e evitar colocar coleiras de couro ou de tecido no animal tratado até que o pêlo esteja bem seco.

Dose única. Não se recomenda o fracionamento do produto

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES não é repelente, matando pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores que entrarem em contato com o animal. Os carrapatos estarão mortos nas primeiras 48 horas após o contato com o produto, por esta razão, a possibilidade de transmissão de doenças infecciosas não pode ser completamente excluída. A maioria dos carrapatos mortos cairá do corpo do animal, enquanto que os que permanecerem poderão ser retirados facilmente.

As formas imaturas das pulgas já presentes no meio ambiente no momento da aplicação (ovos, larvas e pupas) podem continuar seus ciclos, havendo reinfestação dos animais após o tratamento. Deste modo, para diminuir a infestação ambiental, uma completa limpeza e aspiração do ambiente em que o animal se encontra, incluindo cobertores e mantas, deve ser realizada pelo uso de produtos adequados para este fim. Consulte seu veterinário para maiores informações.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES é um tratamento prático, seguro e eficaz contra pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores dos cães.

- Ação rápida;
- Pode ser utilizado em cadelas gestantes e em lactação;
- No caso de DAPP, recomenda-se aplicação mensal do produto;
- Proteção prolongada;
- Protege cães contra pulgas por até 3 meses e contra carrapatos por até 1 mês;
- Elimina rapidamente a causa da Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas;
- Fácil aplicação;
- Mesmo aplicado logo após o banho, ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** garante proteção contra pulgas por pelo menos 45 dias.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES possui modo de ação único, eliminando as pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores com total segurança para os cães e para as pessoas que com eles convivem.

PRECAUÇÕES

Produto para uso externo somente em cães. **Este produto foi especialmente desenvolvido para cães. Para gatos utilize *FRONTLINE® TOPSPOT GATOS*.**

CONTRA-INDICAÇÕES

Em virtude da ausência de dados específicos, o produto não deve ser utilizado em filhotes de cães com menos de 8 semanas de vida. Não utilize em coelhos, pois reações adversas, incluindo a morte, podem ocorrer.

SEGURANÇA

A segurança do ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** foi demonstrada em filhotes de cães a partir de oito semanas de idade mesmo quando administrado em intervalos de 28 dias durante 6 aplicações consecutivas em doses até 5 vezes mais altas que a dose máxima recomendada. A segurança de ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** foi demonstrada em cadelas nas fases de reprodução, gestação e lactação tratadas com doses até 3 vezes a dose máxima recomendada, em aplicações múltiplas sucessivas a cada 28 dias.

EFEITOS ADVERSOS

Embora ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** apresente um elevado nível de segurança, caso o animal lamba o produto, pode-se observar um curto período de hipersalivação em decorrência da natureza do veículo utilizado no mesmo.

Dentre as raras suspeitas de reação adversa ao produto, foram reportados casos de reação cutânea transitória no local de aplicação (discromia da pele, alopecia local, prurido e eritema) e prurido sistêmico ou alopecia após seu uso.

Evite o contato do produto com os olhos dos animais.

Não utilize o produto em sobredosagem, pois o risco de reações adversas pode aumentar. Em caso de suspeita de reações adversas procure imediatamente o Médico Veterinário.

Caso necessário entre em contato com nosso serviço gratuito de atendimento ao consumidor.

EFEITOS SECUNDÁRIOS EVENTUAIS

A aplicação do produto pode causar uma aparência pegajosa dos pêlos no ponto de aplicação. Entretanto, caso isso ocorra, esta alteração deve se resolver dentro de 24 horas após a aplicação do produto.

INTERAÇÃO COM OUTROS MEDICAMENTOS

Não são conhecidas.

SEGURANÇA AMBIENTAL

Frascos e restos do produto devem ser descartados em local apropriado.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS A SEREM TOMADAS PELAS PESSOAS QUE ESTEJAM APLICANDO O PRODUTO AOS ANIMAIS

Este produto pode causar irritação das mucosas e dos olhos. Desta forma, deve-se evitar o contato do produto com a boca e os olhos. Caso ocorra contato acidental do produto com os olhos, lave-os cuidadosamente com água pura.

Como todo tratamento tópico com inseticidas lavar as mãos com água e sabão após o uso do produto; não fumar, beber ou comer durante a aplicação; manter fora do alcance das crianças; evitar contato do produto com as mãos.

APRESENTAÇÃO

Pipetas plásticas contendo 0,67, 1,34, 2,68 e 4,02mL (cães), acondicionadas em cartela com 1 pipeta.

CONSERVAÇÃO

Manter em local seco e fresco e sob temperatura de até 30ºC.

FRONTLINE® TOPSPOT

Boehringer Ingelheim

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO



Para obter o máximo efeito residual, evite banhar o animal 48 horas antes e após a aplicação.

147592-002

Embalado por Mappel Indústria de Embalagens Ltda. CNPJ 01.233.103/0001-64

FRONTLINE® Boehringer Ingelheim
(Fipronil)
USO VETERINÁRIO **TOPSPOT**

Cães

Entre 20 e 40 kg de peso

Contém 1 pipeta de 2,68 mL

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:
Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda
Fazenda São Francisco - Paulínia - SP
CNPJ 57.600.249/0001-55
Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 5.765 em 11/12/1996

Produto importado

SAC 0800-8887387
Resp.Técn.: Simone B. Zampieri - CRMV-SP 19.996
Proprietário e fabricante: ***Merial - França***

7 898053 772530

Nome:

Endereço:

Tel:

CPF:

DADOS DO ANIMAL

Nome:

Raça:

Idade:

Peso:

e-mail:

FRONTLINE® TOPSPOT

Cães

Boehringer Ingelheim

FRONTLINE® TOPSPOT

Boehringer Ingelheim

USO VETERINÁRIO
Cães

1 pipeta de 4,02 mL

Solução tópica para tratamento à base de Fipronil

Mata Pulgas, Carrapatos e Piolhos em Cães.
Aplicação Tópica

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA

Cada 100 mL contêm:
Fipronil.....10 g
Veículo q.s.p. .....100 mL

INDICAÇÕES

Cães (*adultos e filhotes*): tratamento e controle de infestações por pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores. Auxilia no controle da sarna sarcóptica em cães (tratamentos mensais consecutivos são recomendados para o controle dos ácaros).

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla novas infestações por pulgas por até 3 meses após a aplicação.

Para tratamento e controle da Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas (DAPP), recomendamos fazer aplicações mensais para animais alérgicos (DAPP) e em outros cães e gatos que com eles convivem, usando o produto específico de cada espécie.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla as reinfestações provocadas por todas as fases de desenvolvimento dos carrapatos dos gêneros *Rhipicephalus, Dermacentor, Amblyomma* (vetor da Febre Maculosa), *Haemaphysalis* e *Ixodes* (principal vetor da Doença de Lyme humana e canina); protegendo os animais por até cinco semanas.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES controla as infestações provocadas por piolhos mastigadores do gênero *Trichodectes* em cães adultos e filhotes.



FASES DO DESENVOLVIMENTO DAS PULGAS

MECANISMO DE AÇÃO

Fipronil é um inseticida e acaricida altamente efetivo pertencente à família dos fenilpirazóis. Seu mecanismo de ação baseia-se no bloqueio pré e pós-sináptico da passagem dos íons cloro pelos neurotransmissores GABA, matando os parasitas por hiper-excitação. Fipronil apresenta afinidade pela gordura presente na superfície da pele e nos folículos pilosos, sendo constantemente re-excretado junto à secreção sebácea sobre a pele e pêlo dos animais, o que resulta em seu longo período de efeito residual.

DOSES E MODO DE USAR

Dose: ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** apresenta-se em pipetas de dose única conforme descritas abaixo, que contêm a dose mínima recomendada de 6,7 mg/kg de Fipronil para cães.

Cães: uma pipeta de 0,67 mL/cão com 1 a 10 Kg de peso;
uma pipeta de 1,34 mL/cão com 10 a 20 Kg de peso;
uma pipeta de 2,68 mL/cão com 20 a 40 Kg de peso;
uma pipeta de 4,02 mL/cão com mais de 40 Kg de peso.

Para cães com mais de 60 Kg de peso, usar 1 pipeta de 4,02 mL + 1 pipeta menor para obter a dose certa, de acordo com o peso do animal.

Recomendamos uma aplicação mensal onde haja um alto risco de reinfestação, caso o cão seja alérgico à picada de pulgas (DAPP) ou em situações onde seja necessário o controle de carrapatos. Em áreas com infestações menos graves ou onde os carrapatos não sejam uma ameaça, ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** pode ser aplicado contra pulgas com intervalos de um até três meses de acordo com o desafio.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES pode ser aplicado em filhotes a partir da 8ª semana de idade e em cadelas prenhes e em lactação.

Modo de usar: Produto somente de aplicação tópica (uso externo).

Quebrar a ponta da pipeta na altura da linha tracejada. Afastar o pêlo do animal na região entre a nuca e a base do pescoço à frente das escápulas até aparecer a pele. Colocar a ponta da pipeta sobre a pele e apertar várias vezes até esvaziar todo seu conteúdo diretamente em vários pontos, para evitar que o produto escorra.

Evitar esfregar a pele após a aplicação do produto e evitar colocar coleiras de couro ou de tecido no animal tratado até que o pêlo esteja bem seco.

Dose única. Não se recomenda o fracionamento do produto

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES não é repelente, matando pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores que entrarem em contato com o animal. Os carrapatos estarão mortos nas primeiras 48 horas após o contato com o produto, por esta razão, a possibilidade de transmissão de doenças infecciosas não pode ser completamente excluída. A maioria dos carrapatos mortos cairá do corpo do animal, enquanto que os que permanecerem poderão ser retirados facilmente.

As formas imaturas das pulgas já presentes no meio ambiente no momento da aplicação (ovos, larvas e pupas) podem continuar seus ciclos, havendo reinfestação dos animais após o tratamento. Deste modo, para diminuir a infestação ambiental, uma completa limpeza e aspiração do ambiente em que o animal se encontra, incluindo cobertores e mantas, deve ser realizada pelo uso de produtos adequados para este fim. Consulte seu veterinário para maiores informações.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES é um tratamento prático, seguro e eficaz contra pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores dos cães.

- Ação rápida;
- Pode ser utilizado em cadelas gestantes e em lactação;
- No caso de DAPP, recomenda-se aplicação mensal do produto;
- Proteção prolongada;
- Protege cães contra pulgas por até 3 meses e contra carrapatos por até 1 mês;
- Elimina rapidamente a causa da Dermatite Alérgica por Picada de Pulgas;
- Fácil aplicação;
- Mesmo aplicado logo após o banho, ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** garante proteção contra pulgas por pelo menos 45 dias.

FRONTLINE® TOPSPOT CÃES possui modo de ação único, eliminando as pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores com total segurança para os cães e para as pessoas que com eles convivem.

PRECAUÇÕES

Produto para uso externo somente em cães. **Este produto foi especialmente desenvolvido para cães. Para gatos utilize *FRONTLINE® TOPSPOT GATOS*.**

CONTRA-INDICAÇÕES

Em virtude da ausência de dados específicos, o produto não deve ser utilizado em filhotes de cães com menos de 8 semanas de vida. Não utilize em coelhos, pois reações adversas, incluindo a morte, podem ocorrer.

SEGURANÇA

A segurança do ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** foi demonstrada em filhotes de cães a partir de oito semanas de idade mesmo quando administrado em intervalos de 28 dias durante 6 aplicações consecutivas em doses até 5 vezes mais altas que a dose máxima recomendada. A segurança de ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** foi demonstrada em cadelas nas fases de reprodução, gestação e lactação tratadas com doses até 3 vezes a dose máxima recomendada, em aplicações múltiplas sucessivas a cada 28 dias.

EFEITOS ADVERSOS

Embora ***FRONTLINE® TOPSPOT CÃES*** apresente um elevado nível de segurança, caso o animal lamba o produto, pode-se observar um curto período de hipersalivação em decorrência da natureza do veículo utilizado no mesmo.

Dentre as raras suspeitas de reação adversa ao produto, foram reportados casos de reação cutânea transitória no local de aplicação (discromia da pele, alopecia local, prurido e eritema) e prurido sistêmico ou alopecia após seu uso.

Evite o contato do produto com os olhos dos animais.

Não utilize o produto em sobredosagem, pois o risco de reações adversas pode aumentar. Em caso de suspeita de reações adversas procure imediatamente o Médico Veterinário.

Caso necessário entre em contato com nosso serviço gratuito de atendimento ao consumidor.

EFEITOS SECUNDÁRIOS EVENTUAIS

A aplicação do produto pode causar uma aparência pegajosa dos pêlos no ponto de aplicação. Entretanto, caso isso ocorra, esta alteração deve se resolver dentro de 24 horas após a aplicação do produto.

INTERAÇÃO COM OUTROS MEDICAMENTOS

Não são conhecidas.

SEGURANÇA AMBIENTAL

Frascos e restos do produto devem ser descartados em local apropriado.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS A SEREM TOMADAS PELAS PESSOAS QUE ESTEJAM APLICANDO O PRODUTO AOS ANIMAIS

Este produto pode causar irritação das mucosas e dos olhos. Desta forma, deve-se evitar o contato do produto com a boca e os olhos. Caso ocorra contato acidental do produto com os olhos, lave-os cuidadosamente com água pura.

Como todo tratamento tópico com inseticidas lavar as mãos com água e sabão após o uso do produto; não fumar, beber ou comer durante a aplicação; manter fora do alcance das crianças; evitar contato do produto com as mãos.

APRESENTAÇÃO

Pipetas plásticas contendo 0,67, 1,34, 2,68 e 4,02mL (cães), acondicionadas em cartela com 1 pipeta.

CONSERVAÇÃO

Manter em local seco e fresco e sob temperatura de até 30ºC.

FRONTLINE® TOPSPOT

Boehringer Ingelheim

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO



Para obter o máximo efeito residual, evite banhar o animal 48 horas antes e após a aplicação.

Embalado por Mappel Indústria de Embalagens Ltda. CNPJ 01.233.103/0001-64

147514-002