

Gelofut®

- cânfora - mentol
- salicilato de metila



caresse

○ FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Pomada em bisnaga com 20 g e 45 g.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO EXTERNO

○ COMPOSIÇÃO

Pomada de 20 g e 45 g

Cada grama contém:

Cânfora.....0,0444 g

Salicilato de metila.....0,0444 mL

Mentol.....0,0200 g

Excipientes q.s.p.....1 g

(essência de mostarda, essência de alfazema, essência de alecrim, essência de terebintina, BHT, parafina branca e vaselina branca).

○ INFORMAÇÕES AO PACIENTE

◆ Ação esperada do medicamento

Gelofut® é indicado para uso exclusivo tópico, nos casos de reumatismo, nevralgias, torcicolos, contusões e dores musculares. Os sinais de melhora nos sintomas podem ocorrer em um prazo variável de dias, após o início do tratamento.

◆ Cuidados de armazenamento

Gelofut® deve ser guardado em sua embalagem original até sua total utilização, à temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

◆ Prazo de validade

Seu prazo de validade é de 2 anos e encontra-se impresso na embalagem externa (vide cartucho).

Gelofut® não deve ser utilizado com o prazo de validade vencido, sob o risco do efeito esperado não ocorrer.

◆ Gravidez e lactação

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando.

◆ Cuidados de administração

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

◆ Interrupção do tratamento

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

◆ Reações adversas

Informe seu médico o aparecimento de reações adversas.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

◆ Ingestão concomitante com outras substâncias

Não são conhecidas interações de **Gelofut®** com alimentos e/ou bebidas alcoólicas.

◆ Contra-indicações

Gelofut® é contra-indicado em pacientes com história de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Não deve ser aplicado em ferimentos, dermatoses, varizes, nas mucosas: nasal, oral e ocular.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE.

Risco de automedicação: NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.

○ INFORMAÇÕES TÉCNICAS

◆ CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Salicilato de metila - revulsivo orgânico volátil, age produzindo ação local irritante, com efeitos indiretos de atividade à distância sobre estruturas somáticas (músculos), serosas, articulações, vísceras e de estimulação reflexa dos centros bulbares. Provoca analgia e hiperemia nas regiões cutâneas em que é aplicado, invadidas pelo mesmo segmento do sistema nervoso central.

Cânfora - possui ação irritante cutânea revulsiva, útil nos processos dolorosos de estruturas profundas, tipo fibrosites, mialgia, lumbago. Produz ainda leve anestesia local.

Mentol - aplicado localmente, causa sensação de frio por estímulo específico dos receptores e, em seguida, anestesia discreta.

○ INDICAÇÕES

Gelofut® é indicado em reumatismos, nevralgias,

torcicolos, contusões e dores musculares.

○ **CONTRA-INDICAÇÕES**

Gelofut® é contra-indicado em pacientes com história de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

NÃO DEVE SER APLICADO EM FERIMENTOS, DERMATITES, VARIZES, MUCOSAS: NASAL, ORAL E OCULAR.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

○ **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS**

O uso de **Gelofut®** é exclusivamente tópico, não devendo ser aplicado sobre feridas abertas.

Em caso de irritação, suspenda o uso.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE.

○ **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Ainda não foram totalmente relacionadas as interações do produto com outras drogas e/ou medicamentos.

○ **REAÇÕES ADVERSAS**

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas.

Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

○ **POSOLOGIA E MODO DE USAR**



USO EXTERNO

Friccione a parte dolorida durante alguns minutos, com pequena quantidade do produto, envolvendo-a depois com um pano de flanela ou lã, 2 a 3 vezes ao dia.

Instruções para abrir a bisnaga:

1- Retire a tampa da bisnaga

2- Com a parte pontiaguda superior da tampa, perfure o lacre da bisnaga.



○ **SUPERDOSAGEM**

Na eventual superdosagem acidental, imediatamente suspender a medicação e procurar assistência médica. Recomenda-se tratamento de suporte sintomático.

○ **PACIENTES IDOSOS**

Não foram relatadas restrições quanto ao uso do produto em pacientes maiores de 65 anos de idade.

**Siga corretamente
o modo de usar, não desaparecendo
os sintomas procure orientação médica.**

Venda sem prescrição médica.

MS - 1.2758.0064

Farm. Resp.: Cristiane Olier Perusso

CRF- SP - n.º 31.475

N.º. do lote, data de fabricação e prazo de validade: **VIDE CARTUCHO.**


caresse

Laboratório Farmacêutico Caresse Ltda.

Rua José Faganello, 242 - CEP 16021-256

Araçatuba - SP - CNPJ 56.930.811/0001-46

Indústria Brasileira

