



WP LAB
Indústria Farmacêutica

Gotalgia[®]

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: GOTALGIA[®]

Insumos ativos: Rhus toxicodendron, Sarsaparilla, Urtica urens

Medicamento Homeopático

APRESENTAÇÕES

Apresentações comerciais:

Caixa contendo 20 comprimidos de 250 mg

Caixa contendo 60 comprimidos de 250 mg

Forma farmacêutica: Comprimido simples

Via de administração: **ORAL**

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 250 mg contém:

Rhus toxicodendron.....5CH.....0,0083 mL

Sarsaparilla.....5CH.....0,0083 mL

Urtica urens5CH.....0,0083 mL

Excipientes q.s.p.....250 mg

Excipientes (Lactose monoidratada, amido, estearato de magnésio e dióxido de silício)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

GOTALGIA[®] é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas de gota, previamente diagnosticada, dores articulares, gotosas e reumáticas, dores e rigidez nas costas, inchaço articular. Auxiliar no tratamento dos sintomas das afecções relacionadas ao aparelho urinário, previamente diagnosticadas, como cólicas renais e dor ao término de urinar.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

GOTALGIA[®] é um medicamento homeopático, que tem seu mecanismo de ação baseado na Lei dos Semelhantes, na qual os sintomas de uma moléstia são curados pelo agente que o produz.

As indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento são comprovadas pelas matérias médicas e repertórios homeopáticos, após experimentação individual de seus insumos ativos em indivíduos sadios. A experimentação consiste em administrar substâncias em indivíduos sadios para elucidar os sintomas que irão refletir sua ação, ou seja, o potencial medicamentoso. A partir desta experimentação surgem as matérias médicas, que indicam a totalidade dos sintomas que cada ativo poderá promover, em busca da cura da patologia.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 (doze) anos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria “C” de risco de gravidez).

O que significa risco de gravidez “categoria C”? Significa que para este medicamento não foram realizados estudos em mulheres grávidas.

Este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Até o momento, são desconhecidas contraindicações do medicamento GOTALGIA[®].

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao seu médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

Até o momento, são desconhecidas reações adversas do medicamento GOTALGIA[®].

Este medicamento contém LACTOSE.

GOTALGIA[®] possui, em sua formulação, insumos ativos homeopáticos que podem apresentar incompatibilidade específica com outros insumos ativos homeopáticos, conforme descrito abaixo:

Incompatibilidade e inimigo Rhus toxicodendron: Apis mellifica.

Até o momento, são desconhecidas interações no uso do medicamento GOTALGIA[®] associado a alimentos, medicamentos e bebidas alcoólicas.

Até o momento, são desconhecidas alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento GOTALGIA[®].

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em local seco e à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

Proteger da luz e da umidade. Evitar radiações.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Os comprimidos de GOTALGIA[®] são brancos, circulares e sem odor (inodoros).

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele

esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Administração Via Oral.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias é proibido.

Posologia sugerida:

ADULTOS

Tomar 1 (um) comprimido pela manhã e 1 (um) comprimido à noite, ou conforme orientação médica.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 30 (trinta) dias, consulte um profissional de saúde.

No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Continue seguindo corretamente o modo de usar descrito nesta bula.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Até o momento, são desconhecidas reações adversas do medicamento GOTALGIA®.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento sac@wplab.ind.br.

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não foram evidenciadas intoxicações agudas de nenhuma grandeza advindas de superdosagem deste medicamento.

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou o farmacêutico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC n.º 238/2018.

Farmacêutica Responsável: Dr.ª Giselle da Costa Mateus CRF - PR 16959

Homeopatia Waldemiro Pereira - Laboratório Industrial Farmacêutico Eireli.

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020
CNPJ: 76.440.528/0001-43

Indústria Brasileira

SAC: Fone: (41) 3013-6464 | sac@wplab.ind.br



WP LAB
Indústria Farmacêutica

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

