

# GRIPLEOL

paracetamol – DCB: 06827

maleato de clorfeniramina – DCB: 02442

cloridrato de fenilefrina – DCB: 03926

## APRESENTAÇÃO

Embalagem contendo um frasco goteador de 20 mL.

## USO ORAL

### USO PEDIÁTRICO ATÉ 6 ANOS

## COMPOSIÇÃO

Cada mL de GRIPLEOL gotas contém:

paracetamol ..... 100 mg  
 maleato de clorfeniramina ..... 2 mg  
 cloridrato de fenilefrina ..... 2 mg  
 Excipientes q.s.p. .... 1 mL  
 (ácido cítrico, ciclamato de sódio, sacarina sódica, benzoato de sódio, metabissulfato de sódio, macrogol, corante amarelo de tartrazina, aroma de laranja e água purificada).

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

**GRIPLEOL** é um antigripal múltiplo, que contém substâncias que agem contra os sintomas de gripes e resfriados. **GRIPLEOL** alivia a obstrução nasal, coriza, febre, cefaleia e dores musculares presentes nos estados gripais.

**Cuidados de conservação:** Conservar em temperatura ambiente (15°C e 30°C) e proteger da luz e umidade. **GRIPLEOL** é válido por 24 meses, a partir da data de fabricação indicada na embalagem. **Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento. GRIPLEOL não deve ser usado durante a gravidez e lactação. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe também se estiver amamentando.** Caso surjam reações desagradáveis como tontura, vertigem, taquicardia, palpitações, hipertensão, desconforto gástrico e reações alérgicas cutâneas durante o tratamento com **GRIPLEOL**, aconselha-se suspender o uso do medicamento e comunicar ao médico. **Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis. ESTE MEDICAMENTO INDUZ SONOLÊNCIA NÃO DEVENDO SER UTILIZADO POR CONDUTORES DE VEÍCULOS, OPERADORES DE MÁQUINAS OU POR AQUELES QUE SEJAM RESPONSÁVEIS PELA A SEGURANÇA DE OUTRAS PESSOAS. Não use outro produto que contenha paracetamol.** O produto não deve ser administrado concomitantemente com inibidores da monoamino-oxidase (MAO), com barbitúricos ou álcool. **Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento. ATENÇÃO: GRIPLEOL gotas contém o corante amarelo de TARTRAZINA, que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.** Em pacientes idosos é recomendado o uso sob orientação médica. **Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

As ações farmacológicas das substâncias que formam o medicamento **GRIPLEOL**, prestam uma cobertura sintomática ampla no tratamento de gripes e resfriados, cuja ação farmacodinâmica e segurança são perfeitamente conhecidas e bem estabelecidas. O paracetamol possui atividade analgésica e antitérmica. Ambas ocorrem devido à inibição da síntese de prostaglandinas no Sistema Nervoso Central. A ação analgésica ocorre, predominantemente, no Sistema Nervoso Central e, a nível menor, através de ação periférica, bloqueando a geração de impulsos dolorosos. A ação antitérmica ocorre no centro cerebral regulador da temperatura. O maleato de clorfeniramina é um agente anti-histamínico. Tem ação contrária a da histamina, que ocasiona a maioria dos efeitos alérgicos presentes nos estados gripais. Atua na musculatura lisa do aparelho respiratório diminuindo os broncoespasmos. Diminui a permeabilidade dos pequenos vasos sanguíneos e consequentemente os edemas, rubores e pruridos. Tem ação sobre as glândulas exócrinas, diminuindo as secreções salivares e lacrimais. O cloridrato de fenilefrina atua sobre receptores específicos, causando uma vasoconstrição direta, promovendo o descongestionamento nasal e diminuindo a coriza e a rinite.

## INDICAÇÕES

Antigripal múltiplo com ação nas gripes, resfriados, congestão nasal, coriza, febre, cefaleia, dores musculares e demais sintomas presentes nos estados gripais.

## CONTRAINDICAÇÕES

O uso de **GRIPLEOL** é contraindicado a pacientes com conhecida hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não deve ser administrado a pacientes com hipertensão, doença cardíaca, diabetes, glaucoma, hipertrofia da próstata, doença renal crônica, insuficiência hepática grave, disfunção tireoidiana, gravidez e lactação sem controle médico.

## REAÇÕES ADVERSAS

Durante o tratamento, embora raramente, podem surgir reações adversas características, tais como: sedação, sonolência, vertigem, hipotensão, sudorese, palpitações, ansiedade, tremor, insônia, desconforto gástrico, irritações cutâneas. O uso prolongado pode provocar discrasias sanguíneas e necrose papilar renal.

## ADVERTÊNCIA

**GRIPLEOL gotas** contém o corante amarelo de TARTRAZINA, que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

## PRECAUÇÕES

**ESTE MEDICAMENTO INDUZ SONOLÊNCIA NÃO DEVENDO SER UTILIZADO POR CONDUTORES DE VEÍCULOS, OPERADORES DE MÁQUINAS OU POR AQUELES QUE SEJAM RESPONSÁVEIS PELA A SEGURANÇA DE OUTRAS PESSOAS. Não use outro produto que contenha paracetamol.**

## INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O produto não deve ser administrado concomitantemente com inibidores da MAO (monoamino-oxidase), com barbitúricos ou álcool.

**Alterações em exames laboratoriais:** Os testes de função pancreática utilizando a bentiromida ficam invalidados, a menos que o uso do medicamento seja descontinuado (3) três dias antes da realização do exame. Pode produzir falsos valores aumentados quando da determinação do ácido 5 hidroxilindolacético, quando for utilizado o reagente nitrosonaftol.

## POSOLOGIA

Administração por via oral.

**Crianças de 4 a 6 anos:** 30 a 40 gotas, 3 a 4 vezes ao dia.

**Crianças de 2 a 4 anos:** 20 a 30 gotas, 3 a 4 vezes ao dia.

**Crianças abaixo de 2 anos:** Sob orientação médica.

Não administre medicamentos diretamente na boca das crianças, utilize uma colher para pingar as gotinhas.



## SUPERDOSE

Promover esvaziamento gástrico através da indução de emese ou lavagem gástrica. A N-acetilcisteína, administrada por via oral, é um antídoto específico para toxicidade induzida pelo paracetamol, devendo ser instituída nas primeiras 24 horas. Medidas de manutenção do estado geral devem ser observadas, como hidratação, balanço hídrico, eletrolítico e correção de hipoglicemia.

## PACIENTES IDOSOS

É recomendado o uso sob orientação médica.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA. NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: VIDE CARTUCHO.**

Reg. MS: 1.1560.0061

Farm. Resp.: Dra. Michele Caldeira Landim

CRF/GO: 5122

**CIFARMA - Científica Farmacêutica Ltda.**

CNPJ: 17.562.075/0001-69

Rod. BR 153 Km 5,5

Jardim Guanabara

CEP: 74675-090 - Goiânia/GO

Indústria Brasileira



**cac**  
0800 707 1212  
www.cifarma.com.br