

## Texto de rotulagem

Logo Natulab

Logo Hidralyte  
45

Cloreto de sódio 2,05mg/mL  
Citrato de sódio diidratado 0,98mg/mL  
Glicose 22, 5mg/mL  
Citrato de potássio monoidratado 2,16mg/mL

SOLUÇÃO ORAL  
uso oral  
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

sabor água de coco

Validade após abertura: 15 dias

SOLUÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DESIDRATAÇÃO ORAL

Contém 500mL

### COMPOSIÇÃO:

Cada mL contém : cloreto de sódio 2,05mg, citrato de sódio diidratado 0,98mg, glicose 22, 5mg, citrato de potássio monoidratado 2,16mg e excipientes q.s.p. 1mL. Excipientes: ácido benzoico; sacarina sódica ; aroma de água de coco; ácido tartárico, hidróxido de sódio, água purificada.

**INDICAÇÃO :** Prevenção da desidratação e manutenção da hidratação após a fase de reidratação.

**MODO DE USAR:** Uso interno. Adultos: administrar 750 mL de solução por hora até o limite de 4 L/ dia.  
Lactantes e Crianças: administrar 20 mL de solução/kg por hora até o limite de 75 mL/kg/dia. Se nas duas primeiras horas de tratamento os vômitos continuarem impedindo que o paciente administre a solução, procurar imediatamente o médico.

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e da umidade.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** Podem ocorrer vômitos, principalmente se a solução for ingerida muito rapidamente.

**CONTRAINDICAÇÕES:** Pacientes com íleo paralítico, obstrução ou perfuração do intestino e nos vômitos persistentes.

**PRECAUÇÕES:** Usar com cautela em pacientes com função renal comprometida.

Aba lateral direita

Logo Hidralyte

Cloreto de sódio 2,05mg/mL  
Citrato de sódio diidratado 0,98mg/mL  
Glicose 22, 5mg/mL  
Citrato de potássio monoidratado 2,16mg/mL

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.  
AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.  
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e da umidade.

## Texto de rotulagem

---

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199 de 2006. AFE Nº 1.30841-3

**Natulab Laboratório S. A.**

Rua José Rocha Galvão Nº 02, Galpão III - Salgadeira

Santo Antônio de Jesus - BA - CEP 44.444-312

CNPJ: 02.456.955/0001-83

**Responsável Técnico:** Olavo Souza Rodrigues

CRF/BA 4826

**Indústria Brasileira**

Logo com assinatura do SAC

0800 730 7370

[www.natulab.com.br](http://www.natulab.com.br)

Código de barras: 7898133139253

## Texto de rotulagem

---

Logo Hidralyte  
45

Cloreto de sódio 2,05mg/mL  
Citrato de sódio diidratado 0,98mg/mL  
Glicose 22, 5mg/mL  
Citrato de potássio monoidratado 2,16mg/mL

SOLUÇÃO ORAL  
uso oral  
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

sabor guaraná

Validade após abertura: 15 dias

SOLUÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DESIDRATAÇÃO ORAL

Contém 500mL

### COMPOSIÇÃO:

Cada mL contém : cloreto de sódio 2,05mg, citrato de sódio diidratado 0,98mg, glicose 22, 5mg, citrato de potássio monoidratado 2,16mg e excipientes q.s.p. 1mL. Excipientes: ácido benzoico; sacarina sódica; corante caramelo, aroma de guaraná; ácido tartárico, hidróxido de sódio e água purificada.

**INDICAÇÃO:** Prevenção da desidratação e manutenção da hidratação após a fase de reidratação.

**MODO DE USAR:** Uso interno. Adultos: administrar 750 mL de solução por hora até o limite de 4 L/ dia. Lactantes e Crianças: administrar 20 mL de solução/kg por hora até o limite de 75 mL/kg/dia. Se nas duas primeiras horas de tratamento os vômitos continuarem impedindo que o paciente administre a solução, procurar imediatamente o médico.

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e da umidade.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** Podem ocorrer vômitos, principalmente se a solução for ingerida muito rapidamente.

**CONTRAINDICAÇÕES:** Pacientes com íleo paralítico, obstrução ou perfuração do intestino e nos vômitos persistentes.

**PRECAUÇÕES:** Usar com cautela em pacientes com função renal comprometida.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.  
AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.  
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199 de 2006. AFE Nº 1.30841-3.

**Natulab Laboratório S. A.**  
Rua José Rocha Galvão Nº 02, Galpão III - Salgadeira  
Santo Antônio de Jesus - BA - CEP 44.444-312  
CNPJ: 02.456.955/0001-83  
**Responsável Técnico:** Olavo Souza Rodrigues  
CRF/BA 4826

**Indústria Brasileira**

Logo com assinatura do SAC

## Texto de rotulagem

---

0800 730 7370

[www.natulab.com.br](http://www.natulab.com.br)

Código de barras: 78981331399246

## Texto de rotulagem

---

Logo Natulab

Logo Hidralyte  
45

Cloreto de sódio 2,05mg/mL  
Citrato de sódio diidratado 0,98mg/mL  
Glicose 22, 5mg/mL  
Citrato de potássio monoidratado 2,16mg/mL

SOLUÇÃO ORAL  
uso oral  
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

sabor laranja

Validade após abertura: 15 dias

SOLUÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DESIDRATAÇÃO ORAL

Contém 500mL

### COMPOSIÇÃO:

Cada mL contém: cloreto de sódio 2,05mg, citrato de sódio diidratado 0,98mg, glicose 22, 5mg, citrato de potássio monoidratado 2,16mg e excipientes q.s.p. 1mL. Excipientes: ácido benzoico; sacarina sódica ; corante amarelo crepúsculo, aroma de laranja; ácido tartárico, hidróxido de sódio e água purificada.

**INDICAÇÃO:** Prevenção da desidratação e manutenção da hidratação após a fase de reidratação.

**MODO DE USAR:** Uso interno. Adultos: administrar 750 mL de solução por hora até o limite de 4 L/ dia. Lactantes e Crianças: administrar 20 mL de solução/kg por hora até o limite de 75 mL/kg/dia. Se nas duas primeiras horas de tratamento os vômitos continuarem impedindo que o paciente administre a solução, procurar imediatamente o médico.

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e da umidade.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** Podem ocorrer vômitos, principalmente se a solução for ingerida muito rapidamente.

**CONTRAINDICAÇÕES:** Pacientes com íleo paralítico, obstrução ou perfuração do intestino e nos vômitos persistentes.

**PRECAUÇÕES:** Usar com cautela em pacientes com função renal comprometida.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.  
AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.  
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e da umidade.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199 de 2006. AFE Nº 1.30841-3

### Natulab Laboratório S. A.

Rua José Rocha Galvão Nº 02, Galpão III - Salgadeira  
Santo Antônio de Jesus - BA - CEP 44.444-312  
CNPJ: 02.456.955/0001-83

**Responsável Técnico:** Olavo Souza Rodrigues  
CRF/BA 4826

## Texto de rotulagem

---

### **Indústria Brasileira**

Logo com assinatura do SAC

0800 730 7370

[www.natulab.com.br](http://www.natulab.com.br)

Código de barras: 7898133139277

## Texto de rotulagem

---

Logo Natulab

Logo Hidralyte  
45

Cloreto de sódio 2,05mg/mL  
Citrato de sódio diidratado 0,98mg/mL  
Glicose 22, 5mg/mL  
Citrato de potássio monoidratado 2,16mg/mL

SOLUÇÃO ORAL  
uso oral  
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

sabor tutti-frutti

Validade após abertura: 15 dias

SOLUÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DESIDRATAÇÃO ORAL

Contém 500mL

Logo Hidralyte

### COMPOSIÇÃO:

Cada mL contém : cloreto de sódio 2,05mg, citrato de sódio diidratado 0,98mg, glicose 22, 5mg, citrato de potássio monoidratado 2,16mg e excipientes q.s.p. 1mL. Excipientes: ácido benzoico; sacarina sódica; vermelho allura 129 ; aroma de tutti-frutti; ácido tartárico, hidróxido de sódio, água purificada.

**INDICAÇÃO:** Prevenção da desidratação e manutenção da hidratação após a fase de reidratação.

**MODO DE USAR:** Uso interno. Adultos: administrar 750 mL de solução por hora até o limite de 4 L/ dia.  
Lactantes e Crianças: administrar 20 mL de solução/kg por hora até o limite de 75 mL/kg/dia. Se nas duas primeiras horas de tratamento os vômitos continuarem impedindo que o paciente administre a solução, procurar imediatamente o médico.

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e da umidade.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES :** Podem ocorrer vômitos, principalmente se a solução for ingerida muito rapidamente.

**CONTRAINDICAÇÕES :** Pacientes com íleo paralítico , obstrução ou perfuração do intestino e nos vômitos persistentes.

**PRECAUÇÕES:** Usar com cautela em pacientes com função renal comprometida.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e da umidade.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199 de 2006. AFE Nº 1.30841-3

### Natulab Laboratório S. A.

Rua José Rocha Galvão Nº 02, Galpão III - Salgadeira

Santo Antônio de Jesus - BA - CEP 44.444-312

CNPJ: 02.456.955/0001-83

**Responsável Técnico:** Olavo Souza Rodrigues

## Texto de rotulagem

---

CRF/BA 4826

**Indústria Brasileira**

Logo com assinatura do SAC

0800 730 7370

[www.natulab.com.br](http://www.natulab.com.br)

Código de barras: 7898133139260



## Texto de rotulagem

---

Logo Hidralyte  
45

Cloreto de sódio 2,05mg/mL  
Citrato de sódio diidratado 0,98mg/mL  
Glicose 22, 5mg/mL  
Citrato de potássio monoidratado 2,16mg/mL

SOLUÇÃO ORAL  
uso oral  
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

sabor uva

Validade após abertura: 15 dias

SOLUÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DESIDRATAÇÃO ORAL

Contém 500mL

Logo Hidralyte

### COMPOSIÇÃO:

Cada mL contém : cloreto de sódio 2,05mg, citrato de sódio diidratado 0,98mg, glicose 22, 5mg, citrato de potássio monoidratado 2,16mg e excipientes q.s.p. 1mL. Excipientes: ácido benzoico; sacarina sódica ; corante azul brilhante ; corante vermelho bordeaux, aroma de uva; ácido tartárico , hidróxido de sódio e água purificada.

**INDICAÇÃO:** Prevenção da desidratação e manutenção da hidratação após a fase de reidratação.

**MODO DE USAR:** Uso interno. Adultos: administrar 750 mL de solução por hora até o limite de 4 L/ dia.  
Lactantes e Crianças: administrar 20 mL de solução/kg por hora até o limite de 75 mL/kg/dia. Se nas duas primeiras horas de tratamento os vômitos continuarem impedindo que o paciente administre a solução, procurar imediatamente o médico.

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e da umidade.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** Podem ocorrer vômitos, principalmente se a solução for ingerida muito rapidamente.

**CONTRAINDICAÇÕES:** Pacientes com íleo paralítico , obstrução ou perfuração do intestino e nos vômitos persistentes.

**PRECAUÇÕES:** Usar com cautela em pacientes com função renal comprometida.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.  
AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.  
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e da umidade.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199 de 2006. AFE Nº 1.30841-3

### Natulab Laboratório S. A.

Rua José Rocha Galvão Nº 02, Galpão III - Salgadeira  
Santo Antônio de Jesus - BA - CEP 44.444-312  
CNPJ: 02.456.955/0001-83

**Responsável Técnico:** Olavo Souza Rodrigues  
CRF/BA 4826

## Texto de rotulagem

---

### **Indústria Brasileira**

Logo com assinatura do SAC

0800 730 7370

[www.natulab.com.br](http://www.natulab.com.br)

Código de barras: 7898133139239