



047431/5000 GP BR

Os componentes da formulação são potencializados em conjunto nas duas últimas etapas como diluições. Considerando esses conceitos, o medicamento antihomotóxico, Husteel® atua como auxiliar nas complicações das vias respiratórias, durante ou após os resfriados e gripes.

#### Indicações do medicamento

Husteel® é indicado como auxiliar em tosse, como por exemplo, de resfriados e com sensação de frio, nas bronquites espasmódicas e nas pleurites.

#### Contra-indicações

Nos casos de distúrbio da tireóide.

Husteel® é contra-indicado nos casos de doenças hepáticas e alcoolismo.

Este medicamento é contra-indicado às pessoas com hipersensibilidade a quaisquer componentes da fórmula.

#### Posologia sugerida

Via oral

**Adultos:** tomar de 5 a 10 gotas, de 1 a 3 vezes ao dia. Nos ataques de tosse, de 5 a 10 gotas a cada meia ou uma hora, por no máximo 12 vezes ao dia, ou de acordo com a prescrição do seu médico.

**Crianças:** segue a tabela abaixo.

Idade	Dosagem normal	Dosagem para sintomas agudos
1-6 anos	3 gotas de 1-3 vezes ao dia	3 gotas a cada meia ou uma hora, no máximo, até 10 vezes por dia.
6-12 anos	4 gotas de 1-3 vezes ao dia	4 gotas a cada meia ou uma hora, no máximo, até 10 vezes por dia.

A partir de 12 anos Dose de adulto Dose de adulto

Caso os sintomas persistam por mais de 2 dias ou se agravem o médico deve informar ao paciente para entrar em contato.

No caso do tratamento ser longo, acompanhar a evolução do paciente durante todo o período do tratamento.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e devem estar sob a responsabilidade do prescritor.

#### Advertências

Este medicamento contém álcool.

Husteel® está na categoria B de risco na gravidez.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista.

#### Armazenagem

Este medicamento deve ser armazenado em local seco e à temperatura ambiente (15 a 30 °C), longe de qualquer tipo de fonte de calor e, ou umidade. Recomenda-se não deixar este medicamento junto a aparelhos emissores de radiação, tais como rádio, TV, telefone sem fio e celulares, forno de microondas, etc.

Este medicamento é antihomotóxico.

#### Venda sob prescrição médica.

Lote, data de validade e data de fabricação: vide frasco e cartucho.

MS: 1.6198.0013.001-9

Farmacêutico responsável: Marialba Salvador L. Moreno CRF-SP nº 16.619.

Produzido por: Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, Alemanha.

Importado e distribuído por:

**Heel do Brasil Biomédica Ltda.**

Alameda Tocantins, 630 – G8 – Alphaville

06455-020 – Barueri – SP

CNPJ: 05.994.539/0001-27, SAC: 0800-7709000

www.heel.com.br

# Husteel®

## Arsenicum iodatum D6 + ASSOCIAÇÃO

#### Forma farmacêutica, via de administração e apresentação

Solução em gotas – Via oral – Frasco com 30 ml – 18 gotas/ml.

Uso Adulto e Pediátrico

#### Composição

Cada 30 ml contém: 5,73 g de Arsenicum iodatum D6 dil., 5,73 g de Atropa belladonna D4 dil., 5,73 g de Scilla D4 dil., 2,87 g de Cuprum aceticum D6 dil. e 8,60 g de Causticum Hahnemanni D6 dil., em solução alcoólica 35% (vol.).

\*Medicamento antihomotóxico\*

#### Informações ao Paciente

##### Ação do medicamento

O medicamento Husteel é preparado segundo a farmacotécnica homeopática, cujos métodos de diluição e de dinamização estão descritos na Farmacopéia Homeopática Alemã. Sua aplicação atende aos princípios da Homotoxicologia. Esta terapêutica considera as enfermidades como a expressão de uma resposta defensiva do organismo contra as toxinas produzidas pelo organismo, ou ingeridas, ou inaladas, ou o resultado de danos tóxicos que o organismo tenta compensar, com a finalidade de restabelecer dentro do possível o equilíbrio biológico. Este novo conceito de tratamento nasceu na terapêutica homeopática a qual está embasada no princípio da similitude, na lei de cura e na patogenia das substâncias medicamentosas descritas nas Matérias Médicas Homeopáticas, bem como, nos conceitos de imunologia. Considerando esses conceitos, o medicamento antihomotóxico, Husteel auxilia o tratamento nas complicações das vias respiratórias durante ou após, resfriados e gripes.

##### Indicações do medicamento

Husteel® é indicado como auxiliar em tosse, como por exemplo, de resfriados e com sensação de frio, nas bronquites espasmódicas e nas pleurites. A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

##### Modo de usar

##### Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

A solução de Husteel® gotas é límpida, incolor, com sabor e odor de álcool. Este medicamento é de uso oral.

Tomar Husteel® solução oral com um pouco de água. Mantenha o frasco sempre fechado após o uso.

Para o uso correto do medicamento, siga corretamente a orientação abaixo, ou a prescrição do seu médico.

**Adultos:** tomar de 5 a 10 gotas, de 1 a 3 vezes ao dia. Nos ataques de tosse, de 5 a 10 gotas a cada meia ou uma hora, por no máximo 12 vezes ao dia, ou de acordo com a prescrição do seu médico.

# -Heel



**Crianças:** segue a tabela abaixo.

Idade	Dosagem normal	Dosagem para sintomas agudos
1-6 anos	3 gotas de 1-3 vezes ao dia	3 gotas a cada meia ou uma hora, no máximo, até 10 vezes por dia.
6-12 anos	4 gotas de 1-3 vezes ao dia	4 gotas a cada meia ou uma hora, no máximo, até 10 vezes por dia.
A partir de 12 anos	Dose de adulto	Dose de adulto

Caso os sintomas persistam por mais de 2 dias ou se agravem, contate seu médico.

O tratamento com este medicamento por longo período, por muitos meses, deve ser acompanhado pelo médico. Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação do prescritor.

Mantenha sempre a dose e a frequência indicadas pelo prescritor ou o modo de tomar sugerido nesta bula.

Não use medicamento sem o conhecimento do prescritor. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Siga a orientação do prescritor, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do prescritor.

Em caso de esquecimento de administração, não duplicar a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Use o medicamento dentro do prazo de validade.

#### Riscos do medicamento - Advertências

Este medicamento não deve ser usado sem acompanhamento médico se você tiver algum problema na tireóide. Se persistirem sintomas ou surgirem outros, como respiração curta, tosse com catarro ou sangue, ou tem febre que dure mais que 3 dias e exceda a 39 °C, você deve entrar em contato com seu médico.

**Este medicamento contém ÁLCOOL.** Em virtude do teor alcoólico, Husteel deve ser administrado nos casos de doenças hepáticas e alcoolismo somente com acompanhamento médico.

Este medicamento não deve ser administrado em crianças menores de 1 ano de idade.

Este medicamento é contra-indicado às pessoas com alergia aos componentes do produto.

Informe ao prescritor o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos, pois pode significar uma reação ao medicamento, que pode requerer uma nova orientação.

#### Gravidez e lactação:

Este medicamento não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

#### Conduta em caso de superdose

Até o momento, não foram relatados casos de superdosagem durante o tratamento com Husteel®.

A ingestão de grandes quantidades do medicamento pode levar a uma intoxicação alcoólica, especialmente em crianças, ou seja, um comprometimento hepático. Nesse caso, o médico deve ser imediatamente consultado.

A administração de todo o conteúdo do frasco de 30 ml significa ingerir 8,3 g de álcool.

A conduta nos casos de ingestão acidental e, ou ingestão acima da dose sugerida, ou prescrita, é observar o surgimento de alguma manifestação clínica, tais como: tontura, enjôo, náuseas e dor de cabeça e, caso isto aconteça, suspenda o uso do medicamento e procure o seu médico ou o farmacêutico.

Em caso de ingestão acidental e, ou ingestão acima da dose sugerida, ou prescrita pelo clínico, ou em casos de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure o clínico ou farmacêutico.

#### Cuidados de conservação

Este medicamento deve ser armazenado em local seco e à temperatura ambiente (15 a 30°C), longe de qualquer tipo de fonte de calor e, ou umidade. Recomenda-se não deixar este medicamento junto a aparelhos emissores de radiação, tais como rádio, TV, telefone sem fio e celulares, forno de microondas, etc..

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**



**PARA SUA SEGURANÇA, MANTENHA O MEDICAMENTO NA EMBALAGEM ORIGINAL ATÉ SEU USO TOTAL.** Use o medicamento dentro do prazo de validade. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

**Contribua com o tratamento: relate ao prescritor todos os tratamentos que você já fez ou está fazendo. Atenda às sugestões do prescritor, para que seu tratamento seja eficaz.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

**Não observando o resultado esperado, consulte o prescritor ou farmacêutico.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Não se automedique, pode ser prejudicial à sua saúde e dificultar o diagnóstico correto do médico, pois o uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

#### Informações Técnicas ao Profissional de Saúde

##### Características Farmacológicas

O medicamento Husteel é um medicamento preparado segundo a farmacotécnica homeopática, cujos métodos de diluição e de dinamização estão descritos na Farmacopéia Homeopática Alemã. Sua aplicação atende aos princípios da Homotoxicologia. Esta terapêutica considera as enfermidades como a expressão de uma resposta defensiva do organismo contra as homotoxinas endógenas e as exógenas, ou o resultado de danos tóxicos que o organismo tenta compensar, com a finalidade de restabelecer dentro do possível a homeostase. A Homotoxicologia está baseada nos princípios da Homeopatia aplicados ao conhecimento da cibernética e da imunologia e integrados ao conceito médico da patologia humoral de Hipócrates, da patologia solidária de Giorgio Baglivi, (os portadores de vida que são, ou como causas, e não uma mescla confusa de humores: sangue, fleuma, bile amarela e negra), os conceitos da patologia celular de Rudolf Virchow (1858) e os da patologia molecular ligada aos nomes de H. Schade e P. Grawitz (1946).

Este complexo foi elaborado de acordo com o Princípio do Efeito Inverso descrito por Arndt-Schultz, também denominado Lei Biológica Básica, que estabelece que "estímulos fracos provocam a atividade vital; estímulos médios aumentam a atividade vital; estímulos fortes detêm a atividade vital e estímulos muito fortes destroem a atividade vital", e o Princípio de Bürgi que estabelece que "Duas substâncias que provocam a mesma alteração funcional, respectivamente e que eliminam o mesmo sintoma da doença, somam-se em suas atuações quando possuem os mesmos pontos de atuação e se potencializam quanto estes são distintos". Portanto as substâncias que compõem este complexo foram selecionadas tendo por base a patogênese descrita nas Matérias Médicas e sua indicação está embasada nas atividades dos componentes homeopáticos individuais, descritos em matérias médicas homeopáticas.

*Arsenicum iodatum* – atua na tosse cortante, ligeira e com as narinas secas. Pleurites exsudativas. Bronquite crônica. Tuberculose pulmonar. Pneumonia. Bronco-pneumonia após uma gripe. Tosse seca, sem expectoração. Afonia.

*Atropa belladonna* – indicado na secura de vias aéreas superiores. Atua na tosse curta, seca, com prurido e espasmodia, que piora durante a noite. O paciente sente a respiração oprimida, rápida e desigual. Respiração tipo Cheyne-Stokes, rouquidão e perda da voz. Tem rouquidão indolor. Tem tosse com dor no quadril esquerdo. Tosse canina com dor no estômago antes do ataque, e expectoração com sangue. Tem pontadas no peito ao tossir; sente a laringe muito dolorosa quando tosse e com a sensação de um corpo estranho preso na laringe. Voz elevada, tranquila. Geme em cada respiração.

*Scilla* – atua na laringe e catarros bronquiais com expectoração difícil. Pleurisia com efusão.

*Cuprum acetikum* – atua nos ataques da angina pectoris, quando esta é estimulada por tosse espasmodica violenta. Respiração curta e difícil. Constrição espasmodica no peito. Dispneia.

*Causticum Hahnemanni* – atua na rouquidão com dor no peito; afonia. Laringe dolorida. Tosse dolorida com dor no peito. A expectoração é escassa e o muco é engolido. Tosse com dor no quadril, especialmente o esquerdo, piorando a noite; melhora bebendo água fria; piora no calor da cama. O paciente tem dor na traquéia que se move rapidamente para baixo. Não consegue expelir o muco que está preso sob o esterno e tem dor no peito, com palpitação. Piora deitado e à noite. A voz ecoa aos ouvidos.

