

PAPEL: AP 56G
TINTA: OFFSET - PRETA
Medida da bula: 9,5x15,5 cm
frente/verso

Tipologia:

LISODERME  FUTURA
XBIB BT corpo 14
acetato de dexametasona  FUTURA XBIK BT
corpo 9

Texto da bula: switzerland e
switzerlandnegrito corpo 7,0

NOVA CORREÇÃO 1ª. PROVA - 03/08/2011

Favor conferir e devolver assinado, pelo Fax: (31) 3423-1414

Autorizado Sim ☐ Não ☐

**Atenção: não autorize a confecção do trabalho enquanto
houver ressalvas. Aguarde NOVA PROVA.**

Data: ____/____/2011 Nome: _____

Assinatura: _____

LISODERME

acetato de dexametasona

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO TÓPICO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Creme: bisnaga contendo 10g

COMPOSIÇÃO

Cada grama de creme contém:

Acetato de dexametasona.....1mg
Excipiente q.s.p.1g
Excipientes: glicerol, cera autoemulsionante, álcool cetosteárilico, óleo mineral, lanolina líquida, metilparabeno, propilparabeno, parafina sólida, polissorbato 80, água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

• Ação do medicamento

O Lisoderme atua no alívio da coceira e dos sintomas de inflamação.

• Indicações do medicamento

Antiinflamatório e antipruriginoso tópico utilizado no tratamento de muitas formas de dermatoses. Prurido anogenital inespecífico, dermatoses alérgicas tais como as dermatites de contato, dermatite atópica (eczema alérgico), neurodermatites, pruridos com liquenificações, dermatite eczematóide, eczema alimentar, eczema infantil e dermatite actínica, tratamento sintomático da dermatite seborréica, miliária, impetigo, queimadura devido aos raios solares, picadas de insetos e otite externa (não havendo perfuração da membrana do tímpano). Esta preparação é recomendada como um auxiliar ao tratamento e não como uma substituição à orientação convencional.

• Riscos do medicamento

Contraindicações: este medicamento não deve ser aplicado em presença de tuberculose da pele, varicelas, infecção por fungo ou herpes simples. Não usar em pacientes com história de hipersensibilidade conhecida a corticóides. Não aplicar no ouvido se houver perfuração na membrana do tímpano.

“NÃO HÁ CONTRAINDICAÇÃO RELATIVA A FAIXAS ETÁRIAS.”

Precauções e Advertências: a administração de corticóides se fará estritamente sob orientação médica. No caso de se desenvolverem infecções durante o uso, a aplicação deve ser interrompida até que o estado infeccioso seja controlado por medidas adequadas.

Gravidez e lactação: informe seu médico se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.

“ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA.”

Interações medicamentosas: desconhecem-se interações medicamentosas prejudiciais com o uso de Lisoderme.

“INFORME AO MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.”

“INFORME AO SEU MÉDICO SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.”

“NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.”

• Modo de uso

Aspecto físico: creme branco, homogêneo.

Posologia: aplique uma pequena quantidade do creme no local afetado, 2 ou 3 vezes por dia. Evite uma aplicação indevidamente vigorosa. Antes de aplicar no ouvido, limpe e seque o conduto auditivo externo. Com um aplicador de ponta de algodão, espalhe nas paredes do conduto auditivo externo, uma camada de creme, 2 ou 3 vezes ao dia.

“SIGA A ORIENTAÇÃO DO SEU MÉDICO, RESPEITANDO SEMPRE OS HORÁRIOS, AS DOSES E A DURAÇÃO DO TRATAMENTO.”

“NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO.”

“NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.”

• Reações adversas

Devido ao uso de corticosteróides tópicos podem ocorrer: sensação de ardor, coceira, irritações, securas, foliculite, hipertricrose, erupções acneiformes, hipopigmentação, dermatite alérgica de contato, maceração da pele, estrias e miliária.

• Conduta em caso de superdose

Os componentes da fórmula não causam toxicidade quando utilizados em proporções adequadas sobre a pele. Mas em caso de ingestão acidental, procurar assistência médica imediatamente.

• Cuidados de conservação e uso

Conservar o produto em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz.

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.”

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

• Características farmacológicas

A dexametasona é um glicocorticóide sintético utilizado principalmente por seus potentes efeitos antiinflamatório e antipruriginoso úteis no tratamento de muitas formas de dermatoses. Esta preparação é recomendada como um auxiliar ao tratamento e não como uma substituição à orientação convencional.

“VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.”

MS 1.0571.0123

Farmacêutico Responsável:
Dr. Rander Maia CRF-MG 2546

Número do Lote,
Data de Fabricação e
Prazo de Validade:
VIDE EMBALAGEM

S.A.C.: 0800 0310055

BELFAR LTDA.

Rua Alair Marques Rodrigues, 516
Belo Horizonte - MG

CEP 31560-220

C.N.P.J.: 18.324.343/0001-77

Indústria Brasileira

 **BELFAR**