



MALVATRICIN®

Laboratório Daudt Oliveira Ltda  
Gel dental  
tirotricina 0,25 mg/g  
sulfato de hidroxiquinolina 6,20 mg/g  
fluoreto de sódio 2,20 mg/g

## IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

### MALVATRICIN®

Gel dental

tirotricina 0,25 mg/g, sulfato de hidroxiquinolina 6,20 mg/g, fluoreto de sódio 2,20 mg/g

### APRESENTAÇÃO

Gel dental. Bisnaga contendo 50 g.

### VIA BUCAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada grama contém:

tirotricina ..... 0,25 mg/g  
sulfato de hidroxiquinolina ..... 6,20 mg/g  
fluoreto de sódio ..... 2,20 mg/g (correspondendo a 1000 ppm de Flúor).

Excipientes\* ..... q.s.p. 1,00g

\*álcool etílico, benzoato de sódio, fosfato de sódio dibásico, hietelose, laurilsulfato de sódio, mentol, óleo de menta tri-retificado, sacarina sódica, sorbitol, tartarato de sódio, *Malva sylvestris L.*(tintura), corante azul brilhante, água purificada.

**Este produto contém álcool em sua composição (0,0161 mL/g).**

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

**Malvatricin®** gel dental é destinado ao tratamento de afecções da boca, aftas e na profilaxia de cáries.

#### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

**Malvatricin®** gel dental é um medicamento de uso tópico bucal que age como antisséptico, sendo também eficaz na prevenção de cáries.

#### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Malvatricin®** gel dental é contraindicado para pacientes que tenham alergia a qualquer um dos componentes de sua formulação.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Crianças menores de 6 anos devem usar o produto sob a supervisão de um adulto durante a escovação, para minimizar a deglutição.**

**Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informe seu médico se você está amamentando.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Este medicamento contém álcool em sua composição (0,0161 mL/g).**

Não são conhecidas até o momento interações medicamentosas com o uso deste medicamento.

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Malvatricin®** gel dental deve ser guardado em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15° e 30° C) e ao abrigo da luz.

**Número do lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Escove os dentes normalmente de 3 a 5 vezes ao dia. Pode-se também utilizar o dedo indicador para massagear a gengiva. Para uma melhor ação do produto, é aconselhável não comer ou beber durante 30 minutos após o uso.

**O produto não deve ser ingerido.**

**Uso em pacientes idosos:** não há recomendações especiais sobre o uso de **Malvatricin®** gel dental por pacientes idosos.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre o medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso você tenha esquecido ou estiver impossibilitado de usar este medicamento nos horários pré-determinados, tão logo seja possível, retorne ao seu uso conforme recomendado.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Até o momento, não foram registradas reações adversas graves com o uso de Malvatricin® gel dental

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

#### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### **DIZERES LEGAIS**

MS 1.0143.0024

Farm. Resp. Michele Vieira Espíndola – CRF / RJ 17419

Laboratório Daudt Oliveira Ltda.

Rua Simões da Mota, 57 – Rio de Janeiro – RJ

CNPJ 33.026.055/0001-20

Indústria Brasileira

SAC 0800 707 0987

[sac@grupodaudt.com.br](mailto:sac@grupodaudt.com.br)

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.**



