

# Maxicam Plus 0,5 mg

Uso Veterinário

Anti-inflamatório não esteroide, analgésico e regenerador articular à base de Meloxicam e Sulfato de Condroitina A.

## Fórmula:

Cada comprimido revestido de 600 mg contém:  
Meloxicam ..... 0,5 mg  
Sulfato de Condroitina A ..... 100 mg  
Excipiente q.s.p. .... 600 mg

## Indicações:

**Maxicam Plus 0,5 mg** é uma associação de um anti-inflamatório não esteroide com atividade inibidora seletiva da ciclooxigenase-2 (COX-2) - o Meloxicam - com um condroprotetor com atividade reparadora de tecidos ósseos e cartilaginosos - o Sulfato de Condroitina A.

O bloqueio seletivo da COX-2 proporcionado pelo Meloxicam confere atividade anti-inflamatória, analgésica e antiexsudativa com mínimos efeitos gastrolesivos ou ulcerogênicos. Além destes efeitos, Meloxicam inibe ainda a infiltração de leucócitos no tecido inflamado e previne a destruição óssea e cartilaginosa que ocorre nos processos degenerativos ósseos e cartilaginosos. O Sulfato de Condroitina A é um importante componente natural da cartilagem articular, responsável por manter a integridade fisiológica e funcional do tecido cartilaginoso e do

fluido sinovial, devolvendo a mobilidade articular. Uma outra função muito importante do Sulfato de Condroitina A é a neutralização de enzimas que são produzidas pela cartilagem lesionada e que aumentam a degeneração do tecido cartilaginoso. Promove a reparação do fluido sinovial e do tecido cartilaginoso e ósseo graças a sua capacidade de estimular a biossíntese de proteoglicanos e colágeno. Contribui para o alívio da dor, redução do processo inflamatório e regeneração do tecido articular, acelerando o processo de cura.

**Maxicam Plus 0,5 mg** é indicado como analgésico, anti-inflamatório, antiexsudativo e regenerador articular para cães e gatos, sendo especialmente indicado nas patologias dolorosas ou degenerativas, agudas ou crônicas, do aparelho osteomioarticular, tais como: osteítes, artrites, artrites reumatóides, osteoartrites, espondiloses, espondiloartroses anquilosantes, displasias coxo-femorais, calcificação de discos intervertebrais, reparação de fraturas, pós-operatório de artroplastias e traumatismos.

## Modo de uso e dosagens:

Administrar o comprimido em dosagem de acordo com a tabela abaixo, uma vez ao dia.

### Dosagem para cães:

Primeiro dia de tratamento	2 comprimidos para cada 5 kg de peso corporal (0,2 mg de Meloxicam e 40 mg de Sulfato de Condroitina A por kg de peso corporal).
Segundo dia de tratamento em diante	1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal (0,1 mg de Meloxicam e 20 mg de Sulfato de Condroitina A por kg de peso corporal).

## Dosagem para gatos:

**1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal** (0,1 mg de Meloxicam por kg de peso corporal e 20 mg de Sulfato de Condroitina A por kg de peso corporal).

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro. Nos casos agudos recomenda-se o tratamento por 05 a 07 dias. Nos quadros crônicos podem ser necessários tratamentos prolongados por um período máximo de 28 dias ou a critério do médico-veterinário.

Em gatos, o tratamento não deve ultrapassar 04 dias consecutivos. Recomendamos a continuidade do tratamento com Sulfato de Condroitina A a critério do médico-veterinário.

### Interações medicamentosas:

Não administrar juntamente com outros anti-inflamatórios esteroides ou não esteroides ou após o tratamento com estas drogas.

Não administrar juntamente com antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos.

Não administrar juntamente com agentes anticoagulantes como a warfarina ou a aspirina.

### Contraindicações e limitações de uso:

Não administrar em animais com distúrbios cardíacos, hepáticos ou renais severos.

Não administrar em animais com possível ulceração gastrointestinal ou que apresentarem evidência de desordem hemorrágica ou hipersensibilidade ao produto.

Não administrar a cadelas e gatas prenhes no terço final da gestação ou em lactação.

Não utilizar o produto em intoxicações por drogas anticoagulantes (Ex: Cumarina).

### Precauções:

Obedecer às dosagens e vias de administração indicadas para o uso do produto. Somente o médico-veterinário

está apto a fazer alterações nas dosagens recomendadas para o uso do produto.

O tratamento de animais idosos ou com menos de 06 semanas de idade deve ser cuidadosamente acompanhado pelo médico-veterinário, sendo, em alguns casos, necessário reduzir a dosagem a ser administrada. Descontinuar o tratamento na ocorrência de vômitos, diarreias ou perda do apetite.

### Reações adversas:

Podem ocorrer reações gerais como perda de apetite, vômito, diarreia, melena e apatia. Estas reações são geralmente transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou término do tratamento.

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

### Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n.º 8935 em 09/08/04.

### Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508

KIT 50003164/10

**Proprietário e fabricante:**  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
www.ourofino.saudeanimal.com  
Indústria brasileira

**16 3518 2025**



50003297 / OBRIG. O.F.O.O.

**ourofino**  
saúde animal

# Maxicam Plus 2,0 mg

Uso Veterinário

Anti-inflamatório não esteroide, analgésico e regenerador articular à base de Meloxicam e Sulfato de Condroitina A.

## Fórmula:

Cada comprimido de 800 mg contém:  
Meloxicam ..... 2 mg  
Sulfato de Condroitina A ..... 400 mg  
Excipiente q.s.p. .... 800 mg

## Indicações:

**Maxicam Plus 2,0 mg** é uma associação de um anti-inflamatório não esteroide com atividade inibidora seletiva da cicloxigenase-2 (COX-2) - o Meloxicam - com um condroprotetor com atividade reparadora de tecidos ósseos e cartilaginosos - o Sulfato de Condroitina A.

O bloqueio seletivo da COX-2 proporcionado pelo Meloxicam confere atividade anti-inflamatória, analgésica e antiexsudativa com mínimos efeitos gastrolesivos ou ulcerogênicos. Além destes efeitos, Meloxicam inibe ainda a infiltração de leucócitos no tecido inflamado e previne a destruição óssea e cartilaginosa que ocorre nos processos degenerativos ósseos e cartilaginosos.

O Sulfato de Condroitina A é um importante componente natural da cartilagem articular, responsável por manter a integridade fisiológica e funcional do tecido cartilaginoso e do

fluido sinovial, devolvendo a mobilidade articular. Uma outra função importante do Sulfato de Condroitina A é a neutralização de enzimas que são produzidas pela cartilagem lesionada e que aumentam a degeneração do tecido cartilaginoso. Promove a reparação do fluido sinovial e do tecido cartilaginoso e ósseo graças a sua capacidade de estimular a biossíntese de proteoglicanos e colágeno. Contribui para o alívio da dor, redução do processo inflamatório e regeneração do tecido articular, acelerando o processo de cura.

**Maxicam Plus 2,0 mg** é indicado como analgésico, anti-inflamatório, antiexsudativo e regenerador articular para cães de médio a grande porte, sendo especialmente indicado nas patologias dolorosas ou degenerativas, agudas ou crônicas, do aparelho osteomioarticular, tais como: osteítes, artrites, artrites reumatoides, osteoartrites, espondiloses, espondiloartroses anquilosantes, displasias coxo-femorais, calcificação de discos intervertebrais, reparação de fraturas, pós-operatório de artroplastias e traumatismos.

## Modo de uso e dosagens:

Administrar o comprimido em dosagem de acordo com a tabela abaixo, uma vez ao dia.

### Dosagem:

<b>Primeiro dia de tratamento</b>	<b>2 comprimidos para cada 20 kg de peso corporal</b> (0,2 mg de Meloxicam e 40 mg de Sulfato de Condroitina A por kg de peso corporal).
<b>Segundo dia de tratamento em diante</b>	<b>1 comprimido para cada 20 kg de peso corporal</b> (0,1 mg de Meloxicam e 20 mg de Sulfato de Condroitina A por kg de peso corporal).

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro. Nos casos agudos recomenda-se o tratamento por 05 a 07 dias. Nos quadros crônicos podem ser necessários tratamentos prolongados por um período máximo de 28 dias ou a critério do médico-veterinário.

Recomendamos a continuidade do tratamento com Sulfato de Condroitina A a critério do médico-veterinário.

#### Interações medicamentosas:

Não administrar juntamente com outros anti-inflamatórios esteroides ou não esteroides ou após o tratamento com estas drogas.

Não administrar juntamente com antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos.

Não administrar juntamente com agentes anticoagulantes como a warfarina ou a aspirina.

#### Contraindicações e limitações de uso:

Não administrar em animais com distúrbios cardíacos, hepáticos ou renais severos.

Não administrar em animais com possível ulceração gastrointestinal ou que apresentarem evidência de desordem hemorrágica ou hipersensibilidade ao produto.

Não administrar a cadelas prenhes no terço final da gestação ou em lactação.

Não utilizar o produto em intoxicações por drogas anticoagulantes (Ex: Cumarina).

#### Precauções:

Obedecer às dosagens e vias de administração indicadas para o uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens recomendadas para o uso do produto. O tratamento de animais idosos ou com menos de 06 semanas de idade

deve ser cuidadosamente acompanhado pelo médico-veterinário, sendo, em alguns casos, necessário reduzir a dosagem a ser administrada.

Descontinuar o tratamento na ocorrência de vômitos, diarreias ou perda do apetite.

#### Reações adversas:

Podem ocorrer reações gerais como perda de apetite, vômito, diarreia, melena e apatia. Estas reações são geralmente transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou término do tratamento.

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

#### Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

#### Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n.º 8936 em 09/08/04.

KIT 50003263/10

**Proprietário e fabricante:**  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
[www.ourofino.saudeanimal.com](http://www.ourofino.saudeanimal.com)  
Indústria brasileira

 16 3518 2025



50003263/0918 O.FOO

 **ourofino**  
saúde animal