

Monovin A



USO VETERINÁRIO INJETÁVEL

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Vitamina A 10.000.000 UI

Veículo oleoso q.s.p. 100,00 mL

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS: ABATE - CARÊNCIA ZERO. LEITE - CARÊNCIA ZERO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE
RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS,
TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA
O CONSUMO.**

Indicações:

Prevenção e tratamento das avitaminoses e hipovitaminoses A (carência de vitamina A) e suas manifestações, em bovinos.

Notícia Terapêutica:

Um índice reduzido de crescimento é o primeiro sinal de deficiência de vitamina A no animal. Os estados de hipo ou avitaminose A trazem como consequência nos animais a troca da estrutura epitelial das membranas mucosas, debilitando o epitélio normal. Estas trocas nas superfícies epiteliais do corpo reduzem sua resistência às infecções bacterianas. Assim quando há deficiência de vitamina A, ocorrem infecções graves nos olhos (xeroftalmia), no aparelho respiratório, trato geniturinário e boca. A carência de vitamina A pode ocasionar: afecções oculares - conjuntivites, querato-conjuntivites, xeroftalmia e cegueira noturna (hemeralopia); transtornos nervosos com incoordenação

muscular, passo vacilante e ataques convulsivos; esterilidade, abortos ou partos com fetos mortos; afecções cutâneas e pelo sem brilho.

Monovin A aumenta o poder das superfícies epiteliais para resistir às infecções locais, ajudando na recuperação do seu estado normal e é essencial para a visão normal, pois a deficiência de vitamina A pode provocar a cegueira noturna.

Modo de usar e dosagem:

Aplicar através de injeções intramusculares profundas.

Desinfetar o local da aplicação. Usar seringas e agulhas descartáveis ou esterilizadas.

Bovinos de grande porte – 10 mL (meio frasco) por dia, durante 3 a 6 dias consecutivos.

Bovinos de médio porte e bezerros – 4 a 6 mL por dia, durante 3 a 6 dias consecutivos.

Aplicar o produto até o desaparecimento dos sintomas ou a critério do Médico Veterinário.

Apresentação:

Frasco-ampola com 20 mL.

Conservar em local fresco, seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação conforme orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 0240 em 24/10/72.

Responsável Técnica: Dr^a Valéria Souza de Faria - CRMV-RJ nº 4.266.



Proprietário e Fabricante:

LABORATÓRIO BRAVET LTDA.

INDÚSTRIA BRASILEIRA