



# NECRO<sup>®</sup>B6

**BUNKER**

cloridrato de piridoxina  
d-l-metionina

---

## FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Solução oral: embalagem contendo 6 e 100 flaconetes de 10 mL.

### USO ORAL

### USO ADULTO

### COMPOSIÇÃO

Cada mL da solução oral contém:

cloridrato de piridoxina (vitamina B6) ..... 1 mg (\*2307,7% IDR)

d-l-metionina ..... 10 mg

veículo q.s.p. .... 1 mL

(sacarina sódica, ciclamato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, hidróxido de sódio, corante amarelo nº 10, propilenoglicol, sorbitol, essência de abacaxi e água.

\* Teor percentual do componente na posologia máxima indicada na bula (3 frascos ao dia) relativo à Ingestão Diária Recomendada para adultos.

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### Ação esperada do medicamento:

O NECRO B6<sup>®</sup> é constituído por substâncias de ações fisiológicas, que auxiliam na redução de sintomas dispépticos, tais como: plenitude gástrica pós-prandial, distensão abdominal, má digestão, náusea e enjoo.

#### Cuidados de armazenamento:

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 a 30°C), proteger da luz e umidade.

#### Prazo de validade:

O prazo de validade está indicado na embalagem do produto.

**Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**

#### Gravidez e lactação:

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informar ao médico se está amamentando.

#### Categoria A de risco na gravidez.

#### Cuidados de administração:

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre as doses, os horários e duração do tratamento.

#### Interrupção do tratamento:

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

#### Reações adversas:

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

Ainda não são conhecidas a intensidade e frequência das reações adversas.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Ingestão concomitante com outras substâncias:

Não há relato.

#### Contraindicações e Precauções:


Informe seu médico sobre qualquer outro medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula.

**NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO; PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.**

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O medicamento NECRO B6<sup>®</sup> contém em sua formulação uma associação das substâncias cloridrato de piridoxina (vitamina B6) e a metionina, um aminoácido essencial, ou seja, substâncias de ações fisiológicas, importante para normatizar o metabolismo protéico



e lipídico nos casos em que há alterações metabólicas. A metionina é um aminoácido essencial, que tem importância na função no fígado por sua ação antioxidante acentuada e por ser precursora da S-Adenosil-L-Metionina (SAME) e do glutatión, um reconhecido antioxidante. A conversão de metionina em cisteína também depende da vitamina B6. A piridoxina tem importante papel no metabolismo como coenzima para muitas transformações metabólicas de aminoácidos, incluindo descarboxilação, transaminação e racemização, bem como em etapas enzimáticas do metabolismo de aminoácidos que contém enxofre e hidroxiaminoácido. O cloridrato de piridoxina opõe-se a formação de substâncias tóxicas provenientes especialmente do metabolismo das proteínas e funciona como fator predisponentes a náuseas e enjoos.

#### **INDICAÇÕES**

Para sintomas dispépticos, tais como: plenitude gástrica pós-prandial, distensão abdominal, má digestão, náusea e enjoos.

#### **CONTRAINDICAÇÕES**

Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

#### **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS**

A administração de **NECRO B6®** não exige precauções especiais.

**Gravidez e lactação: o uso do produto durante a gravidez e período de lactação não exige precauções especiais.**

**Categoria A de risco na gravidez.**

#### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Até o momento não foram relatados casos de interações medicamentosas com o uso do produto.

#### **REAÇÕES ADVERSAS**

Ainda não foram relatados casos de reações adversas com o uso do produto.

#### **POSOLOGIA E MODO DE USAR**

**Adultos:** 1 flaconete, 3 vezes ao dia, com um pouco de água ou puro. Podendo ser tomado antes das refeições.

#### **CONDUTA NA SUPERDOSAGEM**

Na eventualidade da administração acidental de doses muito acima das preconizadas, recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

#### **PACIENTES IDOSOS**

Não há relato de intercorrências até o momento sobre o uso do produto em pacientes maiores de 65 anos de idade.

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

\* Marca Registrada

Reg. MS nº 1.0577.0019

Número do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho

Farm. Resp.: Dr. Marcelo Ramos - CRF-SP nº 16.440

**Bunker Indústria Farmacêutica Ltda.**

Rua Aníbal dos Anjos Carvalho, 212 - Cidade Dutra - São Paulo - SP

C.N.P.J. 47.100.862/0001-50 - Indústria Brasileira



BK02964