

# PARASIMED

benzoato de benzila

## Forma Farmacêutica e Apresentação:

Sabonete: 60 g

Emulsão tópica: Frasco com 60 mL

## USO ADULTO E PEDIÁTRICO - USO EXTERNO

### Composição:

Cada 1g de PARASIMED sabonete contém:

benzoato de benzila ..... 100 mg

Excipientes\* qsp ..... 1g

\* massa base e essência.

Cada mL de PARASIMED emulsão contém:

benzoato de benzila ..... 250 mg

Veículo\* qsp ..... 1mL

\* metilparabeno, propilparabeno, trolamina, ácido oléico, laurilsulfato de sódio, simeticona emulsão e água deionizada.

### Informações ao Paciente:

PARASIMED, quando aplicado topicamente (uso externo), em concentrações de 10% a 30%, atua, eficazmente e seletivamente, na escabiose e pediculose, destruindo o ectoparasita causador da moléstia, sem prejudicar o hospedeiro.

Evitar calor excessivo (temperatura superior a 40°C). Manter sempre bem fechado.

O produto se conserva estável por um período de 36 meses, a partir da data da sua fabricação.

**O prazo de validade está gravado nas embalagens. Não use medicamento com o prazo vencido.**

**Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez, na vigência do tratamento ou após o seu término. O uso em gestantes e crianças deve obedecer cuidados e observações rigorosos.**

Diluir com água (crianças: 3 partes de água; idosos: igual volume de água) para amenizar a irritação local.

Não amamentar durante o tratamento.

**Para uma melhor eficácia terapêutica de PARASIMED, é conveniente fazer uso das duas formas farmacêuticas, concomitantemente.**

Como normas gerais de higiene, recomenda-se:

- Ferver as roupas de cama e de uso pessoal, mantendo-as limpas;
- Manter as unhas curtas e limpas. No caso de pediculose (piolhos) e ftíriase (chatos), manter os cabelos curtos e limpos;
- Não coçar exageradamente e colocar luvas de proteção nas crianças;
- Evitar o contato com possíveis portadores e seus objetos de uso;
- Alertar os responsáveis pelas instituições coletivas freqüentadas pelo portador do parasita.

**Manter o produto longe dos olhos.**

**Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Se houver interrupção do tratamento, pode ocorrer reinfestação.**

Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis tais como: vertigens, náuseas, vômitos, diarréias, cefaléias e reações cutâneas.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**O produto é contra-indicado nos casos de hipersensibilidade ao benzoato de benzila, lesões da pele, feridas abertas, queimaduras ou condições que possibilitem maior absorção. Caso ocorra hipersensibilidade ao produto, consultar o médico.**

**Evitar o contato do produto com os olhos e mucosas.**

**Evitar a contaminação de alimentos pelo produto.**

**Não reutilizar a embalagem vazia.**

**Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.**

**NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.**

### **Informações Técnicas**

**Características:** O benzoato de benzila corresponde ao éster fenilmetílico do ácido benzóico. Seu mecanismo de ação provável atua no sistema nervoso do parasita, causando sua morte.

**Indicações:** No tratamento das ectoparasitoses, pediculoses e escabioses.

#### **Contra-indicações:**

Hipersensibilidade ao benzoato de benzila. O risco / benefício deve ser avaliado em inflamações epidérmicas agudas, escoriações abertas ou feridas com exsudato.

#### **Precauções e Advertências:**

PARASIMED é indicado somente para uso externo.

Não deve ser ingerido ou inalado.

Não amamentar durante o tratamento.

O uso em gestantes e crianças deve obedecer cuidados e observações rigorosos.

Diluir com água (crianças: 3 partes de água; idosos: igual volume de água) para amenizar a irritação local.

Evitar o contato com olhos e mucosas.

**Interações Medicamentosas:** Não há relatos até o momento.

**Interferência em exames:** Não há relatos até o momento.

#### **Reações Adversas/ Colaterais:**

Irritação local. Embora raro, é possível ocorrer reações de hipersensibilidade ou absorção maior que o comum, tais como: vertigem, cefaléia, náuseas, vômitos, diarréia, convulsões, dispnéias e reações cutâneas.

#### **Posologia:**

**SABONETE:** ensaboar energicamente a região afetada por 3 minutos, deixando a espuma por 10 minutos e enxaguar. Repetir a aplicação por 2 ou 3 dias.

**EMULSÃO:** tomar banho quente com o sabonete e, antes que o corpo esteja completamente enxuto, aplicar a emulsão no corpo inteiro abaixo do pescoço e deixar secar. Lavar o resíduo e reaplicar o produto em 24 horas. Para o tratamento do couro cabeludo, proceder à limpeza também com água quente e sabão, retirar o excesso de água e massagear o couro cabeludo com o produto, deixando secar naturalmente. Repetir o mesmo processo após 24 horas. Fazer a aplicação por 3 noites seguidas.

PARASIMED Sabonete e Emulsão devem ser reaplicados por mais 8 a 14 dias, após a primeira aplicação, devido a possível reinfestação por permanência de ovos. Caso a pele apresente lesões, estas devem ser tratadas antes de iniciar o tratamento com benzoato de benzila.

#### **Superdosagem:**

No caso de ingestão acidental, o tratamento é, principalmente, de suporte. Deve-se induzir ao vômito, nos indivíduos conscientes e realizar lavagem gástrica nos inconscientes.

No caso de superdosagem, os sintomas mais comuns são: excitação central, dermatite de contato e retenção urinária. Procure orientação médica.

**Pacientes Idosos:**

Para amenizar a irritação local, deve-se diluir PARASIMED emulsão em igual volume de água.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS  
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagens

Reg. MS nº 1.4381.0014

Farm. Resp. Charles Ricardo Mafra CRF-MG 10.883

Cimed Indústria de Medicamentos Ltda.

Av. Cel. Armando Rubens Storino, 2750 - Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000

CNPJ: 02.814.497/0002-98 - Indústria Brasileira