

Composição de Passifuril

nifuroxazida (1-(5-nitro-furfurildeno)2-para-hidroxibenzo-hidrazida).

Posologia e Administração de Passifuril

recém-nascidos e lactentes: 1 a 3 colheres de chá (ou copo-dose) por dia. Crianças com mais de 5 anos e adultos: 3 a 5 colheres de chá ou 4 a 6 cápsulas por dia.

Contra-Indicações de Passifuril

não administrar a gestantes até o 3º mês. Toxicidade: pouco solúvel em água, não é absorvida pelo T.G.I., sendo nula sua toxicidade.

Indicações de Passifuril

anti-séptico intestinal nas colites agudas e inflamatórias, toxiinfecções alimentares. A nifuroxazida mostrou-se dotada de propriedades anti-sépticas importantes diante de várias bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, A. E. coli, Salmonella paratyphy-A, S. faecalis, S. pyogenes etc.

Apresentação de Passifuril

suspensão: vidro contendo 40 ml. Cápsulas: vidro contendo 12 cápsulas.

Ver informações do laboratório

PASSIFURIL - Laboratório

MILLET ROUX

Praia de Botafogo, 440 - 26º andar

Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20251-250

Tel: 55 (021) 266-5188

Fax: 55 (021) 539-0608