

Proctosan[®]

POMADA

cloridrato de lidocaína 25mg
mentol 2,5mg - azuleno a 25% - 0,5 mg
Aesculus hippocastanum 0,075ml
(CASTANHA DA ÍNDIA)
Hamamelis virginiana 0,025ml
(HAMAMÉLIS)

HERTZ[®]

FORMA FARMACÉUTICA E APRESENTAÇÃO
Pomada retal - caixa com bisnaga de alumínio de 20 g.

USO EXTERNO

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada grama contém:

Cloridrato de lidocaína	25,000 mg
Mentol	2,500 mg
Azuleno a 25 %	0,500 mg
Extr. Fl. de Castanha da Índia (Aesculus hippocastanum)	0,075 ml
Extr. Fl. Hamamélis (Hamamelis virginiana L.)	0,025 ml
Excipiente q.s.p.	1,000 g

Excipientes: ácido esteárico, lanolina anidra, metilparabeno, propilparabeno, trolamina, petrolato branco, água deionizada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PROCTOSAN Pomada é utilizada na profilaxia e tratamento das varizes e hemorroidas. Cuidados de conservação: evitar calor excessivo (temperatura acima de 40°C) e proteger da luz e umidade. Prazo de validade: 36 meses. Informar seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar seu médico se estiver amamentando. Informar ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis como: erupção cutânea, urticária ou angioedema por reação alérgica. Os medicamentos depressores do sistema nervoso central podem aumentar os efeitos depressores da lidocaína. A utilização simultânea com bloqueadores neuromusculares

pode potencializar ou prolongar a ação destes. Informar ao seu médico qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento. Deve ser administrada com cuidado na presença de hemorroidas sangrentas, infecção local na zona de tratamento (diminuição ou perda do efeito anestésico local) e trauma grave da mucosa (aumenta sua absorção). O produto é contra-indicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula, na gravidez e lactação. Pacientes idosos podem ter a sensibilidade alterada com a idade. Recomenda-se o uso sob prescrição médica.

O produto poderá conter ar dentro do tubo, sem que este interfira na quantidade declarada na embalagem.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PROCTOSAN Pomada contém substâncias ativas, que inibem a formação de edemas inflamatórios locais e promovem alívio imediato dos sintomas hemorroidários e varicosos (dores, prurido, sensação de ardor e de tensão).

Lidocaína - O cloridrato de lidocaína é um anestésico local indicado para anestésias regionais.

Mentol - tem características antipruriginosas e refrescantes, causa vasodilatação e uma sensação de frio seguido de analgesia (rubefaciente), quando aplicado sobre a pele.

O **Azuleno** confere ação antiinflamatória ao produto, reduzindo o edema e outros sintomas presentes no quadro inflamatório.

Castanha-da-índia e **Hamamélis** têm ação vasoconstritora e agem especificamente nos vasos dilatados.

INDICAÇÕES

Na profilaxia e tratamento das varizes e hemorroidas.

CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula, na gravidez e lactação.

PRECAUÇÕES

Deve ser administrada com cuidado na presença de hemorroidas sangrentas, infecção local na zona de tratamento (diminuição ou perda do efeito anestésico local) e trauma grave da mucosa (aumenta sua absorção).

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Os medicamentos depressores do sistema nervoso central podem aumentar os efeitos depressores da lidocaína. A utilização simultânea com bloqueadores neuromusculares pode potencializar ou prolongar a ação destes.

REAÇÕES ADVERSAS

Podem ocorrer reações alérgicas como erupção cutânea, urticária ou angioedema.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Adultos e crianças acima de 12 anos:

Hemorroidas:

Duas aplicações diárias (pela manhã e ao deitar) ou conforme necessidade. Recomenda-se realizar as aplicações após a evacuação intestinal e higiene local.

Antes do uso, lubrificar o aplicador com a própria pomada. Retirar a tampa, romper o lacre da bisnaga e rosquear o bico aplicador. Introduzir no reto, pressionando à medida que a retira lentamente. Aplicar também na parte externa e pregas da pele da margem anal. Após o uso, lavar o bico aplicador e manter a bisnaga bem fechada.

Varizes:

Aplicar de 2 a 3 vezes ao dia, massageando suavemente e prolongadamente o local.

SUPERDOSAGEM

Em caso de utilização de dose e frequência muito acima das preconizadas, pode haver absorção sistêmica ocasionando aumento de reações adversas e efeitos colaterais.

PACIENTES IDOSOS

Pacientes idosos podem ter a sensibilidade alterada com a idade. Recomenda-se o uso sob prescrição médica.

Data de fabricação, data de vencimento e lote
Vide cartucho.



SAC 0800 7049001
www.kleyhertz.com.br

KLEY HERTZ S.A - Indústria e Comércio

Rua Comendador Azevedo, 224 - P. Alegre - RS
Farmacêutica Resp.: Paula Carniel Antonio
CRF-RS 4228 - Reg. no M.S. 1.0689.0036.002-6
C. N. P. J. n^o 92.695.691/0001-03
INDÚSTRIA BRASILEIRA