

Procts H

acetato de hidrocortisona 0,5%
lidocaína base 2,0%
subgalato de bismuto 2,0%
óxido de zinco 10,0%

Pomada para Fissuras de Períneo



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES:

Pomada: cartucho contendo 1 bisnaga de 20g + 1 aplicador

Pomada: cartucho contendo 1 bisnaga de 20g + 6 aplicadores

USO ADULTO

USO EXTERNO

COMPOSIÇÃO:

Cada g contém:

acetato de hidrocortisona	5 mg
lidocaína base	20 mg
subgalato de bismuto	20 mg
óxido de zinco	100 mg

Excipientes: propilenoglicol, butilhidroxitolueno e macrogol.

INDICAÇÕES

Dor e sangramento de hemorroidas internas ou externas, pruridos anais, eczema perianal, proctite branda, fissuras, pró e pós-operatório em cirurgias anorretais (proctológicas).

PROCTS H é um medicamento anti-hemorroidal de uso tópico com ação analgésica, anti-inflamatória e antipruriginosa utilizado para o tratamento das hemorroidas, fissuras anais, proctites e eczemas anais. Sua formulação contém o acetato de hidrocortisona que tem ação anti-inflamatória e vasoconstritora quando aplicados diretamente na pele, favorecendo a melhora da circulação sanguínea e diminuindo a secreção da mucosa. A lidocaína é um anestésico com efeito analgésico e antipruriginoso que alivia os sintomas causados pelas hemorroidas, como: dor, coceira, ardor e inflamação. Sua ação é esperada dentro de alguns minutos após a aplicação. O subgalato de bismuto tem efeito anti-inflamatório e antimicrobiano amplamente utilizado para a cicatrização e reparação de feridas. O óxido de zinco tem ação antisséptica e é usado topicamente como relaxante e protetor da pele na aplicação em eczemas, feridas e hemorroidas.

MODO DE USAR:

Uso externo. Aplicar na área afetada, duas a três vezes ao dia (manhã e a noite). Com a diminuição dos sintomas, uma aplicação ao dia por dois a três dias ou a critério médico.

Espalhe pequena quantidade de pomada na região ao redor do ânus e no orifício anal com o dedo. Usar a ponta do dedo para vencer a resistência do esfíncter do ânus.

O aplicador deve ser adaptado à bisnaga depois de retirada a tampa (a qual deverá ser recolocada após a utilização). Aplicar a pomada utilizando o aplicador, o qual deve ser limpo logo após o uso. O aplicador deve ser adaptado à bisnaga depois de retirada a tampa (a qual deverá ser recolocada após a utilização) e então inserido no ânus. Uma pequena quantidade da pomada deve ser aplicada no reto espremendo a bisnaga suavemente. Nos casos em que a região anal esteja muito inflamada e com lesão dolorosa, é aconselhável iniciar a aplicação da pomada internamente com o dedo.

Recomenda-se o uso de PROCTS H após a defecação. A região anal deve ser cuidadosamente limpa antes do uso.

ADVERTÊNCIAS:

- Não utilizar no caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
- Não foram estabelecidas a segurança e eficácia deste produto em crianças, gestantes e mulheres no período da amamentação.
- Evitar permanecer sentado por períodos prolongados e adotar alimentação que evite o ressecamento das fezes.

Mantenha o produto em sua embalagem original em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). O prazo de validade é de 24 meses.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

PARA CORRETA UTILIZAÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, SOLICITE ORIENTAÇÃO DO FARMACÊUTICO.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

N.º do lote, data da fabricação e data da validade: vide cartucho

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA
RDC ANVISA N° 199/2006
AFE N° 1.00.497-7.

União Química Farmacêutica Nacional S.A.
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 - Embu-Guaçu - SP
CEP 06900-000 - CNPJ 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira
Farm. Resp.: Florentino de Jesus Krencas - CRF-SP n° 49136

Fabricado na unidade fabril:
Trecho 1 Conj. 11, Lote 6/12 - Polo de Desenvolvimento JK - Brasília - DF
CEP 72.549-555 - CNPJ 60.665.981/0007-03
Indústria Brasileira
SAC 0800 11 1559

4008728 - 110x 200 mm

