

PROSTEM PLUS®

Extrato seco do córtex de *Pygeum africanum*
Extrato seco da raiz de *Urtica dioica*

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

NOMENCLATURA POPULAR

Pygeum africanum: Ameixa africana
Urtica dioica: Urtiga

FAMÍLIA

Pygeum africanum: Rosaceae
Urtica dioica: Urticaceae

PARTE UTILIZADA

Pygeum africanum: Córtex
Urtica dioica: Raiz

APRESENTAÇÕES

Cápsulas gelatinosas moles 25/300mg – cartucho com 12 cápsulas.

VIA ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula de **PROSTEM PLUS®** contém:

Extrato seco do córtex de <i>Pygeum africanum</i>	25 mg*
Extrato seco da raiz de <i>Urtica dioica</i>	300 mg**
Excipientes q.s.p.	1 cápsula
Excipientes: óleo de semente de abóbora, simeticone, lecitina de soja, cera de abelhas, gordura vegetal hidrogenada e vitamina E livre q.s.p.....1 cápsula	

*equivalente a 2,5 mg de betasitosterol

**equivalente a 2,4 mg de betasitosterol

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é destinado ao tratamento dos sintomas decorrentes do aumento benigno da próstata (aumento da frequência do ato de urinar - polaciúria, dificuldade de urinar - disúria e resíduo vesical pós miccional).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

PROSTEM PLUS® é um preparado combinado, destinado a reduzir os distúrbios causados pela hiperplasia benigna da próstata, suprimindo os problemas miccionais e aumentando o estímulo de esvaziamento da bexiga. A ação conjunta destas duas substâncias restabelece a funcionalidade prostática vesical e alivia os sintomas dos distúrbios miccionais decorrentes da HPB, como a polaciúria, disúria, nictúria, dificuldade para início da micção, jato urinário fraco e resíduo vesical pós miccional, além de outros.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve tomar **PROSTEM PLUS®** se tiver alergia ao *Pygeum africanum* e a *Urtica dioica* ou aos outros componentes da fórmula.

Este medicamento é contra-indicado para uso por mulheres.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não há restrições ao uso de **PROSTEM PLUS®** em pessoas diabéticas.
As melhorias nas funções e nos sintomas não excluem o acompanhamento do médico.
Não são conhecidas até o presente momento interações medicamentosas.
Não são conhecidas quaisquer restrições ao uso de **PROSTEM PLUS®** com alimentos.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve conservar **PROSTEM PLUS®** em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz e da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

A cápsula de **PROSTEM PLUS®** é gelatinosa mole, oblonga, de cor vinho, contendo líquido oleoso, viscoso e cor marrom.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve tomar as cápsulas por via oral, sem mastigar e com líquido suficiente para engolir.
O esquema posológico aconselhado varia de acordo com a natureza do quadro clínico do paciente.
Uma cápsula de **PROSTEM PLUS®** 2 vezes ao dia, durante 2 meses, repetindo este esquema a cada 4 ou 6 meses, ou a critério médico.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você pode tomar a dose seguinte como de costume, isto é, na hora regular e sem dobrar a dose.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: intolerância gástrica e reações alérgicas cutâneas, as quais ocorrem raramente e normalmente desaparecem com a ingestão do produto às refeições. **PROSTEM PLUS®** é geralmente bem tolerado.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de superdosagem procure o serviço médico imediatamente, levando a bula e a caixa do medicamento. As manifestações possíveis estão relacionadas a via digestória e incluem náuseas e dor abdominal que tendem a desaparecer com a descontinuação do uso. Em relação ao componente *Urtica dioica* pode reduzir a pressão arterial e a taxa de glicose no sangue, interferir com medicamentos que atuam na coagulação sanguínea e com medicamentos anti-inflamatórios. Desse modo é importante manter uma boa hidratação e ficar atento a sinais que podem indicar a diminuição da glicose. Todavia é importante procurar o auxílio médico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001 (CEATOX), se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S. Nº 1.0146.0035

Farm. Resp.: Dra. Erika Mayumi Matsumoto – CRF-SP 27.346



Fabricado por:

Relthy Laboratórios Ltda. – Indaiatuba – SP

Embalado e Registrado por:

LABORATÓRIOS BALDACCI LTDA

Rua Pedro de Toledo, 520 - Vl. Clementino - São Paulo - SP

CNPJ: 61.150.447/0001-31

Indústria Brasileira

SAC
0800 133 222

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA



6551

"Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 21/10/2014"