

REVIGONAL

Extrato seco de raízes de
Panax ginseng
Araliaceae



MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

INDICADO
PARA ESTADO
DE FADIGA FÍSICA
E MENTAL

APRESENTAÇÃO

Forma farmacêutica: cápsula gelatinosa dura.
Concentração: 100 mg de extrato seco de raízes de *Panax ginseng* por cápsula gelatinosa dura (Corresponde a 10,0–13,0 mg de ginsenosídeos totais).
Apresentação: Cartucho contendo 2 blisters com 15 cápsulas cada.

USO ORAL
USO ADULTO

COMPOSIÇÃO:

Cada cápsula gelatinosa dura contém:

Extrato seco de *Panax ginseng* (raiz) 100 mg*
* equivalente a 10-13% de ginsenosídeos totais, o que corresponde a 10 a 13 mg de ginsenosídeos totais.



INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é indicado para aumentar a capacidade física e intelectual nos estados de esgotamento e fadiga.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

REVIGONAL é um medicamento fitoterápico que contém os princípios ativos do extrato de raízes de *Panax ginseng*, pertencente à família Araliaceae. Este extrato tem como constituintes predominantes os ginsenosídeos totais. *Panax ginseng* é um fitoterápico que possui propriedades tônicas e restaurativas, restaurando a capacidade física e mental, sendo indicado em casos de fraqueza, exaustão, cansaço e perda da concentração, durante a convalescença.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado em casos de asma aguda, hemorragia e durante infecções agudas. Também não deve ser utilizado por pacientes com hipersensibilidade (alergia) à droga, em casos de hiperestrogenia (excesso de hormônios estrogênicos no organismo), hipertensão (aumento da pressão arterial), taquicardia (aumento da frequência cardíaca), insônia e síndromes febris.

Não é recomendada sua utilização durante a gravidez e

amamentação por ser estimulante e conter estrogênios em sua composição.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Pacientes diabéticos devem ter cuidado no uso do medicamento, pois este pode reduzir levemente os níveis de glicose no sangue.

Ginseng pode elevar a pressão arterial, sendo assim, deve ser ingerido com cautela por pacientes hipertensos agudos.

Indivíduos extremamente nervosos, tensos, histéricos, maníacos ou esquizofrênicos devem evitar o uso de Ginseng.

Não existem restrições específicas para o uso do produto por pacientes idosos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

INTERAÇÕES

Ginseng pode interferir com a ação de medicamentos antidiabéticos, devido ao efeito hipoglicêmico do extrato, bem como reduzir a atividade de anticoagulantes, como a varfarina.

Também foram relatadas interações com inibidores da monoaminoxidase (iMAO), como a fenelzina.

Não usar *Panax ginseng* com *Rauwolfia serpentina*, bloqueadores de canais de cálcio, digitálicos, etionamida, griseofulvina, metildopa, fenotiazinas e espironolactona. O uso concomitante com outras drogas estimulantes, como cafeína e anfetamina, deve ser evitado, pois pode ocorrer estimulação excessiva.

Também não utilizar junto com drogas antidepressivas, antipsicóticas ou tratamentos hormonais.

O uso simultâneo com diuréticos de alça pode resultar em aumento do risco de resistência diurética.

O *Panax ginseng* possui efeitos semelhantes aos do estrogênio. Logo, o uso concomitante com estrogênio conjugado pode provocar os sintomas causados pelo excesso deste hormônio (mastalgia e sangramento uterino que pode ocorrer entre as menstruações).

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30 °C). Proteger da luz e umidade. Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para consumo, respeitando o prazo de validade de 24 meses, indicado na embalagem.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

REVIGONAL é apresentado em cápsula na cor bordô/branca, contendo pó fino, de cor bege claro e odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

USO ORAL

Ingerir uma cápsula pela manhã e outra no almoço. Recomenda-se manter o tratamento por 4 a 8 semanas, devendo o medicamento ser utilizado por, no máximo, 3 meses.

Utilizar apenas a via oral. O uso deste medicamento por outra via, que não a recomendada, pode causar a perda do efeito esperado ou mesmo provocar danos à saúde.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma ou mais doses deste medicamento, a posologia indicada deverá ser retomada, não havendo necessidade de repor as doses esquecidas.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Com o uso de Ginseng, podem ocorrer casos de reações gastrointestinais leves e transitórias (como náusea, dor de estômago e diarreia) e insônia.

Há relatos de efeitos estrogênicos em mulheres, como mastalgia (dor nos seios). Como o Ginseng contém pequenas quantidades de estrona, estradiol e estriol, podem ocorrer ainda ginecomastia (crescimento das mamas em homens) e galactorreia (produção de leite fora do período pós-parto ou de lactação).

Foram relatados ainda epistaxe (perda de sangue pelo nariz), cefaleia (dor de cabeça), vômitos e, em raros casos, reações alérgicas.

O uso prolongado de Ginseng pode provocar hipertensão (aumento da pressão arterial), inflamação de nervo, frequentemente o ciático, causando espasmos (contrações involuntárias) na área afetada.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Doses elevadas levam à hipertensão (aumento da pressão arterial), nervosismo, euforia, erupções na pele, midríase (dilatação da pupila dos olhos), insônia, edema (inchaço) e diarreia matinal. Foram relatadas ainda artrite cerebral com dor de cabeça intensa, náusea (enjoo) e vômito.

Em caso de ingestão de altas doses, recomenda-se suspender o uso e procurar orientação médica.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

V. 05

MS: 1.4493.0047

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.



airela

Fabricado por:
AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Rod. SC 440 - km 1, nº 500, Bairro Ilhota
Pedras Grandes/SC, CEP.: 88720-000
CNPJ.: 01.858.973/0001-29
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Farmacêutico Responsável:
Luiz Henrique Pepe Antunes CRF/SC 8481

