



QUE INDICADO PELO MÉDICO. ASSIM COMO OS OUTROS VASOCONSTRITORES, NÃO DEVE SER EMPREGADO APÓS HIPOFISECTOMIA TRANSFENOIDAL OU APÓS CIRURGIAS ORONASAIS EM QUE OCORRA EXPOSIÇÃO DA DURA-MÁTER.

PRECAUÇÕES

Rinidal adulto não é recomendado para uso em crianças menores de 6 anos de idade. A posologia recomendada não deve ser excedida. Como outros descongestionantes nasais o uso prolongado pode conduzir à congestão nasal de rebote.

Rinidal não deve ser utilizado por mais de 3 dias. Se a obstrução nasal persistir após este período de tratamento sem nenhuma melhora, mesmo provisória, o medicamento deve ser suspenso e o médico consultado.

O uso do frasco por mais de uma pessoa pode propagar uma infecção.

Gravidez e Lactação: Rinidal deve ser utilizado durante a gravidez e lactação, somente se os benefícios potenciais para a mãe justificarem o risco potencial para o feto, visto que não há estudos sobre o uso de oximetazolina durante estes períodos.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Rinidal deve ser utilizado com cautela por pacientes que estejam em tratamento com inibidores da monoaminoxidase.

Pode ocorrer potencialização dos efeitos da oximetazolina quando houver absorção sistêmica significativa da oximetazolina, concomitantemente ao uso de maprotilina, antidepressivos tricíclicos ou inibidores da monoaminoxidase.

REAÇÕES ADVERSAS

As reações adversas são usualmente leves e transitórias, incluindo: queimação, ardência, espirros ou aumento da secreção nasal. O uso prolongado e ininterrupto pode conduzir ao hábito, como resultado da congestão de rebote.

POSOLOGIA

Crianças menores de 2 anos de idade: Usar somente quando é indicado pelo médico.

Crianças entre 2 e 5 anos: Instilar 2 a 3 gotas de Rinidal pediátrico, em cada narina, duas vezes ao dia, pela manhã e à noite. Colocar a cabeça da criança voltada para o lado, para instilar as gotas.

Adultos e crianças com idade acima de 6 anos: 2 ou 3 atomizações de Rinidal adulto em cada narina, de 12 em 12 horas. Com a cabeça elevada, coloque a ponta do frasco em cada narina sem fechá-la completamente. Durante cada administração, o paciente deve inclinar a cabeça suavemente para trás e inspirar ativamente enquanto comprime o frasco.

SUPERDOSE

A superdose de Rinidal pediátrico pode causar sedação em crianças, embora tal ocorrência não tenha sido relatada. Pode causar depressão profunda do Sistema Nervoso Central. Em caso de ingestão acidental algum método que evite a absorção deve ser considerado. Não existe antídoto específico.

PACIENTES IDOSOS

O uso em pacientes idosos (acima de 60 anos) requer prescrição e acompanhamento médico.

Reg. nº 1.0465.0423

Farm. Responsável: Dr Marco Aurélio Limirio G. Filho - CRF-GO nº 3524

Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: **VIDE CARTUCHO**

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Prezado Cliente:

Você acaba de receber um produto **Neo Química**.

Em caso de alguma dúvida quanto ao produto, lote, data de fabricação, ligue para nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor.



Laboratório Neo Química Com. e Ind. Ltda.

VPR 1 - Quadra 2-A - Módulo 4 - DAIA - Anápolis - GO - CEP 75132-020

www.neoquimica.com.br

C.N.P.J.: 29.785.870/0001-03 - Indústria Brasileira

Faber
Print
558 - 00102
3004744 - 06/2006

Rinidal

cloridrato de oximetazolina

FORMA FARMACÉUTICA E APRESENTAÇÕES

Solução nasal 0,05% (0,5mg/mL): Embalagens contendo 1 frasco com 10 mL ou 30 mL.

Solução nasal 0,025% (0,25mg/mL): Embalagem contendo 1 frasco com 20 mL.



USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO NASAL

COMPOSIÇÃO

Cada mL da solução nasal adulto contém:

cloridrato de oximetazolina..... 0,5mg
veículo q.s.p.....1mL
(cloreto de benzalcônio, fosfato de sódio monobásico, EDTA dissódico, propilenoglicol e água purificada).

Cada mL da solução nasal pediátrica contém:

cloridrato de oximetazolina..... 0,25 mg
veículo q.s.p.....1mL
(cloreto de benzalcônio, fosfato de sódio monobásico, EDTA dissódico, propilenoglicol e água purificada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- Rinidal é um descongestionante nasal.
- Conservar em temperatura ambiente (15° a 30° C). Proteger da luz.
- Prazo de Validade: **VIDE CARTUCHO**. Não use medicamento com o prazo de validade vencido, poderá ocorrer diminuição significativa do seu efeito terapêutico.
- "Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término". "Informe seu médico se está amamentando".
- "Siga a orientação do seu médico respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento".
- O tratamento pode ser interrompido a qualquer momento sem causar danos ao paciente.
- "Informe seu médico a ocorrência de reações desagradáveis, tais como: queimação, ardência, espirros ou aumento da secreção nasal".
- **"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS"**.
- Deve-se ter cautela quando deseja-se administrar Rinidal concomitantemente a inibidores da monoaminoxidase.
- Rinidal adulto não é recomendado para uso em crianças menores de 6 anos de idade. Rinidal não deve ser utilizado por mais de 3 dias e a posologia recomendada não deve ser excedida.
- Rinidal é contra-indicado para pacientes com hipersensibilidade ao cloridrato de oximetazolina ou a qualquer outro componente da fórmula.
- "Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando antes do início ou durante o tratamento".
- **"NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE"**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O cloridrato de oximetazolina possui atividade simpatomimética, promovendo a constrição da rede arteriolar da mucosa nasal, produzindo efeito descongestionante prolongado. Rinidal reduz a congestão ao redor das trompas de Eustáquio, sendo útil também no tratamento coadjuvante da infecção do ouvido médio. Também se recomenda para uso no consultório, sob a forma de tampão nasal, para facilitar o exame intranasal ou antes de cirurgia nasal.

INDICAÇÕES

Rinidal é indicado para o tratamento sintomático das afecções que necessitam de ação descongestionante eficaz e rápida da mucosa nasofaríngea: rinite aguda e nasovingite, sinusite aguda ou crônica, rinite alérgica e faringites.

CONTRA-INDICAÇÕES

RINIDAL É CONTRA-INDICADO PARA PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE AO CLORIDRATO DE OXIMETAZOLINA OU A QUALQUER OUTRO COMPONENTE DA FÓRMULA. CONTRA-INDICADO PARA PACIENTES COM DOENÇA CARDÍACA, DIABETES, DOENÇAS DA TIREÓIDE, PRESSÃO ALTA, DIFICULDADES EM URINAR DEVIDO AO AUMENTO DO TAMANHO DA GLÂNDULA PRÓSTATA, A MENOS

