

SANASAR®

benzoato de benzila

250mg/mL

HERTZ®

Forma Farmacêutica e Apresentação:
Emulsão tópica: Frasco com 100 mL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO
USO EXTERNO

Composição

Cada mL de SANASAR emulsão contém:
benzoato de benzila 250 mg
Veículo* q.s.p. 1mL
* simeticona, ácido oléico, hidróxido de sódio, metilparabeno, propilparabeno, lauril sulfato de sódio, essência de cravo, goma xantana, propilenoglicol e água deionizada.

Informações ao Paciente

SANASAR, quando aplicado topicamente (uso externo), em concentrações de 10% a 30%, atua, eficazmente e seletivamente, na escabiose (sarna) e pediculose (piolhos e lêndeas), destruindo o ecto-parasita causador da moléstia, sem prejudicar o hospedeiro. Evitar calor excessivo (temperatura superior a 40°C). Manter sempre bem fechado. O produto se conserva estável por um período de 24 meses, a partir da data da sua fabricação.

O prazo de validade está gravado nas embalagens. Não use medicamento com o prazo vencido.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez, na vigência do tratamento ou após o seu término. O uso em gestantes e crianças deve obedecer cuidados e observações rigorosos.

Diluir com água (crianças: 3 partes de água; idosos: igual volume de água) para amenizar a irritação local.

Não amamentar durante o tratamento.

Como normas gerais de higiene, recomenda-se:

- Ferver as roupas de cama e de uso pessoal, mantendo-as limpas;
- Manter as unhas curtas e limpas. No caso de pediculose (piolhos) e ftiíase (chatos), manter os cabelos curtos e limpos;
- Não coçar exageradamente e colocar luvas de proteção nas crianças;
- Evitar o contato com possíveis portadores e seus objetos de uso;
- Alertar os responsáveis pelas instituições coletivas frequentadas pelo portador do parasita.

Manter o produto longe dos olhos.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Se houver interrupção do tratamento, pode ocorrer reinfestação.

Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis tais como: vertigens, náuseas, vômitos, diarreias, cefaléias e reações cutâneas.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

O produto é contraindicado nos casos de hipersensibilidade ao benzoato de benzila, lesões da pele, feridas abertas, queimaduras ou condições que possibilitem maior absorção. Caso ocorra hipersensibilidade ao produto, consultar o médico. Evitar o contato do produto com os olhos e mucosas.

Evitar a contaminação de alimentos pelo produto.

Não reutilizar a embalagem vazia.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

Informações Técnicas

Características: O benzoato de benzila corresponde ao éster fenilmetílico do ácido benzóico. Seu mecanismo de ação provável atua no sistema nervoso do parasita, causando sua morte.

Indicações

No tratamento das ectoparasitoses, pediculoses (piolhos e lêndeas) e escabioses (sarna).

Contraindicações

Hipersensibilidade ao benzoato de benzila. O risco / benefício deve ser avaliado em inflamações epidérmicas agudas, escoriações abertas ou feridas com exsudato.

Precauções e Advertências

HERTZ é indicado somente para uso externo. Não deve ser ingerido ou inalado. Não amamentar durante o tratamento. O uso em gestantes e crianças deve obedecer cuidados e observações rigorosas. Diluir com água (crianças: 3 partes de água; idosos: igual volume de água) para amenizar a irritação local. Evitar o contato com olhos e mucosas.

Interações Medicamentosas: Não há relatos até o momento.

Interferência em exames: Não há relatos até o momento.

Reações Adversas/ Colaterais

Irritação local. Embora raro, é possível ocorrer reações de hipersensibilidade ou absorção maior que o comum, tais como: vertigem, cefaléia, náuseas, vômitos, diarreia, convulsões, dispnéias e reações cutâneas.

Posologia

Tomar banho quente com o sabonete e, antes que o corpo esteja completamente enxuto, aplicar a emulsão no corpo inteiro abaixo do pescoço e deixar secar. Lavar o resíduo e reaplicar o produto em 24 horas. Para o

tratamento do couro cabeludo, proceder à limpeza também com água quente e sabão, retirar o excesso de água e massagear o couro cabeludo com o produto, deixando secar naturalmente. Repetir o mesmo processo após 24 horas. Fazer a aplicação por 3 noites seguidas.

SANASAR Emulsão deve ser reaplicado por mais 8 a 14 dias, após a primeira aplicação, devido a possível reinfestação por permanência de ovos. Caso a pele apresente lesões, estas devem ser tratadas antes de iniciar o tratamento com benzoato de benzila.

Superdosagem

No caso de ingestão acidental, o tratamento é, principalmente, de suporte. Deve-se induzir ao vômito, nos indivíduos conscientes e realizar lavagem gástrica nos inconscientes. No caso de superdosagem, os sintomas mais comuns são: excitação central, dermatite de contato e retenção urinária. Procure orientação médica.

Pacientes Idosos

Para amenizar a irritação local, deve-se diluir SANASAR emulsão em igual volume de água.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto em sua embalagem original e em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

Data de fabricação, data de vencimento e lote: Vide cartucho.



SAC 0800 7049001
www.kleyhertz.com.br

KLEY HERTZ S.A - Indústria e Comércio
Rua Com. Azevedo, 224 - Porto Alegre - RS
Farmacêutica Resp.: Paula Carniel Antonio
CRF-RS 4228 - Reg. no M.S. 1.0689.0013
C. N. P. J. nº 92.695.691/0001-03
INDÚSTRIA BRASILEIRA