



Snif SC

Bula para paciente

Solução nasal

9,0 MG/ML

Snif® SC
cloreto de sódio

Solução nasal

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES:

Solução nasal de cloreto de sódio 0,9% sem conservantes.

Cartucho contendo 1 frasco spray com 50 mL.

Cartucho contendo 1 frasco gotejador com 50 mL.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO NASAL

Composição:

Cada mL de Snif SC (cloreto de sódio) contém:

Cloreto de sódio 9 mg

Água purificada q.s.p.....1 mL

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

SNIF® SC (cloreto de sódio 0,9%) está indicado para fluidificar as secreções nasais e como descongestionante nasal, facilitando a respiração, inclusive durante o sono em lactentes. Pode ser usado como auxiliar no tratamento das rinites associadas a gripes e resfriados.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

SNIF® SC é uma solução isotônica de cloreto de sódio, estéril e livre de conservantes, não agredindo a mucosa nasal. SNIF® SC diminui a viscosidade do muco nasal, facilitando a sua eliminação. Pode ser usado como fluidificante das secreções nasais nos resfriados, rinites e em quaisquer outras condições relacionadas ao ressecamento da mucosa nasal, como baixa umidade do ar, após ficar em ambientes com ar condicionado ou poluídos.

SNIF® SC não contém vasoconstritores nem conservantes.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não são conhecidas contra-indicações específicas.

Não existe restrição de idade para o uso de SNIF® SC (cloreto de sódio 0,9%).

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não são conhecidas precauções específicas.

Não existe restrição de idade para o uso de SNIF SC (cloreto de sódio).

Gravidez e lactação

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

Interações medicamentosas

Não existem registros de interações clinicamente relevantes.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O produto apresenta-se em embalagem à prova de contaminação, que permite sua conservação, sem a utilização de conservantes. SNIF SC (cloreto de sódio) deve ser mantido à temperatura ambiente (entre 15° e 30°), em sua embalagem original.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

Snif SC apresenta-se como líquido límpido, incolor e isento de partículas

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Posologia:

Aplicação nasal, várias vezes ao dia, conforme a necessidade, ou a critério médico.

Instrução de uso:

1. Destampe o frasco;
2. Coloque o frasco sobre o dedo polegar e a válvula entre o dedo indicador e o médio (apoiados nas laterais do atuador);
3. Coloque o frasco na narina e empurre o fundo do frasco, usando o polegar contra os dedos indicador e médio, de forma rápida e firme;
4. Repita a operação, na outra narina;
5. Tampe o frasco e guarde-o na embalagem original;
6. Se necessário, assoe o nariz para retirar as secreções já fluidificadas.

O frasco gotejador dosimetrado de SNIF[®] SC libera a solução nasal, em cada aplicação, na forma de gotas.

O frasco spray dosimetrado de SNIF[®] SC libera a solução nasal, em cada aplicação, na forma de jato (spray).

As apresentações em gotas ou spray dosimetrados facilitam a administração, principalmente nos pequenos pacientes. Isso porque em cada dose é liberada uma pequena quantidade da solução em gotas ou spray, ideal para atingir uma grande área de contato, sem, no entanto, induzir àquele “afogamento” causado pelos conta-gotas usuais, que irritam crianças e adultos, provocam dor e dificultam a aplicação do medicamento.

Veja, a seguir, como é fácil aplicar o descongestionante SNIF[®] SC (cloreto de sódio) nas narinas:

Orientação ao Paciente - SPRAY

1. Remover a tampa protetora da válvula;

2. Segurar o frasco com o dedo médio e o indicador sobre a válvula e o polegar na base do frasco;



3. Antes de usar SNIF SC (cloreto de sódio) pela primeira vez ou após 24 horas, a válvula deve ser carregada. Para isso pressione a válvula com os dedos indicador e médio, algumas vezes;

4. Pressione uma das narinas com o dedo indicador e na outra introduza a ponta do aplicador na posição vertical (com o bico para cima), pressionando o aplicador o número de vezes indicado pelo seu médico, conforme indicado na figura ao lado.

Não inclinar a cabeça para trás no momento da aplicação.



5. Retirar o aplicador da narina e respirar pela boca;

6. Repetir na outra narina o mesmo procedimento;



7. Lavar o aplicador e colocar a tampa protetora.

Orientação ao Paciente - GOTAS

1. Remover a tampa protetora da válvula;

2. Segurar o frasco com o dedo médio e o indicador sobre a válvula e o polegar na base do frasco;



3. Antes de usar SNIF SC (cloreto de sódio) pela primeira vez ou após 24 horas, a válvula deve ser carregada. Para ativar o sistema pump, segure o frasco na posição vertical, invertida para baixo (com o bico do frasco para abaixo) e pressione a válvula quantas vezes forem necessárias até obter a 1ª gota. Deste ponto em diante o produto está pronto para uso.

4. Pressione uma das narinas com o dedo indicador e na outra introduza a ponta do aplicador na posição vertical invertida para baixo (com o bico do frasco para baixo), pressionando o aplicador o número de vezes indicado pelo seu médico, conforme indicado na figura ao lado.



5. Retirar o aplicador da narina.

6. Repetir na outra narina o mesmo procedimento.



7. Lavar o aplicador e colocar a tampa protetora.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Como a posologia de SNIF[®] SC é flexível e não há risco de superdose, use a medicação assim que se lembrar que esqueceu alguma dose.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).



9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não há relatos de superdose com o produto.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

MS - 1.0043.0939

Farm. Resp.: Dra. Sônia Albano Badaró – CRF-SP 19.258

EUROFARMA LABORATÓRIOS SA

Av. Vereador José Diniz, 3.465 - São Paulo - SP

CNPJ: 61.190.096/0001-92

Indústria Brasileira

LOGO CENTRAL DE ATENDIMENTO EUROFARMA COM TEL 0800 704 3876.

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em (dia/mês/ano).

