

TANACETO EC

Tanacetum parthenium

Família: Asteraceae.

Parte da planta utilizada: Folhas.

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

APRESENTAÇÕES

Cartucho com frasco plástico branco opaco contendo 50 cápsulas de 500 mg.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula gelatinosa dura contém:

500 mg de extrato seco de folhas de *Tanacetum parthenium*.

Equivalente a 0,4 mg de partenolídeo.

Excipiente: Amido.

Quantidade: 50 cápsulas.

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é destinado para profilaxia da enxaqueca.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

TANACETO EC é indicado como preventivo das crises de enxaqueca, reduzindo a frequência e intensidade das mesmas, uma vez que melhora os sintomas neurovegetativos associados, tais como náuseas, enjoos, vertigens e vômitos.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula não devem usar este medicamento.

Contraindicado lactantes e gestantes, por induzir contrações uterinas.

Não existem contra indicações ou precauções especiais específicas para pacientes idosos.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos de idade.

Este medicamento é contraindicado para gestantes.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não administrar **TANACETO** juntamente com drogas anticoagulantes, devido à possível potencialização dos efeitos.

Não deve ser administrado com aminoácidos que contenham grupos sulfidríla como a cisteína e a Nglicina.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Assim como todos os medicamentos, informe ao seu profissional de saúde todas as plantas medicinais e fitoterápicos que estiver tomando.

Interações podem ocorrer entre medicamentos e plantas medicinais e mesmo entre duas plantas medicinais quando administradas ao mesmo tempo.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESSE MEDICAMENTO?

Proteger da luz, calor e umidade.

Conservar este medicamento em temperatura ambiente (15 a 30°C).

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de sua fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: VIDE EMBALAGEM.

Não use medicamento com prazo de validade vencido.

Para sua segurança, mantenha o medicamento em sua embalagem original.

As cápsulas de **TANACETO EC** (*Tanacetum parthenium*) são de gelatina dura, transparentes, contendo pó de coloração verde claro em seu interior.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Ingerir 1 cápsula ao dia.

Não deve ser ultrapassado o limite máximo de 1 cápsula ao dia.

Recomenda-se tratamentos descontínuos.

As cápsulas devem ser ingeridas inteiras e sem mastigar com quantidade suficiente de água para que sejam deglutidas.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retome a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

Em casos de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reação incomum (ocorre em 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): irritações na mucosa oral, distúrbios gastrintestinais, azia, dor abdominal e aumento de peso.

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): dermatite de contato, diarreia, flatulência, náuseas e vômitos.

Foi descrita uma “Síndrome pós-tanaceto” , em cerca de 10% dos pacientes que interromperam o tratamento abruptamente, com sintomas como nervosismo, cefaleia de tensão, insônia, rigidez nas articulações e cansaço.

Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de superdosagem, suspender o uso, procurar orientação médica de imediato para que sejam adotadas as medidas habituais de apoio e controle das funções vitais.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

MS: 1.1678.0019

Farmacêutico Responsável: Aldo Cândido Dadalt

CRF-PR: 4787

As Ervas Curam Indústria Farmacêutica Ltda

Rua Eunice Weaver, 231, Campo Comprido

Curitiba – PR – CEP: 81220-080

CNPJ: 79.634.572/0001-82

Indústria Brasileira

SAC 0800 643 3949

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 12/03/2012.