

**Tegsedi<sup>®</sup>**  
**(inotersena)**

PTC FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.

Solução injetável

284mg/1,5mL

Esta bula é continuamente atualizada. Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento, mesmo que você já o tenha usado anteriormente.

**TEGSEDI®**  
(inotersena)

## **APRESENTAÇÕES**

Tegsedi (inotersena) está disponível como solução de 284mg/1,5ml clara, incolor a levemente amarela para injeção de dose única em uma seringa preenchida com Dispositivo de Segurança (SSD).  
O produto está disponível em cartucho contendo 4 seringas preenchidas.

**USO SUBCUTÂNEO. USO ADULTO.**

## **COMPOSIÇÃO**

Cada seringa preenchida contém 284 mg de inotersena em 1,5 ml como dose única.  
Cada ml contém 189 mg de inotersena, equivalente a 200 mg de inotersena nonadecassódica.  
Excipientes: água para injetáveis, ácido clorídrico (para ajuste de pH) e hidróxido de sódio (para ajuste de pH).

## **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Tegsedi (inotersena) é indicado para o tratamento da polineuropatia de estágio 1 ou 2 em pacientes adultos com amiloidose hereditária associada à transtirretina (PAF-TTR), para retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida

### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Tegsedi contém o princípio ativo inotersena. É usado para tratar adultos com amiloidose hereditária associada à transtirretina. Amiloidose hereditária associada à transtirretina é uma doença genética que causa a produção de pequenas fibras de uma proteína chamada transtirretina nos órgãos do seu corpo fazendo com que eles parem de funcionar adequadamente. Tegsedi é usado quando a doença causa sintomas de polineuropatia (dano ao nervo).

A substância ativa do Tegsedi, a inotersena, é um tipo de medicamento denominado inibidor oligonucleotídico anti-sentido. Funciona reduzindo a produção de transtirretina pelo fígado e assim reduz o risco de as fibras de transtirretina serem depositadas nos órgãos do corpo e causarem sintomas

### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Não use Tegsedi se:

- você for alérgico a inotersena a ou qualquer um dos componentes deste medicamento (listados na seção COMPOSIÇÃO).
- testes mostrarem que você apresenta números muito baixos de plaquetas, as células do seu corpo que se juntam formando coágulos.
- testes da função dos rins ou proteína na urina mostrarem sinais de problemas renais graves.
- você apresentar redução grave na função do fígado (comprometimento hepático).

**Categoria de risco de gravidez: C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.**

#### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Antes de você começar o tratamento com Tegsedi, seu médico irá medir suas células sanguíneas, função do fígado, função dos rins e níveis de proteína na sua urina. Você somente irá ser tratado com Tegsedi se esses exames estiverem em níveis aceitáveis e seu médico irá repeti-los regularmente durante o tratamento. É importante que você faça regularmente exames de sangue e urina enquanto estiver utilizando Tegsedi.

##### **Trombocitopenia/baixa contagem de plaquetas**

Tegsedi pode reduzir as células no seu sangue responsáveis por coagularem o sangue (plaquetas), o que pode resultar em uma condição chamada trombocitopenia (consulte a seção 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?). Quando você não apresenta plaquetas suficientes, como na trombocitopenia, seu sangue pode não coagular rapidamente de modo a parar o sangramento. Isso pode levar a um hematoma, bem como a problemas mais sérios como sangramento excessivo ou sangramento interno. Seu médico irá checar os níveis de suas plaquetas antes do tratamento e regularmente durante o tratamento com Tegsedi. Se você parar de utilizar Tegsedi, seus níveis sanguíneos devem ser checados por 8 semanas após a descontinuação.

Se você estiver utilizando qualquer medicamento que possa diminuir a contagem de plaquetas ou impedir o sangue de coagular, por exemplo, ácido acetilsalicílico, clopidogrel, varfarina, heparina, rivaroxabana e dabigatrana, você deve falar para seu médico antes de usar Tegsedi (veja a seção **Outros medicamentos e Tegsedi**).

Você deve consultar seu médico imediatamente se apresentar hematomas inexplicáveis ou erupções de pequenas manchas de aparência avermelhada na pele (chamadas de petéquias), sangramento por cortes na pele que não param ou gotejam, sangramento nas gengivas ou nariz, sangue na urina ou fezes, sangramento na parte branca de seus olhos. Peça ajuda imediatamente se você apresentar rigidez no pescoço ou dor de cabeça incomum ou grave porque esses podem ser sintomas causados por hemorragia cerebral.

##### **Glomerulonefrite/problemas renais**

Glomerulonefrite é uma condição de seus rins, em que eles não trabalham adequadamente devido à inflamação e danos renais. Alguns pacientes tratados com inotersena apresentam essa condição. Sintomas de glomerulonefrite são espuma na urina, urina rosa ou marrom, sangue na urina e menos urina que o usual. Alguns pacientes tratados com inotersena apresentam ainda uma redução na função renal sem apresentar glomerulonefrite.

Seu médico irá testar sua função renal antes do tratamento e regularmente durante o tratamento com Tegsedi. Se você parar de utilizar Tegsedi, sua função renal deve ser checada por 8 semanas após a descontinuação. Se você apresentar glomerulonefrite, seu médico irá tratá-lo para essa condição.

Se você estiver usando qualquer medicamento que possa causar danos aos rins ou afetar sua função renal, por exemplo, sulfonamidas, antagonistas de aldosterona e alguns tipos de analgésicos, você deve falar para seu médico (veja a seção **Outros medicamentos e Tegsedi**).

##### **Deficiência de Vitamina A**

Tegsedi pode reduzir os níveis de vitamina A do seu corpo (também chamado de retinol). Seu médico irá medi-los, e se já estiverem baixos, devem ser corrigidos e quaisquer sintomas resolvidos antes de você iniciar seu tratamento com Tegsedi. Sintomas de vitamina A reduzida incluem:

- olhos secos, visão insatisfatória, visão noturna reduzida, visão turva ou desfocada

Se você apresentar problemas com sua visão ou qualquer outro problema com seus olhos enquanto estiver usando Tegsedi, você deve falar com seu médico. Seu médico pode lhe encaminhar a um oftalmologista para um exame, se for necessário.

Seu médico irá solicitar que você utilize suplementação de vitamina A todos os dias durante o tratamento com Tegsedí.

Tanto níveis excessivos como deficientes de vitamina A podem prejudicar o desenvolvimento do seu bebê. Portanto, as mulheres com potencial para engravidar devem excluir qualquer hipótese de estarem grávidas antes do início do tratamento com Tegsedí e devem utilizar métodos contraceptivos eficazes (ver seção Gravidez e amamentação abaixo).

Se você planeja engravidar, deve parar de tomar inotersena, incluindo a suplementação de vitamina A, e certificar-se de que os seus níveis de vitamina A voltaram ao normal antes das tentativas de concepção.

Se for uma gravidez não planejada, deve parar de tomar inotersena. Contudo, devido à atividade prolongada de Tegsedí, os reduzidos níveis de vitamina A podem persistir. Não se sabe se a continuação da sua suplementação de vitamina A com 3.000 UI por dia será prejudicial para o seu bebê no primeiro trimestre da gravidez, mas esta dose não deve ser ultrapassada. Deve retomar a suplementação de vitamina A durante o segundo e terceiro trimestres da gravidez, se os níveis de vitamina A ainda não tiverem regressado ao normal, devido ao risco maior de deficiência de vitamina A no terceiro trimestre.

### **Lesão hepática e monitoramento**

Tegsedí pode causar problemas hepáticos graves. Você precisa fazer um exame de sangue antes de começar o tratamento com inotersena para verificar se o seu fígado está funcionando corretamente. Você também precisará realizar exames de sangue regularmente enquanto estiver utilizando este medicamento. É importante que você faça esses exames de sangue regularmente enquanto estiver tomando Tegsedí.

### **Rejeição de Transplante de Fígado**

Converse com seu médico antes de usar TEGSEDI se você já recebeu um transplante de fígado. Casos de rejeição de transplante de fígado foram relatados em pacientes em tratamento com Tegsedí. O seu médico irá monitorá-lo quanto a este risco regularmente durante o tratamento com Tegsedí.

### **Populações especiais**

#### *Crianças e Adolescentes*

A segurança e eficácia de inotersena não foi estabelecida em pacientes crianças e adolescentes menores de 18 anos de idade com amiloidose hereditária associada à transtirretina.

#### *Idosos*

Nenhuma diferença geral foi observada durante os estudos clínicos de inotersena entre pacientes idosos com 65 anos ou mais e pacientes mais novos.

#### *Problemas renais*

Nenhum ajuste da dose é necessário em pacientes com comprometimento renal leve a moderado. Nenhum dado está disponível para pacientes com comprometimento renal grave (veja também a seção Glomerulonefrite/ problemas renais).

#### *Problemas no fígado*

Inotersena não foi avaliada em pacientes com comprometimento hepático conhecido. Inotersena não deve ser utilizada em pacientes com comprometimento grave do fígado (ver seção 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?).

#### *Pacientes submetidos a transplante do fígado durante o tratamento com inotersena*

Inotersena não foi avaliada em pacientes submetidos a transplante do fígado. Recomenda-se, portanto, que a administração de inotersena seja descontinuada em indivíduos submetidos a transplante de fígado.

## Outros medicamentos e Tegsedi

Fale para seu médico ou farmacêutico se você estiver tomando, tomou recentemente, ou se pode tomar qualquer outro medicamento. É importante falar ao seu médico se você já estiver sendo tratado com qualquer um dos seguintes:

- Medicamentos que previnem coágulos ou possam reduzir o número de plaquetas no seu sangue, por exemplo, ácido acetilsalicílico e outros Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINEs), heparina, varfarina, clopidogrel, rivaroxabana e dabigatrana.
- Quaisquer medicamentos que possam alterar sua função renal ou que possam lesionar os rins, por exemplo, sulfonamidas (usadas como anti-bactericidas), anilidas (usados para tratar febre, dores e desconfortos), Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINEs), antagonistas de aldosterona (usados como diuréticos) e alcaloides de ópio natural e outros opioides (usados para manejo da dor).

## Gravidez e amamentação

Se você estiver grávida ou amamentando, acha que pode estar grávida, ou está planejando engravidar, pergunte ao seu médico sobre o uso deste medicamento. Se você ficar grávida, informe seu médico imediatamente.

### *Mulheres em idade potencial para engravidar*

Tegsedi irá reduzir o nível de vitamina A no seu corpo, o que é importante para o desenvolvimento normal do feto durante a gravidez. Não se sabe se a suplementação de vitamina A pode compensar o risco pela deficiência de vitamina A que pode afetar seu bebê (consulte a seção 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?). Se você for uma mulher com potencial para engravidar, você deve usar contracepção eficaz e confirmação de gravidez deve ser excluída antes do início do tratamento com Tegsedi.

### *Gravidez*

Você não deve utilizar Tegsedi caso esteja grávida, a menos que explicitamente indicado pelo seu médico. Se você tiver idade potencial para engravidar e pretende usar Tegsedi, você deve utilizar contracepção eficaz.

### *Amamentação*

Tegsedi pode passar para o leite materno. Você deve consultar seu médico sobre parar de amamentar ou parar o tratamento com Tegsedi.

## Dirigir e operar máquinas

O uso de Tegsedi não demonstrou afetar a habilidade de dirigir ou operar máquinas.

## Teor de Sódio

Cada seringa preenchida contém 284 mg de inotersena (na forma de sódio).

Este medicamento contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por 1,5 ml ou seja, é praticamente “isento de sódio”.

**Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

## 5. ONDE COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

### Cuidados especiais para armazenamento

Armazenar refrigerado entre 2° e 8°C na embalagem original. Não congelar. Tegsedi pode ser armazenado em temperatura ambiente (até 30°C) na embalagem original por até 6 semanas; se não utilizado dentro de 6 semanas, descartar o produto.

Proteger Tegsedi da incidência direta da luz e não expor o produto a temperaturas acima de 30°C.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

### **Características do medicamento**

Tegsedi está disponível como solução de 284mg/1,5ml clara, incolor a levemente amarela para injeção de dose única em uma seringa preenchida com Dispositivo de Segurança (SSD).

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Sempre utilize esse medicamento exatamente como seu médico prescrever. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico se você não tiver certeza.

Tegsedi é indicado para uso adulto.

A dose recomendada de Tegsedi é uma dose de 284 mg de inotersena.

O tratamento deve continuar enquanto um benefício clínico for observado ou até que o tratamento não seja mais tolerado pelo paciente.

As doses devem ser administradas uma vez por semana, no mesmo dia toda semana.

### **Via e Modo de Administração**


Tegsedi é para injeção sob a pele somente (uso subcutâneo).

### **Instruções de uso**

Antes de usar sua seringa preenchida, seu médico deve lhe mostrar ou mostrar a seu cuidador como usá-la da maneira correta. Se você ou seu cuidador tiverem quaisquer dúvidas, perguntem ao seu médico.

Leia as instruções de uso antes de usar sua seringa preenchida e toda vez que você receber uma nova prescrição. Pode haver novas informações.


*Guia sobre os componentes*



Cada seringa preenchida contém uma dose para uso único somente.

<b>ADVERTÊNCIAS</b>
<p><b>Não</b> remova a tampa da agulha até que você tenha chegado na <b>Etapa 6</b> dessas instruções e esteja pronto para injetar Tegsedí.</p> <p><b>Não</b> divida sua seringa com outra pessoa ou use novamente;</p> <p><b>Não</b> use sua seringa se ela tiver caído em uma superfície rígida ou estiver danificada;</p> <p><b>Não</b> congele sua seringa preenchida;</p> <p>Se acontecer qualquer um dos fatos acima citados, jogue fora sua seringa preenchida em um container resistente a perfurações (objetos afiados) e use uma nova seringa preenchida.</p>
<b>PREPARAÇÃO</b>
<b>1. Prepare os suprimentos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 seringa preenchida do refrigerador</li> <li>- 1 lenço embebido em álcool (não fornecido)</li> <li>- 1 gaze ou algodão (não fornecido)</li> <li>- 1 container (não fornecido) resistente a perfurações (objetos afiados)</li> </ul> <p><b>Não</b> injete o medicamento até que você tenha todos os suprimentos listados reunidos.</p>
<b>2. Se prepare para usar a sua seringa preenchida</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remova a bandeja de plástico da embalagem e confira a data de validade. Não use se a data estiver vencida.</li> <li>• Deixe que a seringa preenchida atinja a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C) por 30 minutos antes de injetar. <b>Não</b> aqueça a seringa preenchida de nenhum outro modo. Por exemplo, <b>não</b> aqueça no micro-ondas ou em água quente ou perto de fontes de calor.</li> <li>• Remova a seringa preenchida da bandeja segurando seu corpo.</li> </ul> <p><b>Não</b> mova o êmbolo.</p>

### 3. Confira o medicamento dentro da seringa preenchida



Observe a zona de inspeção e confira se a solução está clara, sem cor a amarelo claro. É normal ver bolhas na solução. Não é necessário fazer nada a respeito disso.

**Não** use se a solução estiver turva, de cor diferente da especificada ou apresentar partículas

Se a solução estiver turva, de cor diferente da especificada ou apresentar partículas, jogue a seringa preenchida fora em um container resistente a perfurações (objetos afiados), e use uma nova seringa preenchida.

#### 4. Escolha o local da injeção



Escolha um local para a injeção no abdômen (barriga) ou na parte da frente da coxa.

O local da injeção pode ser na parte externa do antebraço se Tegsedi for administrado por um cuidador.

**Não** aplique em um diâmetro de 3cm em torno do umbigo.

**Não** aplique no mesmo lugar toda vez.

**Não** aplique onde houver hematoma, rigidez, estiver avermelhada ou sensível.

**Não** aplicar em tatuagens, cicatrizes ou lesões cutâneas.

**Não** aplique por cima de roupas.

#### 5. Higienize o local da injeção



Lave suas mãos com sabão e água.

Higienize o local da injeção com lenço embebido em álcool em movimentos circulares. Deixe secar.

**Não** toque na área novamente antes de aplicar a injeção.

## INJEÇÃO

### 6. Remova a tampa da agulha



Segure a seringa preenchida pelo seu corpo, com a agulha distante de você.

Remova a tampa da agulha puxando-a para cima. Não gire.

Você pode ver uma gota de líquido ao final da agulha. Isso é normal.

Mantenha suas mãos distantes do êmbolo para evitar que ele seja pressionado antes que você esteja pronto para aplicar.

**Não** remova a tampa da agulha até que você esteja pronto para aplicar.

**Não** puxe a tampa se estiver segurando a seringa pelo êmbolo. Sempre segure pelo corpo.

**Não** deixe a agulha tocar qualquer superfície.

**Não** remova quaisquer bolhas de ar da seringa preenchida.

**Não** coloque a tampa da agulha de volta à seringa preenchida.

### 7. Insira a agulha



Segure a seringa preenchida com 1 mão.

Segure a pele em torno do local da injeção conforme o profissional da área da saúde lhe explicou. Você deve gentilmente aplicar a injeção através de uma “beliscada” na pele ou injetar sem “beliscar” a pele.

Vagarosamente insira a agulha no local escolhido para a injeção em um ângulo de 90° até que ela esteja totalmente inserida.

**Não** segure a seringa preenchida pelo êmbolo ou pressione o êmbolo para inserir a agulha.

## 8. Comece a aplicação



Devagar e de maneira firme, pressione o êmbolo todo para baixo até que o medicamento seja injetado. Garanta que a agulha seja totalmente inserida no local da injeção enquanto você estiver inserindo o medicamento.


É importante pressionar o êmbolo para baixo por completo.

Sua seringa preenchida pode fazer um barulho de “clique” assim que você estiver empurrando o êmbolo para baixo. Isso é normal. Isso **não** significa que a aplicação está concluída.

O êmbolo pode enrijecer ao final da injeção. Você talvez tenha que pressionar um pouco mais forte para garantir que ele tenha ido até o final.

**Não** solte o êmbolo.

## 9. Pressione o êmbolo para baixo



Pressione firmemente o êmbolo até o final da injeção. Segure o êmbolo totalmente pressionado para baixo e espere **5 segundos**. Se você soltar o êmbolo muito rápido, você perder parte do medicamento.

O êmbolo irá subir automaticamente e isso significa que ele foi pressionado até o final. Pressione novamente se o êmbolo não começar a subir automaticamente.

## 10. Conclua a aplicação



Erga vagarosamente o pistão e deixe a mola de segurança subir o pistão automaticamente.

A agulha deve estar agora retraída de maneira segura dentro da seringa preenchida, e a mola do mecanismo de segurança visível na parte de fora do pistão.

Quando o pistão parar, sua injeção está concluída.

Se o pistão não retornar automaticamente quando você liberar a pressão, significa que a mola de segurança não foi ativada e, portanto, você deve empurrar o pistão novamente e mais forte.

**Não** puxe o pistão pela mão. Retire toda a seringa preenchida para cima.

**Não** tente substituir a tampa na agulha retraída.

**Não** esfregue o local da injeção.

## DESCARTE E CUIDADO

### Descarte da seringa preenchida utilizada



Coloque a seringa preenchida utilizada em um container para descarte de objetos afiados logo após o uso. Não jogue fora sua seringa preenchida em lixo doméstico.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.**

## 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você se esquecer da sua dose de Tegsedi, então você deve tomar a próxima dose assim que possível, a menos que a próxima dose esteja programada para daqui dois dias, nesse caso a dose perdida deve ser pulada e a próxima dose administrada no tempo programado.

Não tome uma dose duplicada para compensar a dose esquecida.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Como todos os medicamentos, esse medicamento pode causar efeitos colaterais, apesar de nem todas as pessoas os apresentarem. Estes não são todos os possíveis efeitos colaterais que você pode sentir ao tomar Tegsedi. Se sentir quaisquer efeitos colaterais não listados aqui, contate o seu profissional de saúde. Os estudos clínicos avaliaram a segurança de inotersena durante 6,2 anos, assim, existe evidência limitada quanto ao uso de inotersena por tempo indeterminado.

### **Efeitos Colaterais Sérios**

Se você apresentar qualquer um dos efeitos colaterais abaixo, pare de usar Tegsedi e entre em contato com seu médico imediatamente:

- Sintomas que podem indicar glomerulonefrite, (quando seus rins não funcionam adequadamente), tais como urina espumosa, urina de cor rosa ou marrom, sangue na urina ou menos urina que o usual. A glomerulonefrite é um efeito colateral comum da inotersena (pode afetar até 1 em 10 pessoas).
- Sintomas que podem indicar trombocitopenia (quando o sangue não coagula, devido aos baixos níveis de plaquetas no sangue), tais como hematomas inexplicáveis ou aparecimento de pequenas manchas avermelhadas na pele (chamadas de petéquias), sangramento por cortes na pele que não param ou gotejam, sangramento nas gengivas ou nariz, sangramento na urina ou fezes, ou sangramento na parte branca dos olhos. Um baixo nível de plaquetas no sangue é um efeito colateral muito comum da inotersena (pode afetar mais de 1 em 10 pessoas).
- Sintomas que podem indicar lesão no fígado, como olhos ou pele amarelados, urina escura, potencialmente acompanhada de coceira na pele, dor na parte superior direita da área do estômago (abdômen), perda de apetite, sangramento ou hematomas com mais facilidade do que o normal, ou sensação de cansaço.

Peça ajuda imediatamente se seu pescoço apresentar rigidez ou você sentir uma dor de cabeça grave e incomum pois esses podem ser sintomas de hemorragia (sangramento) no cérebro.

### **Outros efeitos colaterais**

**Muito comuns** (podem afetar mais de 1 em 10 pessoas)

- Redução na contagem de glóbulos vermelhos o que pode tornar a pele pálida e causar fraqueza ou falta de ar (anemia)
- Dor de cabeça
- Vômito ou náusea (se sentir com enjoos)
- Aumento na temperatura corporal
- Sentir frio (calafrios) ou tremores
- Hematoma, coceira, vermelhidão ou dor no local da injeção
- Inchaço dos tornozelos, pés ou dedos (edema periférico)

**Comuns** (pode afetar até 1 em 10 pessoas)

- Um aumento no seu sangue do número de glóbulos brancos chamados de eosinófilos (eosinofilia)
- Apetite reduzido
- Sentir tontura ou desmaiar, principalmente em posição em pé (baixa pressão arterial, hipotensão)
- Hematoma
- Acúmulo de sangue dentro de tecidos, que podem parecer hematomas graves
- Coceira
- Erupção Cutânea
- Dano aos rins levando a função renal insatisfatória ou perda da função renal
- Alterações nos resultados do seu sangue ou urina (isso pode indicar infecção ou lesão no fígado ou rins)

- Sintomas de gripe como alta temperatura, dores e calafrios (doença tipo gripe)
- Inchaço ou descoloração da pele no local da injeção

#### **Experiência pós-comercialização**

Os seguintes efeitos colaterais foram identificados durante a experiência pós-comercialização de Tegsedi:

- Reações alérgicas
- Rejeição de transplante de fígado
- Lesão no fígado induzida por medicamento

**Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico.**

#### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?**

Entre em contato com seu médico ou farmacêutico, ou compareça a um pronto-socorro imediatamente, mesmo que você não apresente sintomas.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### **DIZERES LEGAIS**

MS 1.5770.0002

Responsável Técnico:  
Ana Beatriz Maciel da Fonseca  
CRF/SP: 27.304

Fabricado por:  
Catalent Indiana, LLC  
Bloomington, Estados Unidos da América

Embalado por:  
Catalent Indiana, LLC  
Bloomington, Estados Unidos da América  
Ou  
AndersonBrecon Inc.  
Rockford, Estados Unidos da América

Registrado e importado por:  
PTC Farmacêutica do Brasil Ltda.  
Rua Conceição de Monte Alegre, nº 198, Andar 17  
São Paulo – SP – Brasil  
CNPJ: 25.210.463/0001-09

**SAC 0800 7621074**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**



CCDS v.3.0\_VP\_v.0823

### Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
30/10/2019	2642882/19-2	10458-MEDICAMENTO NOVO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	27/12/2018	1214603/18-0	11306 - MEDICAMENTO NOVO - Registro de Medicamento Novo	29/10/2019	TODOS	VP/VPS	TODAS
04/01/2021	0034726/21-4	10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	05/06/2020	1777300/20-8	11107 – RDC 73/2016 – NOVO – Ampliação do prazo de validade do medicamento	21/12/2020	<p>APRESENTAÇÕES</p> <p>ONDE COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?</p> <p>COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?</p> <p>CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS</p> <p>CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO</p> <p>POSOLOGIA E MODO DE USAR</p> <p>REAÇÕES ADVERSAS</p>	VP/VPS	TODAS
22/07/2021	2857168/21-7	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula –	N/A	N/A	N/A	N/A	<p>COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?</p> <p>REAÇÕES</p>	VP/VPS	TODAS

		publicação no Bulário RDC 60/12					ADVERSAS		
05/10/2021	3927861/21-9	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	25/06/2021	2465134/21-6	11107 – RDC 73/2016 – NOVO – Ampliação do prazo de validade do medicamento	06/09/2021	O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?  ONDE COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?  <u>DIZERES LEGAIS</u> ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES  CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO  <u>DIZERES LEGAIS</u>	VP/VPS	TODAS
11/05/2022	2705004/22-0	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	<u>ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES</u>  <u>DIZERES LEGAIS</u>	VP/VPS	TODAS
15/09/2022	4697598/22-9	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	<u>DIZERES LEGAIS</u>	VP/VPS	TODAS
24/01/2023	0073358/23-1	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de	09/11/2022	4923259/22-1	1444 - MEDICAMENTO NOVO - Cancelamento de Registro da	26/12/2022	<u>APRESENTAÇÕES</u>	VP/VPS	TODAS

		Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12			Apresentação do Medicamento				
13/07/2023	0720614/23-6	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? <hr/> 2. RESULTADOS DE EFICÁCIA 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 9. REAÇÕES ADVERSAS	VP/VPS	TODAS
18/08/2023	0872829/23-5	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	5. ONDE COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? <hr/>	VP	TODAS

07/11/2023	N/D	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	27/03/2023	0301658/23-7	11107 - RDC 73/2016 - NOVO - Ampliação do prazo de validade do medicamento	09/10/2023	<u>7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO</u>	VPS	TODAS
------------	-----	--	------------	--------------	---	------------	--	-----	-------

N/D: Não disponível no momento