



**FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO**  
**Pomada:** Cartucho contendo bisnaga de 20g.

#### USO TÓPICO

#### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

#### COMPOSIÇÃO

Cada g contém:

Salicilato de metila .....	0,0444 ml
Cânfora .....	0,0444 g
Mentol .....	0,0200 g
Excipiente q.s.p. ....	1,0000 g

(Excipiente: petrolato branco, propilenoglicol, ter-  
rebintina, metilparabeno, propilparabeno)

#### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

##### COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O salicilato de metila provoca analgesia e hiperemia na região onde é aplicado. A cânfora produz leve anestesia local e o mentol causa sensação de frio seguida de anestesia discreta.

##### POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

O produto é indicado para uso exclusivamente tópico, nos casos de reumatismos, nevralgias, torcicolos, contusões e dores musculares. Os sinais de melhora nos sintomas podem ocorrer em um prazo variável de dias, após o início do tratamento.

##### QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Contra-Indicações:** O uso do produto está contra-indicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Como com qualquer medicamento, o médico deve fornecer orientação adequada em caso de gravidez ou lactação antes de o paciente usar este produto.

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

**O produto é contra indicado para crianças menores de 2 anos de idade.**

**Advertência:** Suspender o uso, em caso de hipersensibilidade na pele. Não deverá ser aplicado sobre feridas abertas.

**Interações medicamentosas, alimentares e em exames laboratoriais:** Não ingerir bebidas alcoólicas durante o tratamento.

#### COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

##### Características do produto:

Trialgex é uma pomada homogênea de cor branca, e odor de mentol e cânfora.

##### Posologia e Modo de Usar:

###### USO TÓPICO

Friccione a parte dolorida durante alguns minutos, com pequena quantidade do produto, envolvendo-a depois com um pano de flanela ou lã, 2 a 3 vezes ao dia.

A interrupção repentina deste medicamento não causa efeitos desagradáveis, nem risco, apenas cessará o efeito terapêutico.

#### TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

#### SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

#### QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas.

#### O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTES MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Na eventual superdosagem acidental, imediatamente suspender a medicação e procurar assistência médica. Recomenda-se tratamento de suporte sintomático.

#### ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar o produto em temperatura ambiente (15 a 30°) e proteger da luz e umidade.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido, pois pode ser prejudicial à sua saúde.

290506

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

**Características farmacológicas:** O salicilato de metila é um revulsivo orgânico volátil, age produzindo ação local irritante, com efeitos indiretos de atividade à distância sobre estruturas somáticas (músculos), serosas, articulações, vísceras e de estimulação reflexa dos centros bulbares. Provoca analgesia e hiperemia nas regiões cutâneas em que é aplicado, invadidas pelo mesmo segmento do sistema nervoso central. A cânfora possui ação irritante cutânea, revulsiva, útil nos processos dolorosos de estruturas profundas, tipo fibrosite, mialgia, lumbago. Produz ainda leve anestesia local. O mentol, aplicado localmente, causa sensação de frio por estímulo específico dos receptores e, em seguida, anestesia discreta.

O Trialgex possui a essência de terebintina que age como rubefaciente, produzindo dilatação local e aliviando a dor das estruturas profundas.

#### Indicações:

Indicado para reumatismo, nevralgias, torcicolos, contusões e dores musculares.

#### Contra-Indicações:

Antecedentes de sensibilização aos componentes do produto.

#### Posologia e modo de usar:

##### USO TÓPICO

Friccione a parte dolorida durante alguns minutos, com pequena quantidade do produto, envolvendo-a depois com um pano de flanela ou lã, 2 a 3 vezes ao dia.

**O produto é contra indicado para crianças menores de 2 anos de idade.**

#### Precauções e Advertências:

Não deverá ser aplicado sobre feridas abertas. Em caso de irritação, suspender o uso.

#### Uso em idosos:

Não foram relatadas restrições quanto ao uso do produto em pacientes maiores de 65 anos de idade.

#### Interações Medicamentosas:

Durante o tratamento, recomenda-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas.

#### Reações adversas e alteração de exames laboratoriais:

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

#### Superdosagem:

Na eventual superdosagem acidental, imediatamente suspender a medicação e procurar assistência médica. Recomenda-se tratamento de suporte sintomático.

#### Armazenagem:

Conservar o produto em temperatura ambiente (15 a 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Data de fabricação, data de vencimento e lote:**  
Vide cartucho.



**SAC 0800 7049001**  
[www.kleyhertz.com.br](http://www.kleyhertz.com.br)

**KLEY HERTZ S.A. Indústria e Comércio**  
Rua Com. Azevedo, 224 - Porto Alegre - RS  
Farmacêutica Resp.: Paula Carniel Antonio  
CRF-RS 4228 - Reg. M.S. nº 1.0689.0152.001-7  
C. N. P. J. nº 92.695.691/0001-03  
Indústria Brasileira

071005