

Xalkori®

Pfizer Brasil Ltda.

Cápsulas Duras

200 mg , 250 mg



**Xalkori®
crizotinibe**

I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: Xalkori®

Nome genérico: crizotinibe

APRESENTAÇÕES

Xalkori® 200 mg ou 250 mg em embalagens contendo 60 cápsulas.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula de Xalkori® 200 mg ou 250 mg contém o equivalente a 200 mg ou 250 mg de crizotinibe, respectivamente.

Excipientes: dióxido de silício coloidal, celulose microcristalina, fosfato de cálcio dibásico anidro, amidoglicolato de sódio, esteárate de magnésio, cápsula de gelatina dura (geltaína, dióxido de titânio e óxido férreo vermelho) e tinta de impressão preta (goma la ca, propilenoglicol, solução concentrada de amônia, hidróxido de potássio e óxido férreo preto).



II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Xalkori® (crizotinibe) é indicado para o tratamento de câncer de pulmão não pequenas células (CPCNP) avançado positivo para quinase de linfoma a naplásico (ALK).

Xalkori® é indicado para o tratamento de câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) avançado que seja positivo para ROS1.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Xalkori® inibe o crescimento do tumor que apresenta alterações moleculares no receptor de tirosina quinase ALK e ROS1.

Depois que você ingere a cápsula de Xalkori®, a medicação é absorvida e atinge a quantidade máxima no sangue entre 4 e 6 horas. Após 15 dias de uso é atingido um estado de equilíbrio da quantidade de medicação no seu sangue.

Estudos clínicos demonstraram que o tempo mediano para ocorrer resposta tumoral variou de 6,1 a 7,7 semanas nos pacientes que receberam Xalkori® para tratamento de câncer de pulmão não pequenas células avançado ALK positivo e de 8 semanas nos pacientes que receberam Xalkori® para tratamento de câncer de pulmão não pequenas células avançado ROS1 positivo.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Xalkori® é contraindicado a pacientes com hipersensibilidade ao crizotinibe ou a qualquer outro componente da fórmula.

O uso de Xalkori® é contraindicado em pacientes com insuficiência hepática grave.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Xalkori® pode ser tóxico para o fígado. Seu médico deve solicitar exames para verificar a função do fígado pelo menos uma vez por mês.

Xalkori® pode causar inflamação nos pulmões. Seu médico deve ficar atento para sintomas pulmonares que você possa apresentar. O tratamento deve ser interrompido permanentemente se ocorrer essa inflamação (pneumonite). Xalkori® pode causar arritmia cardíaca. Deve-se ter cuidado a administrar Xalkori® a pacientes com histórico de arritmias ou que estejam tomando medicamentos que são conhecidos por prolongar o intervalo QT (característica do exame de eletrocardiograma). Ao usar Xalkori® nestes pacientes, deve ser considerado o monitoramento periódico com eletrocardiograma e exames de sangue. Se ocorrerem alterações nos exames, pode ser necessário alterar a dosagem.

Bradicardia

Bradicardia (diminuição do ritmo cardíaco) foi relatada em estudos clínicos e foi geralmente assintomática. O efeito total de Xalkori® na frequência de pulso pode não se desenvolver até várias semanas após o início do tratamento. Evite o uso de Xalkori® em combinação com outros agentes bradicárdicos (como por exemplo, betabloqueadores, não di-hidropiridinas bloqueadoras do canal de cálcio como verapamil, diltiazem, clonidina e digoxina) na medida do possível, devido ao risco aumentado de bradicardia sintomática (síncope, tonturas, hipotensão). É recomendada a monitorização mensal da frequência de pulso e da pressão arterial. A modificação da dose não é necessária nos casos de bradicardia assintomática. Em casos de bradicardia sintomática, Xalkori® deve ser mantido e o uso de medicações concomitantes deve ser reavaliado.

Insuficiência Cardíaca

Em estudos clínicos com Xalkori® e durante o período pós-comercialização foram relatados eventos adversos graves, com risco de vida ou fatais de insuficiência cardíaca.

Pacientes com ou sem distúrbios cardíacos preexistentes recebendo Xalkori® devem ser monitorados para os sinais e sintomas de insuficiência cardíaca [falta de ar, edema (inchaço), ganho rápido de peso decorrente de retenção de líquidos]. Interrupção da dose, redução da dose ou descontinuação devem ser consideradas quando as seguintes sintomas forem observados.



Fertilidade

Pode haver comprometimento da fertilidade masculina e feminina pelo tratamento com Xalkori®.

Gravidez

Xalkori® pode causar dano fetal quando administrado a uma mulher grávida, embora isso não tenha acontecido em estudos realizados em animais e nem tenham sido realizados estudos em mulheres grávidas usando Xalkori®. Desta forma, homens e mulheres em idade fértil que estejam em tratamento com Xalkori® devem utilizar métodos contraceptivos eficazes durante todo o tratamento e por pelo menos 90 dias após a conclusão do tratamento com Xalkori®. Se a paciente ou a parceira do paciente ficar grávida durante este período, consulte o médico.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.

Lactação

Não se sabe se o Xalkori® e os seus metabólitos são excretados no leite humano.

Efeitos na Habilidade de Dirigir e Operar Máquinas

Não foi realizado nenhum estudo sobre o efeito de Xalkori® na habilidade para dirigir e operar máquinas. Contudo, deve-se ter precaução ao dirigir ou operar maquinários por pacientes que sentirem alteração visual, tontura ou fadiga enquanto estiverem tomando Xalkori®.

Atenção: Este medicamento contém Açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes.

Interações medicamentosas

Agentes que podem aumentar a quantidade de Xalkori® no sangue: a coadministração de Xalkori® com inibidores fortes de CYP3A pode aumentar as concentrações sanguíneas de Xalkori®. O uso concomitante de inibidores fortes de CYP3A, incluindo, mas não limitado a atazanavir, claritromicina, indinavir, itraconazol, cetoconazol, nefazodona, neflavir, ritonavir, saquinavir, telitromicina, troleandomicina e voriconazol deve ser evitado. Toranja (grapefruit) ou suco de toranja pode também aumentar as concentrações sanguíneas de Xalkori® e deve ser evitado.

Agentes que podem diminuir a quantidade de Xalkori® no sangue: a coadministração de Xalkori® com induidores fortes de CYP3A pode diminuir as concentrações sanguíneas de Xalkori®. O uso concomitante de induidores fortes de CYP3A, incluindo, mas não limitado a carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, rifabutina, rifaampina e erva de São João, deve ser evitado.

Os substratos de CYP3A astemizol, cisaprida e terfenadina devem ser evitados, por terem índices terapêuticos estreitos e terem sido associados com arritmias com risco de morte.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Xalkori® deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 °C e 30 °C).

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.



Características do produto:

Xalkori® 200 mg: cápsula de gelatina dura tamanho 1, branco opaco/rosa opaco, contendo um pó branco a amarelo pálido. Impressão (logotipo): Corpo: CRZ 200, Tampa: Pfizer; Cor da tinta: preta

Xalkori® 250 mg: cápsula de gelatina dura tamanho 0, rosa opaco/rosa opaco, contendo um pó branco a amarelo pálido. Impressão (logotipo): Corpo: CRZ 250, Tampa: Pfizer; Cor da tinta: preta.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Para que o Xalkori® seja indicado para você é necessário que seja realizado um exame no seu tumor para detectar se ele é do tipo “não-pequenas células” (CPNPC) e é positivo para ALK e ROS1. Xalkori® só mostra benefícios nestes pacientes.

Este exame deve ser realizado por laboratórios com proficiência comprovada na tecnologia específica utilizada. Execução inadequada do ensaio, falhas técnicas ou erros do operador durante a execução do teste podem levar a resultados inválidos.

Dosagem recomendada

A dose recomendada de Xalkori® é de 250 mg tomada pela boca duas vezes ao dia. Continuar o tratamento com Xalkori® até a progressão da doença ou até que ocorra a toxicidade inaceitável. Xalkori® pode ser tomado com ou sem alimento. As cápsulas devem ser engolidas inteiras.

Modificação da dose

A interrupção e/ou redução da dose pode ser requerida com base na segurança e tolerabilidade individuais. Seu médico deve orientá-lo quanto à dose adequada, caso ele decida modificá-la.

Insuficiência hepática: o tratamento com Xalkori® deve ser usado com cuidado em pacientes com insuficiência hepática leve e moderada. Xalkori® não deve ser utilizado em pacientes com insuficiência hepática grave.

Insuficiência renal: não é necessário ajuste na dose inicial para pacientes com insuficiência renal leve e moderada.

Pacientes pediátricos: a segurança e a eficácia do Xalkori® em crianças não foram estabelecidas.

Pacientes idosos: não é necessário ajuste na dose inicial.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se uma dose de Xalkori® for esquecida, ela deve ser tomada tão logo você se lembre, a não ser que tenha menos de 6 horas até a próxima dose. Nesse caso, você não deve tomar a dose esquecida. Você não deve tomar 2 doses ao mesmo tempo para compensar a dose esquecida.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Em estudos clínicos, as reações adversas mais graves em pacientes com CPNPC avançado positivo para ALK e positivo para ROS1 foram hepatotoxicidade (toxicidade no fígado), doença pulmonar intersticial/pneumonite (inflamação nos pulmões) e prolongamento de intervalo QT (vide item 4. O que eu devo saber antes de usar este medicamento?). As reações adversas mais comuns ($\geq 25\%$) em pacientes com CPNPC positivo para ALK e positivo para ROS1 foram distúrbio visual, náuseas, diarreia, vômito, edema (inchaço), constipação, transaminases (enzimas do fígado) elevadas, fadiga, diminuição do apetite, tontura e neuropatia.

As reações adversas ao Xalkori® estão listadas a seguir:

Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): neutropenia (diminuição de um tipo de células de defesa no sangue: neutrófilos), anemia, leucopenia (redução de células de



defesa no sangue), diminuição do apetite, neuropatia (doença que afeta um ou vários nervos), tontura, disgeusia (alteração do paladar), distúrbio visual, bradicardia (diminuição do número de batimentos cardíacos), vômitos, diarreia, náusea, constipação, dor abdominal, transaminases (enzimas do fígado) elevadas, *rash* (erupção cutânea), edema (inchado) e fadiga (cansaço).

Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): hipofosfatemia (diminuição da concentração de fosfato no sangue), prolongamento no intervalo QT do eletrocardiograma (anormalidades no teste de eletrocardiograma, que avalia a função cardíaca), síncope (desmaio), insuficiência cardíaca (função cardíaca comprometida), doença pulmonar intersticial (inflamação dos pulmões), esofagite (inflamação do estômago), dispesia (má digestão), fosfatase alcalina no sangue aumentada (enzima encontrada em vários órgãos e tecidos), cisto renal, creatinina sanguínea aumentada (exame laboratorial que testa a função dos rins) e testosterona sanguínea reduzida.

Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): perfuração gastrointestinal (perfuração em região gástrica ou intestinal), insuficiência hepática (prejuízo da função do fígado), insuficiência renal (perda da função dos rins) e insuficiência renal aguda (prejuízo da função dos rins devido a uma causa aguda).

Frequência não conhecida (não pode ser estimado a partir dos dados disponíveis): creatina fosfoquinase sanguínea aumentada.

Atenção: Este produto é um medicamento que possui nova indicação terapêutica no país e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico ou cirurgião-dentista.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

O tratamento de superdose com Xalkori® deve consistir em medidas de suporte em geral. Não há antídoto para Xalkori®.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001 se você precisar de mais orientações.



III - DIZERES LEGAIS

MS - 1.2110.0454

Farmacêutica Responsável: Andrea T. Nichele – CRF-SP nº 44063

Registrado por:

Pfizer Brasil Ltda.

Rua Alexandre Dumas, 1860

CEP 04717-904 – São Paulo – SP

CNPJ nº 61.072.393/0001-33

Fabricado e Embalado por:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH – Betriebsstätte Freiburg
Freiburg - Alemanha

Importado por:

Pfizer Brasil Ltda.

Rodovia Presidente Castelo Branco, nº 32501, km 32,5

CEP 06696-000 – Itapevi – SP

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

XALCAP_29

Fale | **0800-7701575**
Pfizer | www.pfizer.com.br





HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DE BULA

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº. do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº. do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
19/01/2023	-	10451-MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	19/01/2023	-	10451-MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	19/01/2023	<ul style="list-style-type: none">• Dizeres legais• Quais os males que este medicamento pode me causar?• Reações adversas	VP / VPS	200 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60 250 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60
28/06/2022	4353159224	10451-MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	28/06/2022	4353159224	10451-MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	28/06/2022	<ul style="list-style-type: none">• Quais os males que este medicamento pode me causar?• Reações adversas	VP/VPS	200 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60 250 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60
02/05/2022	2660135223	10451-MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	10/12/2019	341273819- 1	11315 - Alteração de texto de bula por avaliação de dados clínicos - GESEF	05/04/2022	<ul style="list-style-type: none">• RESULTADOS DE EFICÁCIA	VPS	200 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60 250 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60
22/01/2021	0288713214	10451-MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto	04/05/2020	1379272205	11107 - RDC 73/2016 - NOVO - Ampliação do prazo de	28/12/2020	<ul style="list-style-type: none">• CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO	VPS	200 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60 250 MG CAP DUR



		de bula - RDC 60/12			validade do medicamento				CT FR PLAS OPC X 60
09/12/2020	4353236205	10451- MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	09/12/2020	4353236205	10451- MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	09/12/2020	• REAÇÕES ADVERSAS	VPS	200 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60 250 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60
09/09/2020	3058314204	10451- MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	09/09/2020	3058314204	10451- MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	09/09/2020	• RESULTADOS DE EFICÁCIA	VPS	200 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60 250 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60
26/06/2020	2035228200	10451- MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	22/06/2018	0515959/18-8	11118 - RDC 73/2016 - NOVO - Alteração de Posologia	18/05/2020	• RESULTADOS DE EFICÁCIA • POSOLOGIA E MODO DE USAR	VPS	200 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60 250 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60
28/05/2020	1677827208	10451- MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	22/06/2018	0515959/18-8	11118 - RDC 73/2016 - NOVO - Alteração de Posologia	18/05/2020	• RESULTADOS DE EFICÁCIA • POSOLOGIA E MODO DE USAR	VPS	200 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60 250 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60
10/09/2019	2136756196	10451- MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	29/03/2019	0291686/19-0	MEDICAMENTO NOVO - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro (operação comercial)	10/06/2019	• Dizeres legais	VP / VPS	200 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60 250 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60



21/09/18	0920532182	10451-MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	21/09/18	0920532182	10451-MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	21/09/18	<ul style="list-style-type: none">• Dizeres legais	VP / VPS	200 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60 250 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60
25/04/18	0328330185	10451-MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	20/04/2017	0695501171	11121 - RDC 73/2016 - NOVO - Inclusão de nova indicação terapêutica	26/03/2018	<ul style="list-style-type: none">• Para que este medicamento é indicado?• Como este medicamento funciona?• Como devo usar este medicamento?• Quais os males que este medicamento pode me causar?• Indicações• Resultados de eficácia• Características farmacológicas• Advertências e precauções• Posologia e modo de usar• Reações adversas	VP / VPS	200 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60 250 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60
14/09/17	1960798179	10451-MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	14/09/17	1960798179	10451-MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	NA	<ul style="list-style-type: none">• Características Farmacológicas• Advertências e Precauções• Dizeres legais	VP / VPS	200 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60 250 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60
11/08/17	1684849177	10451-MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC	11/08/17	1684849177	10451-MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula -	NA	<ul style="list-style-type: none">• Quais os males que este medicamento pode me causar• Reações adversas	VP / VPS	200 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60 250 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X



		60/12			RDC 60/12				60
04/08/16	2149326160	10451- MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	04/08/16	2149326160	MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	NA	<ul style="list-style-type: none">• Quais os males que este medicamento pode me causar• Resultados de eficácia• Características Farmacológicas• Reações adversas	VP / VPS	200 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60 250 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60
18/07/16	2092646164	MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	18/07/16	2092646164	MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula - NA RDC 60/12	NA	<ul style="list-style-type: none">• Dizeres legais	VP / VPS	200 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60 250 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60
05/07/16	2030675160	10458 - MEDICAMENTO NOVO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	09/04/15	0314705/15-3	MEDICAMENTO NOVO – Aditamento à Solicitação de Registro	10/02/16	<ul style="list-style-type: none">• Inclusão Inicial	VP / VPS	200 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60 250 MG CAP DUR CT FR PLAS OPC X 60