

"Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento." ("Vide Aspecto Físico").

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

No início do tratamento, dependendo da dose, podem aparecer alguns distúrbios como flatulência (gases), sensação de plenitude (estômago cheio), dor abdominal e diarreia que desaparecem em poucos dias sem necessidade de interromper a administração.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTES MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Não foram descritos, até o momento, casos de superdosagem com o uso de PLANTACIL®. Caso ocorra deve-se suspender o uso do produto e procurar um médico imediatamente para que sejam adotadas medidas de desintoxicação adequadas.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteger da luz e umidade.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Reg. MS- 1.0404.1982

Farm. Resp.: Christian Gregory Burgos de Menezes - CRF-SP nº 30.098

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC: 0800-551066

Nº de lote, Data de fabricação, Data de validade: Vide cartucho.

LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 1039-A
Bragança Paulista - SP - CEP: 12929-600
CNPJ: 61.299.111/0001-35
INDÚSTRIA BRASILEIRA

GL 5797 B

PLANTACIL®

Plantago ovata Forsk



MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

Forma Farmacêutica
Granulado para suspensão oral

Via de administração
Via oral

Apresentação
Embalagem de 20 envelopes com 5,0 g cada.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO (crianças acima de 6 anos)

Composição

Cada envelope de 5,0 g contém:
Plantago ovata Forsk 3,25 g
q.s.p. 5,0 g
Excipientes: ácido cítrico, cloreto de sódio, corante amarelo crepúsculo, citrato de sódio, aspartame, sacarina sódica, sorbitol, aroma de laranja, carboximetilcelulose sódica.

Nomenclatura botânica oficial

Plantago ovata Forsk.

Família

Plantaginaceae

Parte da planta utilizada

Partes aéreas

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

PLANTACIL® atua como uma fibra formadora de bolo fecal, que ajuda naturalmente no processo de evacuação, sem estimulantes químicos. *Plantago ovata* F. é composto por fibras vegetais que possuem grande capacidade de reter líquido, aumenta o volume e diminui a consistência das fezes (facilitando a evacuação). Adicionalmente, retem gorduras na sua estrutura, auxiliando a redução dos níveis séricos de colesterol. Também pode ser utilizado para complementar a ingestão diária de fibras.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

-No tratamento de obstipação intestinal como regulador intestinal, em casos de doenças que evoluem com alternância de episódios de diarreia e constipação (intestino irritável, diverticulose).

-Regulação da evacuação em pacientes portadores de ânus artificial (colostomia).

-Constipação intestinal crônica habitual ou decorrente da permanência no leito após operações cirúrgicas, por alterações de dieta, viagens ou tratamentos prolongados com laxantes potentes.

-Diarreias de origem funcional e como adjuvante em casos de doença de Crohn, bem como desarranjo intestinal causado por medicamentos.

-Processos proctológicos como hemorróidas, fissuras anais ou abscesso anal, com redução da dor na defecação facilitando a evacuação das fezes.

-Ingestão insuficiente de fibras.

-Complemento da ingestão diária de fibras.

-Distúrbios metabólicos como hiperlipemia como tratamento coadjuvante da terapêutica formal.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Contraindicações

Não administrar em casos de obstrução intestinal ou impação fecal. Pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis que inalem ou ingeram o produto. Em casos de sangramento retal, dor abdominal, náusea ou vômito, bem como frente à suspeita de megacólon (cólon dilatado) de etiologia chagásica, não use o produto antes de consultar seu médico. Se a obstipação persistir por mais de uma semana consulte seu médico.

Precauções e Advertências

Não se recomenda administração a pacientes em tratamento com digitálicos. Não administrar junto com anti-diarréicos e produtos inibidores da motilidade intestinal

(loperamida, difenoxilato, opiáceos, etc.) sob risco de obstrução intestinal.

Gravidez e amamentação
Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez.

"Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica."

Pacientes idosos

Não existem recomendações especiais ou precauções sobre o uso do produto por pacientes idosos.

"Este medicamento é contraindicado em crianças abaixo de 6 anos."

"Informe ao médico o aparecimento de reações indesejáveis."

"Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento."

"Atenção fenilcetonúricos: contém fenilalanina."

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Aspecto físico

Grânulos amarelo claros, sem partículas queimadas, isento de partículas estranhas visíveis.

Características organolépticas

A suspensão oral tem sabor levemente ácido de laranja.

Modo de usar:

Adultos: 1 envelope dissolvido em água ou em outro líquido 1 a 3 vezes ao dia.

Crianças de 6 a 12 anos: meio envelope dissolvido em água ou em outro líquido 1 a 3 vezes ao dia.

Recomendações para administração do produto:

Esvaziar o conteúdo do envelope em um copo e completar com aproximadamente 240 mL de água fria. Mexer vigorosamente com uma colher até que a mistura fique uniforme. Após finalizar ser ingerida durante ou após as refeições. Se ingerida meia hora antes das refeições, pode diminuir o apetite.

"Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica."

FORMATO: 130 X 155 mm

