

SAL AMARGO

Sulfato de magnésio

Purgativo salino



AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Sal Amargo. MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199/2006 AFE Nº 100066-8. **DCB:** Sulfato de magnésio **Contraindicações:** Sal Amargo é contraindicado em pacientes com disfunção renal e crianças com doenças parasitárias no intestino. Contraindicado nos casos de obstrução intestinal crônica, doença de Crohn, colite ulcerativa e qualquer outro episódio de inflamação no intestino. O uso contínuo pode causar diarreia crônica e consequente desequilíbrio eletrolítico. Não utilizar em crianças menores de 2 anos. Não passar da dose recomendada por dia e não utilizar por mais de 2 semanas.


Catarinense
PHARMA

SAL AMARGO

Forma Farmacêutica e Apresentação:

Pó oral. Cartucho com 50 sachets x 15 g.

Composição:

Cada sachet contém 15 g de sulfato de magnésio 99%.

Indicação:

Sal Amargo é indicado como purgativo salino.

Modo de usar:

5 a 30 g (1 colher de chá e 2 colheres de sopa) para adultos.

Para crianças recomenda-se 0,1 a 0,25 g por kg de peso corporal.

Preferencialmente ingerir a quantidade recomendada com 250 ml de água filtrada antes do café de manhã, em jejum.

Advertências:

- O uso contínuo pode causar diarreia crônica e consequente desequilíbrio eletrolítico.
- Não utilizar em crianças menores de 2 anos.
- Não passar da dose recomendada por dia e não utilizar por mais de 2 semanas.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS.

VIA ORAL.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Sal Amargo. MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199/2006 AFE Nº 100066-8. **DCB:** Sulfato de magnésio **Contraindicações:** Sal Amargo é contraindicado em pacientes com disfunção renal e crianças com doenças parasitárias no intestino. Contraindicado nos casos de obstrução intestinal crônica, doença de Crohn, colite ulcerativa e qualquer outro episódio de inflamação no intestino. O uso contínuo pode causar diarreia crônica e consequente desequilíbrio eletrolítico. Não utilizar em crianças menores de 2 anos. Não passar da dose recomendada por dia e não utilizar por mais de 2 semanas.

