

airela 



Expectovic

guaifenesina
13,33 mg/mL



Xarope Expectorante

AUXILIA NA
ELIMINAÇÃO
DO CATARRO

Forma farmacêutica - Xarope

Apresentação – Cartucho contendo frasco de vidro âmbar com 120 mL

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO
ACIMA DE 6 ANOS**

FORMULAÇÃO:

Cada 15 mL do produto contém:

guaifenesina200 mg
veículo* q.s.p.....15 mL

*mentol, aroma de morango, corante vermelho bordeaux, metilparabeno, propilparabeno, álcool etílico (álcool de cereais), sacarose e água purificada.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

Contraindicado em casos de hipersensibilidade à guaifenesina ou a qualquer componente do produto.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO:

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30 °C).

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica. Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade.

AÇÃO DO MEDICAMENTO:

Esse medicamento é um xarope expectorante que ajuda na eliminação do catarro em tosse produtivas. A guaifenesina fluidifica o catarro, tornando-o menos viscoso e mais “solto”. Dessa forma, o catarro é expelido de maneira mais fácil.

RISCOS DO MEDICAMENTO/ ADVERTÊNCIAS:

Não tome este medicamento em caso de tosse crônica como a causada por asma, fumo, bronquite crônica ou enfisema, ou se a tosse vier acompanhada de muco excessivo, a menos que indicado por um médico. Não exceda a dose recomendada. Não utilize por mais de 5 dias. Consulte seu médico se a tosse persistir por mais de 5 dias, tender a reincidir, vier acompanhada de febre, erupções cutâneas, dor de garganta ou dor de cabeça persistente.

Atenção: Este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela por portadores de diabetes.

Não deve ser administrado em crianças entre 2 e 6 anos de idade, a não ser que recomendado por um médico.

Não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica.

Informe ao seu médico se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.

Até o momento não foram descritas interações da guaifenesina com outros fármacos.

MODO DE USO:

O produto consiste de um xarope translúcido de cor avermelhada. Tomar a dose recomendada para o produto, de acordo com a faixa etária/peso, utilizando o copo dosador do produto.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.

POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO:

ADULTOS E CRIANÇAS MAIORES DE 12 ANOS (MAIS DE 43 KG)

15 mL a cada 4 horas

CRIANÇAS DE 6 A 12 ANOS (22 A 43 KG)

10 mL a cada 4 horas

Crianças entre 2 e 6 anos: somente em caso de recomendação médica. Não exceder 6 doses por dia. Em caso de esquecer uma dose, tome logo que possível, a menos que esteja perto da próxima dose; não tome dose

dupla. Não existem recomendações especiais ou precauções sobre o uso do produto por pacientes idosos.

REAÇÕES ADVERSAS:

Pouco frequentes ou raras: náuseas, vômitos, diarreia, erupção cutânea, dor de estômago, dor de cabeça, sonolência e vertigem.

CONDUTA EM CASO DE SUPERDOSAGEM:

O sintoma que caracteriza a superdosagem é o vômito. O indivíduo deve ser levado imediatamente ao atendimento médico emergencial sem que nenhuma outra conduta seja tomada.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

Nº do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho

V. 06

M.S. 1.4493.0005



airela

Fabricado por:
AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Rod. SC 440 - km 1, nº 500, Bairro Ilhota
Pedras Grandes/SC, CEP.: 88720-000
CNPJ.: 01.858.973/0001-29
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Farmacêutico Responsável:
Luiz Henrique Pepe Antunes CRF/SC 8481

