

FRENTE



PANOXYL®

peróxido de benzoíla 50 mg/g e 100 mg/g em base de gel alcoólico

USO EXTERNO

USO ADULTO E EM PACIENTES ACIMA DE 12 ANOS

Apresentação: bisnaga plástica com 45 g

Composição: cada grama contém:

	PANOXYL® 5 gel	PANOXYL® 10 gel
peróxido de benzoíla	54,6 mg*	109,9 mg*
gel excipiente q.s.p.	1 g	1 g

*Correspondente a peróxido de benzoíla 50mg/g e peróxido de benzoíla 100mg/g, respectivamente.

O excipiente contém: ácido cítrico, água purificada, álcool etílico, álcool laurílico etoxilado, hidroxipropilmetilcelulose, metilparabeno, perfume, silicato de alumínio e magnésio.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Panoxyil® gel é indicado para o tratamento da acne.

Panoxyil® gel deve ser mantido a temperatura ambiente (15°-30°C), em local fresco e ao abrigo da luz.

Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

“NÃO USE MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO, PODE SER PREJUDICIAL PARA SUA SAÚDE”.

Informe ao seu médico a ocorrência da gravidez ou se está amamentando durante o tratamento ou após seu término.

Modo de usar:

- Lave a pele suavemente com sabonete neutro ou desengordurante e água, antes das aplicações.
- Aguarde 30 minutos para que a pele esteja bem seca.
- À noite, antes de se deitar, aplique **Panoxyil® 5 gel**, inicialmente, com a ponta dos dedos sobre as áreas afetadas, espalhando cuidadosamente. Evite usar quantidades exageradas do gel.
- Durante uma semana, mantenha **Panoxyil® 5 gel** na superfície afetada por apenas uma hora e enxágue a área em seguida.
- Após este período, se não ocorrer irritação, aplique **Panoxyil® 5 gel** na superfície afetada e, só então, deixe ficar a noite toda, lavando-a na manhã seguinte, tendo certeza de ter retirado o produto completamente.
- Ao final de dez dias, pode ocorrer irritação, descamação, vermelhidão e leve ardor na pele.
- Esses sintomas devem ser suportáveis. Se eventualmente esses sintomas estiverem incomodando, deve-se suspender o uso do produto imediatamente. Ao redor de três dias, haverá alívio, e em sete dias, a pele voltará ao normal.
- Depois dessa fase de adaptação (mais ou menos 10 dias), **Panoxyil® 5 gel** pode ser usado duas vezes ao dia, de manhã e à noite, desde que não se exponha a área tratada ao sol.
- Após seis semanas, não havendo irritação forte e melhora dos sintomas com o uso de **Panoxyil® 5 gel**, deve-se mudar para **Panoxyil® 10 gel**.
- Lembre-se que o tratamento de acne em geral demora cerca de 90 dias.
- Evite o sol intenso, mas se houver necessidade (atividades normais) de exposição moderada ao sol, **Panoxyil®** não deve ser usado durante o dia. Neste caso, após a limpeza da área que está sendo tratada, deve-se aplicar um protetor solar com fator de proteção de, no mínimo, FPS 15, dando preferência aos produtos não comedogênicos.

“SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA”.

VERSO

Informe ao seu médico a ocorrência de reações desagradáveis, tais como irritação dolorosa da pele, incluindo queimação, coceira, inflamações severas, formação de bolhas e crostas ou inchaços locais.

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS”.

Evite o uso de produtos abrasivos ou descamantes durante o tratamento com **Panoxyil® gel**, pois pode ocorrer irritação excessiva.

Evite a exposição ao sol durante o tratamento, devido à possibilidade de aparecimento de manchas na pele.

Panoxyil® gel não deve ser aplicado nos olhos, boca e outras membranas mucosas, em feridas ou na pele irritada.

Panoxyil® gel mancha os cabelos e tecidos coloridos; portanto, evite o contato do produto com os mesmos.

Panoxyil® gel não deve ser usado por pessoas hipersensíveis ao peróxido de benzoíla ou a qualquer componente da fórmula.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Mecanismo de ação

Não se conhece ainda o exato mecanismo de ação do peróxido de benzoíla, mas essa substância é um agente oxidante que libera lentamente o oxigênio ativo, tendo assim, uma ação antibacteriana contra o Propionibacterium acnes. Além disso, o peróxido de benzoíla possui efeito queratolítico que produz a comedólise, bem como ações ressecantes e descamativas, que contribuem para sua eficácia.

INDICAÇÕES

Panoxyil® gel é indicado para o tratamento tópico da acne vulgar suave a moderada.

CONTRA-INDICAÇÕES

Panoxyil® gel é contra-indicado às pessoas hipersensíveis ao peróxido de benzoíla ou a qualquer componente da fórmula.

Gravidez e amamentação: apesar de não serem descritos problemas em humanos, o uso do produto na vigência destas condições deve ser avaliado pelo médico.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Evite a exposição ao sol durante o tratamento, devido à possibilidade de aparecimento de manchas na pele.

Panoxyil® gel não deve ser aplicado nos olhos, boca e outras membranas mucosas, em feridas ou na pele irritada.

Panoxyil® gel mancha os cabelos e tecidos coloridos; portanto, evite o contato do produto com os mesmos.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O uso concomitante de outras preparações tópicas para o tratamento da acne, especialmente abrasivos ou descamantes, pode levar a uma irritação cutânea cumulativa e, por isso, deve ser feito com orientação médica.

REAÇÕES ADVERSAS

Dermatite alérgica de contato, irritação e rash cutâneo de incidência rara.

POSOLOGIA

Dose usual para adultos e pacientes acima de 12 anos de idade: uma a duas aplicações diárias, seguindo corretamente o modo de usar descrito no item Informações ao Paciente, ou conforme orientação médica.

SUPERDOSAGEM

O uso de quantidades exageradas do gel pode levar a queimaduras, prurido, descamação, eritema e edema de grau elevado.

Tratamento: suspenda o uso do produto e aguarde a pele recuperar seu aspecto normal. Compressas frias no local podem produzir alívio da irritação. O uso de substâncias emolientes e/ou corticosteróides pode ser indicado pelo médico.

Lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

Reg. MS 1.0675.0007 - Farm. Resp.: Waldir A. K. Bonetti - CRF-SP 12381

Divisão de Produtos de Consumo dos Laboratórios Stiefel Ltda.

R. Prof. João C. Salem, 1081/1301 - Guarulhos - SP
CNPJ 63.064.653/0001-54 - Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 7043189
e-mail: sac@stiefel.com.br
www.stiefel.com.br

300247



030B4



Pantone Reflex Blue U