

aspecto do medicamento." (Vide "Aspecto Físico").

Para a apresentação comprimido revestido: "Este medicamento não pode ser partido ou mastigado."

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Altas doses podem levar a distúrbios eletrolíticos [hipocalemia (diminuição do potássio no sangue), hipocalcemia (diminuição do cálcio no sangue)], acidose ou alcalose metabólica, má absorção, albuminúria (perda de proteínas pela urina), hematuria (perda de sangue pela urina) e perda de peso.

Fraqueza e hipotensão ortostática são observadas em pacientes idosos que utilizam frequentemente laxantes.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTES MEDICAMENTO DE UMA SO VEZ?

Não se tem conhecimento de que SENARETI® apresente riscos à saúde desde que administrado de forma apropriada, em conjunto com as doses terapêuticas designadas. Caso ocorra superdose procurar imediatamente o médico, para que sejam adotadas medidas de desintoxicação adequadas.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteger da luz e umidade.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Reg. MS- 1.0404.1970.

Farm. Resp.: Christian Gregory Burgos de Menezes CRF-SP nº 30.098.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-551066

Nº de lote, Data de fabricação, Data de validade: Vide cartucho.

LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 1039-A

Bragança Paulista - SP • CEP: 12929-600

CNPJ: 61.299.111/0001-35

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SENARETI®

Senna alexandrina Mill.



MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

Forma Farmacêutica

Comprimido revestido

Geléia

Via de administração

Via oral

Apresentações

Cartucho com 20 comprimidos revestidos.

Frasco com 150 g e 250 g de geléia.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO (CRIANÇAS ACIMA DE 10 ANOS)

Composição

Cada comprimido revestido contém:

Extrato seco *Senna alexandrina* Mill.

(45% senosídeos)..... 29,0 mg

Excipientes: lactose, amido, fosfato

bicálcico, dióxido de silício, estearato de

magnésio, hidroxipropilmetilcelulose,

etilcelulose, dióxido de titânio, corante

verde folha.

q.s.p. 1 comprimido revestido.

Geléia oral

Cada g de geléia oral contém:

Extrato seco de *Senna alexandrina* Mill.

(45% de senosídeos) 9,0 mg

Excipientes: polpa de ameixa preta, celulose

microcristalina, benzoato de sódio, carbo-

ximetilcelulose, corante caramelo, açúcar

granulado, metilparabeno, propilenoglicol,

água purificada.

q.s.p. 1,0 g.

Nomenclatura botânica oficial

Senna alexandrina Mill.

Nomenclatura popular

Sene

Família

Fabaceae

Parte da planta utilizada

Folhas.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O Sene é uma planta nativa das regiões tropicais e subtropicais, sendo que as partes utilizadas como medicamento são os folíolos e os frutos. O Sene é utilizado principalmente num curto período na constipação ocasional.

Mecanismo de ação

a) Influência na motilidade do intestino grosso (estimulando as contrações peristálticas e inibindo as contrações locais) relacionadas com a aceleração do trânsito colônico além da redução dos fluidos.

b) Influência no processo de secreção (estimulando a produção de muco e cloretos ativos) resultando num aumento de fluidos.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

SENARETI® é indicado por um curto período na constipação ocasional, como um laxativo.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O uso por mais de duas semanas requer atenção médica. Na lactação (amamentação) é contraindicado, pois o medicamento pode passar para o leite materno.

Sangramento retal ou a falta de movimento intestinal após o uso do laxante pode indicar sérios problemas intestinais.

SENARETI® pode potencializar os efeitos das glicosídeos cardiotônicos (digitálicos), devido a perda aumentada de potássio.

Pode potencializar os efeitos de medicamentos antiarrítmicos como a quinidina devido a hipocalemia (redução do nível de potássio no sangue). Não utilizar este medicamento em caso de obstrução intestinal aguda. Não utilizar em pacientes com histórico de reações alérgicas ou hipersensibilidade ao Sene ou a qualquer um dos componentes da fórmula. Não é recomendável o uso quando estiver utilizando qualquer outro

tipo de estimulante laxativo.

Interações medicamentosas

O uso com outros medicamentos, tais como diuréticos tiazídicos, adrenocorticoídes, raiz de alcaçuz pode exacerbar a desigualdade eletrolítica induzindo a hipocalemia. Pode causar dor e câibras abdominais, diarreia, descoloração na urina, nefrites (inflamação renal), anormalidades eletrolíticas, náuseas e vômitos.

O SENARETI® diminui o tempo de trânsito intestinal podendo reduzir a absorção de medicamentos administrados por via oral.

"Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez, desde que sob prescrição médica."

"Este medicamento é contraindicado para crianças menores de 10 anos de idade."

"Informe ao médico o aparecimento de reações indesejáveis."

"Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento."

"Atenção: Este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes."

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Aspecto Físico

Comprimido revestido: Comprimido oblongo e de cor marrom.

Geléia oral: Geléia marrom escura, com odor característico, isenta de partículas estranhas visíveis.

Características organolépticas

Comprimido revestido e Geléia oral: Vide "Aspecto Físico".

Modo de usar

Via oral.

Adultos e crianças acima de 10 anos

Comprimidos revestidos: 1 a 2 comprimidos revestidos ao dia.

Geléia oral: 1 colher das de chá (5 g) após a última refeição ou a critério médico.

"Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica."

"Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar observe o

GL 5800 B

LUPER IND. FARMACÊUTICA LTDA

PRODUTO: Senareti oomp. revest e geléia

FACA: 130 x 155 mm

VERSÃO: GL 5800 - PC ILUSTRATOR 11.0