

Serviço de Atendimento ao Consumidor:
0800-551066

Nº de lote, Data de fabricação, Data de validade: Vide cartucho.

DORIFLAN®

diclofenaco dietilamônio



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Gel creme: Bisnaga contendo 60 g.

USO ADULTO

USO TÓPICO

COMPOSIÇÃO

Cada 1,0 g do produto contém:
diclofenaco dietilamônio
(equivalente a 10 mg de diclofenaco potássico).....11,6 mg
excipientes: carbopol, etoxi etil propil benzil parabeno, lauril sulfato de sódio, álcool isopropílico, essência koala, propilenoglicol, óleo de coco, álcool oleico etoxilado, polissorbato, trietanolamina, óleo mineral leve, água purificada q.s.p.....1,0 g

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
DORIFLAN® GEL CREME é um medicamento anti-inflamatório tópico que age sobre a região inflamada aliviando o inchaço e a dor.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

DORIFLAN® GEL CREME é indicado para aliviar os sintomas da inflamação como inchaço e dor, nas seguintes condições:

- entorses, lesões, contusões, distensões, torcicolos, dores nas costas, dor muscular, dor pós-traumática e lesões causadas pela prática esportiva;
- tendinite, (inflamação de um tendão), cotovelo do tenista, bursite (inflamação dolorosa da bursa) e;
- alguns tipos de artrites leves (artralgia, dor articular) nos joelhos e dedos.

DORIFLAN® GEL CREME também pode ser usado para tratar outras condições determinadas por um médico.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Contraindicações

- Não use DORIFLAN® GEL CREME se você:
- já tiver apresentado alguma reação alérgica no passado, como erupção cutânea

(vermelhidão ou bolhas na pele) ou respiração ofegante, após tomar medicamentos contendo diclofenaco ou algum outro anti-inflamatório não-esteroidal, como ácido acetilsalicílico ou ibuprofeno e

- Hipersensibilidade (alergia) conhecida ao diclofenaco, ou a qualquer componente da formulação.

Advertências

DORIFLAN® GEL CREME deve ser aplicado somente sobre a pele sã e intacta (ausência de feridas abertas ou escoriações). Evitar o contato do produto em membranas mucosas.

Tenha cuidado para não aplicar DORIFLAN® GEL CREME em seus olhos. Se isto ocorrer, lave-os com água limpa e procure um médico.

- DORIFLAN® GEL CREME não deve ser ingerido.

- DORIFLAN® GEL CREME não é indicado na faixa etária abaixo de 14 anos, exceto nos casos de artrite juvenil crônica.

Precauções

Gravidez e amamentação:

- Gravidez: pela ausência de dados clínicos referentes à utilização de DORIFLAN® GEL CREME durante a gravidez, não se recomenda seu uso durante esse período.

- Durante a amamentação, você não deve aplicar DORIFLAN® GEL CREME a extensas áreas da pele ou por período de tempo superior a uma semana.

"Este medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas sem orientação médica."

Interações medicamentosas

Até o momento não foram constatadas interações medicamentosas com o uso de DORIFLAN® GEL CREME. Em caso de dúvida, procure um médico.

"Informe ao seu médico o aparecimento de reações indesejáveis."

"Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento."

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Aspecto físico

DORIFLAN® GEL CREME é um gel branco

perolado, homogêneo.

Características organolépticas

Odor característico.

Dosagem

DORIFLAN® GEL CREME deve ser aplicado massageando suavemente a pele e cobrindo a

área inchada ou dolorida, 3 a 4 vezes ao dia. A quantidade apropriada poderá variar dependendo do tamanho da área afetada.

Como usar

Lave suas mãos após cada aplicação de DORIFLAN® GEL CREME, a menos que as mãos sejam a área em tratamento.

Se os sintomas não melhorarem após 1 semana de uso ou se ficarem ainda piores, consulte um médico.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

DORIFLAN® GEL CREME pode algumas vezes causar efeitos indesejáveis, como:

- Mais comuns: coceira, vermelhidão, inchaço ou formação de bolhas na região tratada da pele.

- Muito raras: erupção cutânea generalizada; reações alérgicas tais como: respiração ofegante, encurtamento da respiração ou inchaço da face. Muito raramente, DORIFLAN® GEL CREME também pode causar aumento da sensibilidade da pele aos raios solares.

Se você apresentar estes sintomas ou outros efeitos indesejáveis não mencionados, pare de usar DORIFLAN® GEL CREME e procure um médico imediatamente.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTES MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

DORIFLAN® GEL CREME deve ser usado apenas externamente. Se houver ingestão acidental, procure um médico imediatamente.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar este medicamento em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteger da luz e umidade.

TODOS OS MEDICAMENTOS DEVEM SER MANTIDOS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Reg. MS-1.0404.1954.001-0

Farm. Resp.: Christian Gregory Burgos de Menezes - CRF-SP nº 30.098

LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 1039/A • Bragança Paulista - SP
CNPJ: 12.229.200 • CNRG: 61.299.111/0001-33
INDÚSTRIA BRASILEIRA

FORMATO : 130 X 155 mm