

Listril (Torrent).

Lisinopril

Composição e apresentação

Cada comprimido contém 5 mg ou 10 mg de lisinopril. Embalagens com 30 comprimidos.

Indicações

Hipertensão essencial e renovascular. Controle da ICC, como tratamento adjuvante com diuréticos e quando apropriado, digitálicos.

Contraindicações

Hipersensibilidade a quaisquer de seus componentes. *Precauções e advertências:* Em pacientes com distúrbios vascular do colágeno e renal, deve-se considerar a monitoração periódica da contagem de glóbulos brancos no sangue. Com cautela em pacientes com estenose aórtica ou com miocardiopatia hipertrófica. Na hipotensão em IAM, o tratamento não deve ser iniciado em pacientes sob risco de grave deterioração hemodinâmica após tratamento com um vasodilatador. Em pacientes com ICC, a hipotensão que segue após o início da terapia com IECA pode levar a algum comprometimento da função renal. IRA, normalmente reversível, foi observada nessa situação. Nesses casos o médico deve considerar a descontinuação de LISTRIL. Caracteristicamente, a tosse pelo uso de IECA é não produtiva, persistente e se resolve com a descontinuação do tratamento. *Gravidez e lactação:* Não é recomendado durante a gravidez, e se for detectada, lisinopril deve ser interrompido o mais rápido possível. Deve-se ter cuidado se for prescrito a lactantes. *Interações medicamentosas:* Quando um diurético é acrescentado, o efeito anti-hipertensivo é geralmente potencializado. A indometacina pode diminuir a eficácia anti-hipertensiva. Em alguns pacientes com comprometimento da função renal, a coadministração com AINEs, pode resultar em deterioração da função renal. Os níveis séricos de lítio devem ser cuidadosamente monitorados se sais de lítio estiverem sendo administrados. O uso concomitante de diuréticos poupadores de potássio (espironolactona, triantereno e amilorida), potássio ou substitutos do sal de cozinha que contenham potássio, pode levar a aumentos significativos do potássio sérico.

Reações adversas

As mais frequentes são: tonturas, cefaleia, diarreia, fadiga, tosse e náuseas. Foram observados aumentos na ureia, na creatinina sérica, nas enzimas hepáticas e nas bilirrubinas séricas. Esses aumentos geralmente são reversíveis após a descontinuação.

Posologia

Hipertensão essencial: A dose inicial recomendada é de 10 mg, 1x/dia. A dose usual de manutenção é de 20 mg, administrados 1x/dia. A dose máxima recomendada é de 40 mg/dia. Em pacientes hipertensos nos quais os diuréticos não possam ser descontinuados, a terapia deve ser iniciada com a dose de 5 mg. A dose subsequente deverá ser ajustada de acordo com a resposta da PA. Com depuração de creatinina < 10 ml/min, a dose inicial é de 2,5 mg/dia (ajustar de acordo com a resposta da PA). Com depuração de creatinina de 10-30 ml/min, a dose inicial é de 2,5 mg-5 mg/dia. Com depuração de creatinina de 31-70 ml/min, a dose inicial é de 5 mg-10 mg/dia. *ICC:* Tratamento adjuvante com diuréticos e, onde apropriado, com digitálicos, pode ser iniciado com 2,5 mg, 1x/dia. A dose usual de manutenção varia de 5 a 20 mg em dose única diária. *IAM:* O tratamento pode ser iniciado nas 24 horas após o início dos sintomas. A primeira dose é de 5 mg, seguida de 5 mg após 24 horas, 10 mg após 48 horas e, então, 10 mg, uma vez ao dia.

TORRENT

torrent do brasil ltda.

04565-001 - São Paulo-SP

Rua Flórida, 1738 - 5º andar - Cidade Monções

Tel.. 0XX(11) 5501-2585

Fax. 0XX(11) 5501-2582

SAC..... 0800-7708818
E-mail: torrent@torrent.com.br
Home page: www.torrent.com.br