

CORASTORVA
(atorvastatina cálcica)

Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda.
Comprimidos revestidos
10 mg, 20 mg, 40 mg e 80 mg

Leia sempre a bula. Ela traz informações importantes e atualizadas sobre o medicamento.

CORASTORVA®

atorvastatina cálcica

MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA.

APRESENTAÇÕES

Comprimidos revestidos 10 mg: embalagens com 10 ou 30.

Comprimidos revestidos 20 mg, 40 mg e 80mg: embalagens com 30.

USO ORAL

CORASTORVA de 10 mg e 20 mg - USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 10 ANOS DE IDADE

CORASTORVA de 40 mg e 80 mg - USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido contém:

atorvastatina cálcica.....10,3575 mg (correspondente a 10 mg de atorvastatina base)

atorvastatina cálcica.....20,715 mg (correspondente a 20 mg de atorvastatina base)

atorvastatina cálcica.....41,430 mg (correspondente a 40 mg de atorvastatina base)

atorvastatina cálcica.....82,860 mg (correspondente a 80 mg de atorvastatina base)

excipientes q.s.p.....1 comprimido

Excipientes: lactose monoidratada, trolamina, poloxâmer, amidoglicolato de sódio, docusato de sódio, benzoato de sódio, estearilfumarato de sódio, hipromelose, dióxido de titânio, macrogol e polissorbato 80.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

CORASTORVA (atorvastatina cálcica) comprimidos revestidos é indicado para tratamento de:

- hipercolesterolemia (aumento da quantidade de colesterol no sangue) isolada;
- hipercolesterolemia associada à hipertrigliceridemia (aumento dos níveis sanguíneos de outro tipo de gordura);
- hipercolesterolemia associada à redução dos níveis sanguíneos de HDL (tipo de colesterol);
- hipercolesterolemia associada à hipertrigliceridemia e associado também a redução dos níveis sanguíneos de HDL.

Inclusive hipercolesterolemias de transmissão genética/familiar (familiar homozigótica, disbetalipoproteinemia, etc), quando a resposta à dieta e outras medidas não-farmacológicas forem inadequadas.

CORASTORVA é indicado para prevenção secundária (aquela que é instituída depois de um evento para evitar que ele ocorra novamente) de síndrome coronária aguda (doença em que o músculo cardíaco recebe menor fluxo de sangue). CORASTORVA também pode ser usado para prevenção de complicações cardiovasculares (vasos sanguíneos e coração) em pacientes sem doença cardiovascular ou dislipidemia preexistente, mas com múltiplos fatores de risco (tabagismo, hipertensão, diabetes, HDL baixo ou história familiar de doença cardíaca precoce). CORASTORVA é indicado para o tratamento de pacientes com doença cardíaca (do coração) e coronariana (dos vasos do coração) para reduzir o risco de complicações como: infarto do miocárdio não fatal, de acidente vascular cerebral (derrame) fatal e não fatal, de procedimentos de revascularização (para desobstrução das artérias), de hospitalização por insuficiência cardíaca congestiva (doença em que o músculo cardíaco não consegue bombear o sangue para o corpo) e de angina (dor no peito devido a problemas no coração e seus vasos).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

CORASTORVA age reduzindo a quantidade de colesterol (gordura) total no sangue diminuindo os níveis das frações prejudiciais (LDL-C, apolipoproteína B, VLDL-C, triglicérides) e aumentando os níveis sanguíneos do colesterol benéfico (HDL-C). A ação de CORASTORVA se dá pela inibição de produção de colesterol pelo fígado, e aumento da absorção e destruição de frações prejudiciais (LDL) do colesterol.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CORASTORVA é contraindicado a pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula; doença hepática (do fígado) ativa ou elevações persistentes inesperadas das transaminases séricas (enzimas do fígado), excedendo em 3 vezes o limite superior da normalidade; durante a gravidez ou lactação (amamentação) ou a mulheres em idade fértil que não estejam utilizando medidas contraceptivas (para evitar gravidez) eficazes. CORASTORVA deve ser administrado a adolescentes e mulheres em idade fértil somente quando a gravidez for altamente improvável e desde que estas pacientes tenham sido informadas dos potenciais riscos ao feto.

Este medicamento é contraindicado para menores de 10 anos de idade.

CORASTORVA não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Sempre avise o seu médico todas as medicações que você toma quando ele for prescrever uma medicação nova. O médico precisa avaliar se as medicações reagem entre si alterando a sua ação, ou da outra; isso se chama interação medicamentosa. Siga estritamente as orientações do seu médico. Medicamentos que reduzem a quantidade de lípidos (gordura) no sangue agem no metabolismo (transformação) dos lípidos no fígado, raramente isso pode levar a alteração dos níveis de enzimas hepáticas (substâncias produzidas pelo fígado) na corrente sanguínea, que voltam ao normal com diminuição ou retirada do tratamento. Recomenda-se que testes de função do fígado sejam feitos antes do início do tratamento e periodicamente. CORASTORVA deve ser usado com cuidado em pacientes com maior risco de alterações da função do fígado (por exemplo, uso abusivo de bebidas alcoólicas, portadores de doenças hepáticas). Pacientes com AVC hemorrágico (tipo de derrame cerebral) prévio parecem apresentar um risco maior para apresentarem um novo AVC hemorrágico. Relate imediatamente ao seu médico se surgirem inesperadamente dor muscular, alterações da sensibilidade ou fraqueza muscular, particularmente se for acompanhada de mal-estar ou febre. Miopatia (dor ou fraqueza muscular) devido à lesão dos músculos (diagnosticada através do aumento dos valores da substância CPK no sangue) pode ocorrer em pacientes que usam CORASTORVA, sendo mais frequentes naqueles que usam também ciclosporina, fibratos, eritromicina, niacina ou antifúngicos azólicos. Avise imediatamente o seu médico caso você faça uso de alguma dessas medicações. Há raros casos de rabdomiólise (destruição de células musculares) acompanhada de alteração da função dos rins (insuficiência renal aguda) relatados em usuários de medicações da classe do CORASTORVA. Por isso em situações em que os riscos de rabdomiólise aumentarem (infecção aguda grave, hipotensão – pressão baixa, cirurgia de grande porte, politraumatismos, distúrbios metabólicos, endócrinos e eletrolíticos e convulsões não controladas) recomenda-se a interrupção temporária de CORASTORVA. CORASTORVA é contraindicado durante a gravidez (vide item 3. Quando não devo usar este medicamento?). Não se sabe se CORASTORVA é excretado no leite materno, devido aos riscos potenciais para os lactentes (bebês que mamam leite materno), mulheres utilizando CORASTORVA não devem amamentar. A administração concomitante de CORASTORVA com medicamentos inibidores do CYP 3A4 ou indutores do CYP 3A4 (sistemas de quebra de vários medicamentos) (por ex., ciclosporina, eritromicina/ claritromicina, inibidores da protease, cloridrato de diltiazem, cimetidina, itraconazol, suco de *grapefruit*, efavirenz, rifampicina) pode alterar a quantidade de atorvastatina no sangue. São conhecidas outras interações medicamentosas, avise seu médico se você fizer uso de: antiácidos, colestipol, digoxina, azitromicina, contraceptivos orais (pílulas), varfarina, ácido fusídico.

Efeitos na Habilidade de Dirigir ou Operar Máquinas: não há evidências de que CORASTORVA possa afetar a habilidade do paciente de dirigir ou operar máquinas.

Uso em Crianças: CORASTORVA 10 mg e 20 mg está indicado para o tratamento de hipercolesterolemia em pacientes acima de 10 anos de idade. As adolescentes devem ser aconselhadas sobre os métodos contraceptivos (para evitar gravidez) apropriados enquanto estiverem em tratamento com CORASTORVA.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

CORASTORVA deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do medicamento

- CORASTORVA de 10, 20 e 40 mg: comprimido revestido branco, oblongo, sulcado em uma das faces e liso na outra.

- CORASTORVA de 80 mg: comprimido revestido branco, oblongo, sulcado em uma das faces e gravado “Medley” na outra.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento deve ser usado após a prescrição médica. A dose pode variar de 10 a 80 mg em dose única diária, usada a qualquer hora do dia, com ou sem alimentos. As doses iniciais e de manutenção devem ser individualizadas de acordo com os níveis iniciais do colesterol sanguíneo, a meta do tratamento e a resposta do paciente. Após o início do tratamento e/ou durante o ajuste de dose de CORASTORVA, os efeitos aparecem após 2 a 4 semanas, portanto os exames para avaliação do resultado do ajuste da dosagem devem ser feitos após esse período. **Uso em Pacientes com Insuficiência Hepática** (prejuízo da função do fígado): (vide item 4. O que devo saber antes de usar este medicamento?). **Uso em Pacientes com Insuficiência Renal** (diminuição da função dos rins): a insuficiência renal não apresenta influência nas concentrações plasmáticas (sanguíneas) do CORASTORVA. Portanto, o ajuste de dose não é necessário. **Uso em Idosos:** não foram observadas diferenças entre pacientes idosos e a população em geral com relação à segurança, eficácia ou alcance do objetivo do tratamento de lípidos (gorduras do sangue). **Uso combinado com outros medicamentos:** quando a coadministração de CORASTORVA e ciclosporina, telaprevir ou tipranavir/ritonavir é necessária, a dose de CORASTORVA não deve exceder 10 mg.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça-se de tomar uma dose de CORASTORVA no horário estabelecido pelo seu médico, tome-a assim que lembrar. Não tome CORASTORVA se fizer mais de 12 horas que você esqueceu-se de tomar a sua última dose. Espere e tome a dose seguinte no horário habitual. Não tome 2 doses de CORASTORVA ao mesmo tempo. O esquecimento de dose pode comprometer a eficácia do tratamento.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

CORASTORVA é geralmente bem tolerado. As reações adversas foram geralmente de natureza leve e transitória. Os efeitos adversos mais frequentes (reação comum - ocorre em 1% ou mais dos pacientes que utilizam este medicamento) que podem ser associados ao tratamento com CORASTORVA são: nasofaringite (resfriado comum), hiperglicemia (aumento de glicose do sangue), dor faringolaríngea (de garganta), epistaxe (sangramento nasal), diarreia, dispepsia (má digestão), náusea (enjoo), flatulência (excesso de gases no estômago ou intestinos), artralgia (dor nas articulações), dor nas extremidades, dor musculoesquelética (músculos e ossos), espasmos musculares (contrações involuntárias), mialgia (dor muscular), edema articular (inchaço da articulação), alterações nas funções hepáticas (do fígado), aumento da creatina fosfoquinase sanguínea (CPK – enzima que aumenta quando há lesão muscular).

Efeitos adicionais relatados nos estudos placebo-controlados: pesadelo, visão turva, tinido (zumbido no ouvido), desconforto abdominal, eructação (liberação de gases pela boca), hepatite (inflamação do fígado) e colestase (parada ou dificuldade da eliminação da bile), urticária (alergia da pele), fadiga muscular (cansaço do músculo), cervicálgia (dor na região cervical), mal-estar, febre, presença de células brancas positivas na urina. Em pacientes pediátrico (idade entre 10 e 17 anos): infecções.

Efeitos adicionais na experiência pós-comercialização: trombocitopenia (diminuição das células de coagulação do sangue: plaquetas), reações alérgicas (incluindo anafilaxia - reação alérgica grave), ruptura do tendão, aumento de peso, hipostesia (perda ou diminuição da sensibilidade), amnésia, tontura, disgeusia (paladar alterado), pancreatite (inflamação no pâncreas), síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica (doença cutânea em que a camada superficial da pele se solta em lamínas), angioedema (inchaço), eritema multiforme (reação imunológica das mucosas e da pele), *rash* bolhosa (erupções em forma de bolha na pele), rabdomiólise (danos na musculatura esquelética com liberação de componentes celulares na circulação), miopatia necrosante autoimune (doença muscular), miosite (inflamação dos músculos), dor nas costas, dor no peito, edema periférico (inchaço nas extremidades), fadiga (cansaço).

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?

Não há tratamento específico para superdosagem com CORASTORVA. No caso de superdosagem, o paciente deve receber tratamento sintomático e devem ser instituídas medidas de suporte, conforme a necessidade.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

MS 1.1300.1105
Farm. Resp.: Silvia Regina Brollo
CRF-SP 9.815

Registrado por:
Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda.
Av. Mj. Sylvio de M. Padilha, 5200 – São Paulo – SP
CNPJ 02.685.377/0001-57

Fabricado por:
Medley Farmacêutica Ltda.
Rua Macedo Costa, 55 – Campinas – SP

Comercializado por:
Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan, 735 – São Paulo – SP
Indústria Brasileira

® Marca Registrada

Atendimento ao Consumidor
 **0800-703-0014**
sac.brasil@sanofi.com



IB120516

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela ANVISA em 12/05/2016.

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 16/06/2016.

Anexo B

Histórico de Alteração para a Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data da aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
08/10/2013	0846263131	Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	08/10/2013	0846263131	Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	08/10/2013	- Adequação do texto de bula ao medicamento referência	VP/VPS	10 MG COM REV CT BL AL / AL X 10 10 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 20 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 40 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 80 MG COM REV CT BL AL / AL X 30
25/09/2014	0799442/14-7	SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	25/09/2014	0799442/14-7	SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	25/09/2014	- Adequação do texto de bula ao medicamento referência - DIZERES LEGAIS	VP/VPS	10 MG COM REV CT BL AL / AL X 10 10 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 20 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 40 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 80 MG COM REV CT BL AL / AL X 30
28/11/2014	1068909/14-5	SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	28/11/2014	1068909/14-5	SIMILAR Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	28/11/2014	- DIZERES LEGAIS	VP/VPS	10 MG COM REV CT BL AL / AL X 10 10 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 20 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 40 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 80 MG COM REV CT BL AL / AL X 30
23/01/2015	0063577/15-4	SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	23/01/2015	0063577/15-4	SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	23/01/2015	- Adequação do texto de bula ao medicamento referência	VP/VPS	10 MG COM REV CT BL AL / AL X 10 10 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 20 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 40 MG COM REV

									CT BL AL / AL X 30 80 MG COM REV CT BL AL / AL X 30
01/07/2015	0578143/15-4	SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula para adequação à intercambiali- dade	01/07/2015	0578143/15-4	SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula para adequação à intercambiali- dade	01/07/2015	- Identificação do Medicamento (inserção da frase "MEDICAMENT O SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA"	VP/VPS	10 MG COM REV CT BL AL / AL X 10 10 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 20 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 40 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 80 MG COM REV CT BL AL / AL X 30
02/02/2016	1224328/16-1	SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	02/02/2016	1224328/16-1	SIMILAR Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	02/02/2016	Adequação do texto de bula ao medicamento referência	VP/VPS	10 MG COM REV CT BL AL / AL X 10 10 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 20 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 40 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 80 MG COM REV CT BL AL / AL X 30
16/06/2016		SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	16/06/2016		SIMILAR Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	16/06/2016	Adequação do texto de bula ao medicamento referência	VP/VPS	10 MG COM REV CT BL AL / AL X 10 10 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 20 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 40 MG COM REV CT BL AL / AL X 30 80 MG COM REV CT BL AL / AL X 30