

AFTINE[®]

sulfato de neomicina - DCB: 06284
tartarato de bismuto e sódio - DCB: 00353
mentol - DCB: 05643
cloridrato de procaína - DCB: 07383

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

AFTINE[®] suspensão oral gotas - Embalagem contendo um frasco gotejador de 20mL.

USO TÓPICO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada mL de AFTINE[®] gotas contém:

sulfato de neomicina	15mg
tartarato de bismuto e sódio	25mg
mentol.....	1mg
cloridrato de procaína	15mg
Excipientes q.s.p.....	1mL

(sacarina sólida, propilenoglicol, hidróxido de sódio, glicerol, álcool etílico e água purificada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

AFTINE[®] é eficaz nos casos de aftas e outras afecções bucais. A neomicina combate as bactérias, o tartarato de bismuto e sódio possui ação antisséptica; o cloridrato de procaína atua como anestésico, e o mentol age como adstringente. AFTINE[®] deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 °C e 30°C), protegido da luz. AFTINE[®] possui prazo de validade de 24 meses a partir da data de fabricação, desde que observados os cuidados de conservação.

Não use o produto se o prazo de validade estiver vencido. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informe também se estiver amamentando. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. Informe ao seu médico o aparecimento de quaisquer reações desagradáveis. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O sulfato de neomicina é um antibiótico aminoglicosídeo, bactericida, ativo contra numerosas bactérias Gram-positivas. Atravessa a membrana celular bacteriana mediante transporte ativo e interfere na síntese protéica. A neomicina não é absorvida pela pele intacta, todavia, a neomicina aplicada topicamente é facilmente absorvida através de grandes regiões expostas, queimadas ou com tecido de granulação. O tartarato de bismuto e sódio possui ação antisséptica direta *in vitro* sobre o streptococo. O streptococo é o agente etiológico único causador destas afecções (angina pultácea). O cloridrato de procaína possui ação anestésica tópica, aliviando a dor. O mentol possui ação adstringente.

INDICAÇÕES

AFTINE[®] é indicado como medicação tópica auxiliar no tratamento das afecções bucais.

CONTRAINDICAÇÕES

AFTINE[®] não deve ser utilizado por pacientes sensíveis a qualquer um dos componentes da formulação.

REAÇÕES ADVERSAS

Durante a experiência pós-comercialização, observou-se que o medicamento pode ocasionar escurecimento na língua causado pelo ativo tartarato de bismuto e sódio. Esse escurecimento é temporário, desaparecendo após a suspensão do uso do medicamento.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Pingar uma ou duas gotas no local da afecção, 3 a 6 vezes ao dia. **Agite antes de usar.**

PACIENTES IDOSOS

Não constam na literatura relatos sobre advertências ou recomendações especiais do uso adequado por pacientes idosos.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA. NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: VIDE CARTUCHO.

CIFARMA - Científica Farmacêutica Ltda.

Rod. BR 153, Km 5,5 - Jardim Guanabara - CEP: 74675-090 - Goiânia / GO
CNPJ: 17.562.075/0001-69 - Indústria Brasileira
Farm. Resp.: Dra. Michele Caldeira Landim - CRF/GO: 5122
Reg. M.S.: 1.1560.0080