

**ERYSIDORON 1**

**(Apis mellifica D3, Atropa belladonna D3)**

**WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda**

**Solução Oral**  
**0,50 mL**

**Glóbulos**  
**40,0 mg + 40,0 mg**

## **Erysidoron 1**

Apis mellifica D3, Atropa belladonna D3

### **IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

**Erysidoron 1** - Apis mellifica, Atropa belladonna

### **MEDICAMENTO ANTROPOSÓFICO**

#### **APRESENTAÇÕES**

Solução oral de Apis mellifica D3, Atropa belladonna D3

Embalagem: frasco de vidro âmbar com 50 mL

Glóbulos de Apis mellifica D3, Atropa belladonna D3

Embalagem: frasco de vidro âmbar com 20 gramas

#### **USO ORAL**

#### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

#### **COMPOSIÇÃO**

Cada 1 mL de solução oral contém:

Apis mellifica D3 ..... 0,50 mL

Atropa belladonna D3 ..... 0,50 mL

Gradação alcoólica: 34,5%.

Cada 1 mL de **Erysidoron 1** solução oral equivale a 20 gotas e contém 945 mg do produto.

Cada grama de glóbulos contém:

Apis mellifica D3 ..... 40,0 mg

Atropa belladonna D3 ..... 40,0 mg

Glóbulos inertes nº 5 ..... 1,0 g

### **INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

#### **INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS**

De acordo com os conhecimentos antroposóficos em relação ao ser humano e à natureza, **Erysidoron 1** é indicado no tratamento auxiliar dos processos inflamatórios agudos, geralmente febris, como otite, laringite, irritação da traqueia, coriza com tosse, inflamação aguda da garganta, das amídalas e erisipela.

Ao estudarmos a matéria médica dos componentes do **Erysidoron 1**, observamos o seguinte:

- Apis mellifica: indicado para febre, inflamações agudas com edema, otite, laringite, irritação da traqueia, tosse, erisipela, uretrite, anexite, abscessos, sinovite, glomerulonefrite aguda.

- Atropa belladonna: indicada para processos inflamatórios agudos de instalação brusca e violenta, febris, com calor local, vermelhidão, ardor, edema e dor.

Para otalgias, coriza com tosse, odontalgias, inflamação aguda da garganta, amídalas e úvula, parotidite aguda, gastralgias, mastite, erisipela.

#### **CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS**

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica.**

**Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

Ao processo de diluição seguido de agitação ritmada, damos o nome de dinamização.

Os medicamentos antroposóficos são produzidos a partir de substâncias naturais dos reinos mineral, vegetal e animal que, em função da relação evolutiva, estão em direta ligação com o ser humano sadio e doente.

As relações primordiais entre ser humano e natureza podem ser desenvolvidas através de processos farmacêuticos até uma relação terapêutica. Isto resulta, por um lado, da compreensão dos processos

patológicos no ser humano e por outro lado, do reconhecimento dos correspondentes processos da natureza, de acordo com os princípios antroposóficos.

O medicamento antroposófico pode agir, de acordo com sua composição, de três modos: (1) estimulando um processo contrário à doença; (2) agindo sinergicamente de modo correspondente à atividade geradora da doença e provocando uma reação contrária maior do organismo no sentido da cura; (3) proporcionando um modelo orientador para o órgão ou sistema doente levando a sua atividade sadia.

**Erysidoron 1**, como um medicamento produzido e indicado de acordo com o conhecimento antroposófico, age em primeira linha pelo estímulo das forças autocurativas do organismo e serve para a harmonização de distúrbios da saúde acima relacionados.

### **CONTRAINDICAÇÃO**

O produto é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

O produto é contraindicado para pessoas alérgicas à picada de abelha. Pacientes com glaucoma podem sofrer um agravamento desta condição pelo uso de Atropa belladonna, assim como homens com hiperplasia prostática benigna que ficam mais susceptíveis à retenção urinária.

### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Pacientes com glaucoma podem sofrer um agravamento desta condição pelo uso de Atropa belladonna, assim como homens com hiperplasia prostática benigna que ficam mais susceptíveis à retenção urinária.

O produto é contraindicado para pessoas alérgicas à picada de abelha.

Além disso, até o momento, não foi relatada a necessidade de outras precauções, se administrado conforme a posologia sugerida.

**Atenção diabéticos: Erysidoron 1 glóbulos contém SACAROSE.**

**Atenção: Erysidoron 1 solução oral contém ÁLCOOL.**

**Teor alcoólico: 34,5%.**

**Gravidez e lactação: este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Pacientes idosos: não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.**

### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Até o momento não houve relatos de interações medicamentosas.

### **CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO**

**Antes e depois da abertura da embalagem, o produto deve ser armazenado à temperatura ambiente (15 - 30°C), em local seco e protegido da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: televisão, forno de micro-ondas, computador, raios X, aparelho celular, caixa acústica, etc.**

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Prazo de validade deste medicamento: 24 meses.**

**Erysidoron 1 solução oral é uma solução hidroalcoólica límpida e transparente, levemente amarelada;**

**Erysidoron 1 glóbulos são grãos esféricos, homogêneos, regulares e consistentes, levemente amarelados.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### **POSOLOGIA E MODO DE USAR**

Solução oral

Crianças até 12 anos: tomar 5 a 10 gotas, inicialmente de 15 em 15 minutos na primeira hora, depois de 30 em 30 minutos por mais duas horas, e a seguir de hora em hora, espaçando conforme a melhora dos sintomas, até 4 em 4 horas. Manter por pelo menos 7 dias, ou conforme orientação médica.

Adultos e crianças maiores de 12 anos: tomar 15 a 20 gotas, inicialmente de 15 em 15 minutos na primeira hora, depois de 30 em 30 minutos por mais duas horas, e a seguir de hora em hora, espaçando conforme a melhora dos sintomas, até 4 em 4 horas. Manter por pelo menos 7 dias, ou conforme orientação médica.

Aplicar as gotas diretamente na boca, ou em um copo com água.

#### Glóbulos

Crianças até 12 anos: tomar 2 a 6 glóbulos, inicialmente de 15 em 15 minutos na primeira hora, depois de 30 em 30 minutos por mais duas horas, e a seguir de hora em hora, espaçando conforme a melhora dos sintomas, até 4 em 4 horas. Manter por pelo menos 7 dias, ou conforme orientação médica.

Adultos e crianças maiores de 12 anos: tomar 9 a 12 glóbulos, inicialmente de 15 em 15 minutos na primeira hora, depois de 30 em 30 minutos por mais duas horas, e a seguir de hora em hora, espaçando conforme a melhora dos sintomas, até 4 em 4 horas. Manter por pelo menos 7 dias, ou conforme orientação médica.

Os glóbulos podem ser engolidos com água ou dissolvidos na boca.

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 7 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

#### REAÇÕES ADVERSAS

Até o momento, não foi relatado nenhum caso de reação adversa durante a sua utilização; caso ocorra, suspenda a administração do produto e procure orientação médica. Informe ao seu prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no portal da Anvisa.

#### SUPERDOSE

Até o momento, não foram relatados ou verificados casos de superdosagem durante o tratamento com o produto. Entretanto, caso ocorra ingestão acidental excessiva, deve-se procurar um serviço médico ou entrar em contato com um médico.

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.**

#### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CLARKE, J. H. - A Dictionary of Practical Materia Medica. - New Delhi: Jain, Repr. 1985.

VIJNOVSKY, B.- Tratado de Matéria Médica (vol I, II e III) - São Paulo: Ed. Organon, 2003.

BOERICKE, W. - Manual de Matéria Médica Homeopática - Tomo II - São Paulo: Robe Editorial, 2003.

#### VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

Erysidoron 1 Solução Oral - MS 1.0061.0017.007-7

Erysidoron 1 Glóbulos - MS 1.0061.0017.004-8

Farm. Resp.: Luciano Roberto Lopes - CRF-SP 59244

**Fabricado, embalado e distribuído por:**

**WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda.**

**Rua Brig. Henrique Fontenelle, 33**

**CEP 05125-000 - São Paulo - SP**

**CNPJ 56.992.217/0001-80 - Indústria Brasileira**

**S.A.C. 0800 055 32 66**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**



ME8363LH3-02

**Histórico de Alteração da Bula**

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
20/04/2023	N.A.	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Dizeres Legais	VPS	(0,5 + 0,5) ML/ML SOL OR CT FR VD AMB GOT X 50ML  (40 + 40) MG/G GLOB CT FR VD AMB X 20 G
15/03/2022	1112501/22-3	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Dizeres Legais	VPS	(0,5 + 0,5) ML/ML SOL OR CT FR VD AMB GOT X 50ML  (40 + 40) MG/G GLOB CT FR VD AMB X 20 G
28/06/2021	2501054/21-1	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Inclusão inicial de texto de bula	VPS	(0,5 + 0,5) ML/ML SOL OR CT FR VD AMB GOT X 50ML  (40 + 40) MG/G GLOB CT FR VD AMB X 20 G