

Forteviron®

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: FORTEVIRON®

Insumos ativos: *Agnus castus*, *Conium maculatum*, *Nuphar luteum*, *Onosmodium virginianum*

Medicamento Homeopático

APRESENTAÇÕES

Caixa contendo 01 *blister* com 20 comprimidos de 250 mg

Caixa contendo 15 *blisters* com 4 comprimidos de 250 mg

Forma farmacêutica: Comprimido simples

Via de administração: **ORAL**

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 250 mg contém:

<i>Agnus castus</i>	6CH.....	6,25 µL
<i>Conium maculatum</i>	6CH.....	6,25 µL
<i>Nuphar luteum</i>	6CH.....	6,25 µL
<i>Onosmodium virginianum</i>	6CH.....	6,25 µL
Excipientes q.s.p.....		250 mg

(Lactose monoidratada, amido, estearato de magnésio e dióxido de silício)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES

FORTEVIRON® é um medicamento de ação progressiva que auxilia e estimula o organismo a combater a fraqueza física e mental, ativando o desempenho sexual de homens e mulheres. Também é indicado como auxiliar para homens e mulheres com intensa atividade física e intelectual.

Para homens: como auxiliar no tratamento da fraqueza física e mental, depressão mental, irritabilidade, cefaleia, prostração geral, memória fraca (perda de memória), diminuição ou ausência de desejo sexual, ejaculação precoce, espermatorreia e impotência sexual.

Para mulheres: como auxiliar no tratamento da fraqueza física e mental, depressão mental, irritabilidade, cefaleia, prostração geral, memória fraca (perda de memória), diminuição ou ausência de desejo sexual e frigidez.

Agnus castus - Atua como auxiliar na neurastenia sexual, melancolia, tristeza, depressão mental, perda da memória, ausência ou diminuição de desejos sexuais, impotência sexual e na frigidez.

Conium maculatum - Atua como auxiliar na melancolia, tristeza, memória fraca (perda de memória), irritabilidade, fraqueza física e mental, impotência, ejaculação precoce, ereções curtas e insuficientes e debilidade sexual.

Nuphar luteum - Atua como auxiliar na fraqueza, ausência ou diminuição de desejo sexual, impotência sexual e na espermatorreia.

Onosmodium virginianum - Atua como auxiliar na fraqueza, cefaleia, insônia, prostração geral, diminuição ou perda do desejo sexual em ambos os sexos, fraqueza sexual e ejaculação rápida.

FORTEVIRON® é auxiliar como revigorante e ativador sexual.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

As indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento são comprovadas pelas matérias médicas homeopáticas e repertórios homeopáticos após experimentação individual de seus insumos ativos em indivíduos sadios.

A experimentação no homem são consiste em administrar substâncias medicinais em indivíduos sadios para elucidar os sintomas que irão refletir sua ação. A partir desta experimentação surgem as matérias médicas, que indicam a totalidade dos sintomas que cada ativo poderá promover, em busca da cura da patologia.

A comprovação das indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento se dá pelas seguintes referências:

ALLEN, H.C. - **Sintomas-Chave da Matéria Médica Homeopática** - São Paulo: Dynamis editorial, 2.ª ed., 2000.

ALLEN, T. F. - **The Encyclopedia of Pure Materia Medica** (Vol. I a XII) - New Delhi: B. Jain Publishers, 2005.

BOERICKE, W. - **Manual de Matéria Médica Homeopática** - São Paulo: Robe Editorial, 2003.

BOERICKE, W. - **Materia Medica with Repertory & 50 Homoeopathic Indian Drugs**. - New Delhi: B. Jain Publishers, 1986.

CAIRO, N. - **Guia de Medicina Homeopática** - São Paulo: Livraria Teixeira, 23.ª ed., 2003.

CHARENTE, G. - **Matéria Médica Explicada** - Revisão e adaptação da Prof. Dra. Anna Kossak-Romanach - São Paulo: ElCid, 1998.

CLARKE, J. H. - **A Dictionary of Pratical Materia Medica** (Vol. I, II e III) - New Delhi: B. Jain Publishers, 2007.

DIAS, A. F. - **Repertório Homeopático Essencial** - Rio de Janeiro: Editora Cultura Médica, 2004.

DUFILHO, R. - **Fichas de Matéria Médica Homeopática** - O Piano Homeopático - São Paulo: Andrei, 2000.

EIZAYAGA, F. X. - **El Moderno Repertório de Kent** - Buenos Aires: Ediciones Marecel, 1981.

HAHNEMANN, S. - **Doenças Crônicas** (Vol. I) - São Paulo: Editorial Homeopática Brasileira, 1998.

HAHNEMANN, S. - **Matéria Médica Pura** (Vol. I) - São Paulo: Robe, 1997.

HERING, C. - **The Guiding Symptom of our Materia Medica** (Vol. I a X) - New Delhi: B. Jain Publishers, 2005.

HORVILLEUR, A. - **Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia** - São Paulo: Andrei, 2003.

KENT, J. T. - **Matéria Médica** (Vol. I e II) - Rio de Janeiro: Luz Menescal Editores, 2003.

LATHOUD, F. - **Estudos de Matéria Médica Homeopática** - São Paulo: Editora Organon, 2.ª ed., 2004.

NASH, E.B. - **Indicações Características de Terapêutica Homeopática** - Rio de Janeiro: Ed. Bras. da Federação Bras. de Homeopatia, 1979.

NASH, E.B. - **Leaders in Homoeopathic Therapeutics** - New Delhi: B. Jain Publishers, 2008.

RIBEIRO FILHO, A. - **Repertório de Sintomas Homeopáticos** - São Paulo: Editora Organon, 2005.

SCHROYENS, F. - **Synthesis** - London: Homeopathic Book Publ., 1993.

TYLER, M.L. - **Retratos de Medicamentos Homeopáticos** (Vol. I e II) - São Paulo: Santos ed., 1999.

VIJNOVSKY, B. - **Tratado de Matéria Médica** (Vol. I, II e III) - São Paulo: Ed. Organon, 2003.

VOISIN, H. - **Manual de Matéria Médica para o Clínico** - São

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

FORTEVIRON® é um medicamento homeopático composto de substâncias referenciadas na matéria médica homeopática, que auxilia e estimula o organismo a combater a fraqueza física e mental, ativando o desempenho sexual de homens e mulheres. Também é indicado como auxiliar para homens e mulheres com intensa atividade física e intelectual.

O mecanismo de ação deste medicamento baseia-se no princípio da “cura do semelhante pelo semelhante”, descrito na Matéria Médica (GUERMONPREZ, M.; PINKAS, M. e TORCK, M. – *Matiere Medicale Homeopathique*, 3.ª ed., França; Édition Boiron, 1989).

4. CONTRAINDICAÇÕES

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 (doze) anos.

Até o momento são desconhecidas informações sobre as contraindicações do medicamento FORTEVIRON®.

Pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula devem fazer uso do medicamento FORTEVIRON® sob orientação médica.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Um intervalo de 15 minutos deve ser respeitado entre a administração de FORTEVIRON® e as refeições.

Pela manhã deve-se aguardar, pelo menos, 15 minutos da ingestão de FORTEVIRON®, para o café da manhã.

À noite, deve-se aguardar, no mínimo, 15 minutos após a última refeição para se fazer uso de FORTEVIRON®.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria “C”).

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

Até o momento são desconhecidas informações sobre reações adversas do medicamento FORTEVIRON®.

Este medicamento contém LACTOSE.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Até o momento são desconhecidas alterações em exames laboratoriais no uso do medicamento FORTEVIRON®.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Conservar à temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C). Proteger da luz e da umidade. Evitar radiação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento: comprimidos brancos e sem odor (inodoros).

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

Administração Via Oral

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor.

Posologia Sugerida:

Adultos

Tomar 2 (dois) comprimidos pela manhã, em jejum, e 2 (dois) comprimidos à noite, ao deitar, durante os primeiros 90 (noventa) dias, ou a critério médico.

Após esse período, tomar 1 (um) comprimido pela manhã, em jejum, e 1 (um) comprimido à noite, ao deitar, ou a critério médico.

9. REAÇÕES ADVERSAS

Até o momento são desconhecidas informações sobre as reações adversas do medicamento FORTEVIRON®.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - VIGIMED, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/vigimed>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

10. SUPERDOSE

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou o farmacêutico.

Na eventualidade de superdosagem acidental, poderá ser aplicada terapia sintomática (sintomas apresentados), com auxílio médico, levando em consideração de que não há evidências descritas de intoxicações agudas com medicamentos homeopáticos.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Registro no Ministério da Saúde: M.S. n.º 1.0247.0024

Farmacêutica Responsável: Dr.ª Giselle da Costa Mateus CRF - PR 16959

Empresa Titular do Registro:

Homeopatia Waldemiro Pereira - Laboratório Industrial Farmacêutico Eireli.

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Indústria Brasileira

SAC: Fone: (41) 3013-6464 | sac@wplab.ind.br

Venda sob prescrição médica.

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em XX/XX/XX.



WP LAB
Indústria Farmacêutica

